Enterococcus faecalis

CARACTERÍSTICAS

- Coco Gram positivo, de aproximadamente 0.6–2.5 µm.
- Se observa principalmente en pares o cadenas cortas.
- Anaerobio facultativo.
- No forma esporas.
- Puede crecer entre 10–45 °C.
- Forma parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal.
- Puede comportarse como patógeno oportunista, especialmente en el contexto hospitalario.

FACTORES DE VIRULENCIA

- Citolisina (Cyl): produce lisis de células del hospedero mediante daño de la membrana.
- Gelatinasa (GelE): degrada proteínas bacterianas y del hospedero.
- SprE: proteasa de serina relacionada con la virulencia.
- Sustancia de agregación (AS/PrgB): favorece la agregación bacteriana.
- Ace: adhesina que permite la unión al colágeno.
- Ebp: pili adhesivos que favorecen la adherencia.
- EfaA: contribuye a la virulencia durante la infección.
- Esp: participa en la formación de biopelículas.
- LTA, EPA y polisacáridos capsulares: contribuyen a la adhesión, formación de biopelículas y resistencia frente a mecanismos inmunitarios.

PATOGENIA — SIMPLIFICADA

1. Colonización: E. faecalis forma parte de la microbiota gastrointestinal.
2. Alteración de barreras: hospitalización, procedimientos invasivos o alteración de la microbiota favorecen su establecimiento como patógeno.
3. Adhesión: adhesinas y pili permiten la unión a tejidos y superficies.
4. Formación de biopelícula: favorece la persistencia de la bacteria y su supervivencia.
5. Daño y evasión: citolisina, gelatinasa, proteasas y componentes de superficie contribuyen al daño y a la supervivencia bacteriana.
6. Diseminación: puede alcanzar diferentes sitios del organismo y producir infecciones, principalmente ITU, bacteriemia, endocarditis, meningitis e infecciones intraabdominales y de tejidos blandos.

ENFERMEDADES PRINCIPALES

- Infecciones del tracto urinario: cistitis, prostatitis y epididimitis.
- Bacteriemia: puede originarse a partir de infecciones urinarias, abdominales, heridas o catéteres.
- Endocarditis infecciosa: puede adherirse a las válvulas cardíacas y formar vegetaciones.
- Meningitis.
- Infecciones intraabdominales y pélvicas: abscesos, peritonitis e infecciones biliares.
- Infecciones de heridas y tejidos blandos.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Morfología

- Tinción de Gram: cocos Gram positivos en pares o cadenas cortas.

Cultivo

- Agar sangre: colonias pequeñas, generalmente no hemolíticas.
- La hemólisis puede variar entre cepas, por lo que no debe utilizarse por sí sola para identificar la especie.
- Agar bilis-esculina: crecimiento con ennegrecimiento del medio → prueba positiva.
- Medios cromogénicos: puede producir colonias azuladas o azul-verdosas; resultado presuntivo.

Pruebas diferenciales principales

- Bilis-esculina: +
- Catalasa: −
- NaCl 6.5 %: +
- PYR: +
- Movilidad: −

