Table des matières

I. Analyse **5**

1. Généralités sur les fonctions **7**
1.1. Définitions et notations . . . 7
1.1.1. Définition . . . 7
1.1.2. Image et antécédent . . . 7
1.1.3. Ensemble de définition . . . 8
1.2. Représentation graphique . . . 8
1.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations . . . 9
1.4. Variations d'une fonction . . . 10
1.4.1. Taux de variation . . . 10
1.4.2. Tableau de variations . . . 11
1.5. Signe d'une fonction . . . 12
1.5.1. Lien avec la position relative de la courbe . . . 12
1.5.2. Tableau de signes . . . 13

2. Fonctions affines **15**
2.1. Introduction et exemple concret . . . 15
2.2. Définitions et vocabulaire . . . 15
2.2.1. Fonction affine . . . 15
2.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent . . . 16
2.3. Représentation graphique . . . 16
2.4. Détermination d'une fonction affine . . . 17
2.5. Sens de variation . . . 18
2.6. Étude du signe . . . 19
2.7. Résolution d'équations et d'inéquations . . . 19
2.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$ . . . 19
2.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$ . . . 20

3. Fonctions du 2nd degré **21**
3.1. Définition et exemples . . . 21
3.2. Représentation graphique . . . 21
3.2.1. Parabole . . . 21
3.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$ . . . 22
3.3.1. Variations . . . 23
3.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$ . . . 23
3.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré . . . 24
3.4.1. Définition et racines . . . 24
3.4.2. Axe de symétrie et sommet . . . 25
3.4.3. Variations . . . 25
3.4.4. Exemple complet d'étude . . . 25
3.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré . . . 27
3.5.1. Définition et signe . . . 27
3.5.2. Sommet et variations . . . 28
3.5.3. Exemple complet d'étude . . . 28

4. Fonctions du 3ème degré **31**
4.1. Généralités et définitions . . . 31
4.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré . . . 31
4.1.2. Représentation graphique et sens de variation . . . 31
4.2. Forme factorisée, racines et étude de signe . . . 32
4.2.1. Forme factorisée et racines . . . 32
4.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré . . . 33
4.2.3. Méthode : Étude du signe . . . 33
4.3. Équations du type $x^3 = c$ . . . 34
4.3.1. Propriétés . . . 34
4.3.2. Méthodes de résolution . . . 34

5. Dérivation **35**
5.1. Nombre dérivé . . . 35
5.1.1. Taux de variation et nombre dérivé . . . 35
5.2. Tangente à une courbe . . . 36
5.2.1. Définition et coefficient directeur . . . 36
5.2.2. Équation de la tangente . . . 37
5.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles . . . 38
5.3.1. Fonction dérivée . . . 38
5.3.2. Dérivées des fonctions usuelles . . . 38
5.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables . . . 38
5.4. Étude des variations d'une fonction . . . 39

II. Statistiques et probabilités **41**

6. Proportion et évolution pourcentage **43**
6.1. Proportion et pourcentage . . . 43
6.1.1. Proportion . . . 43
6.1.2. Pourcentage de pourcentage . . . 44
6.2. Évolution exprimée en pourcentage . . . 44
6.2.1. Taux d'évolution . . . 44
6.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution . . . 45
6.3. Évolutions successives et taux global . . . 45
6.3.1. Taux d'évolution global . . . 45
6.3.2. Taux d'évolution réciproque . . . 46
6.4. Indices base 100 . . . 46
6.4.1. Définition et calcul d'un indice . . . 46

7. Probabilité conditionnelle **49**
7.1. Notions fondamentales de probabilité . . . 49
7.1.1. Définition et propriétés . . . 49
7.1.2. Intersection et union d'événements . . . 51
7.2. Probabilité conditionnelle . . . 52
7.2.1. Définition . . . 52
7.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé . . . 53
7.2.3. Calcul à l'aide de la formule . . . 55

8. Arbres et loi de Bernoulli **57**
8.1. Représentation par un arbre pondéré . . . 57
8.1.1. Modélisation . . . 57
8.1.2. Propriétés . . . 58

8.2. Expérience aléatoire à deux épreuves et épreuve de Bernoulli 60
8.2.1. Indépendance de deux événements 60
8.2.2. Épreuve de Bernoulli 61
8.2.3. Espérance 62
8.2.4. Répétitions d'épreuves de Bernoulli 63

Mathématiques — 1ère Technologique

Table des matières

Première partie

Analyse

1. Généralités sur les fonctions


1.1. Définitions et notations

1.1.1. Définition

Exemple :

On considère la fonction f qui donne l'aire d'un rectangle de dimensions 3 et x.
Une **expression littérale** de f est donc :

$$f(x) = 3x$$



Définition


Une fonction f associe à tout nombre réel x un unique nombre réel, noté $f(x)$.
On note également :

$$x \mapsto f(x) \quad \text{ou} \quad y = f(x)$$

Exemple :

Voici des exemples de fonctions :

- $f(x) = 2x + 1$
- $g : x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{x}}$
- $h(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
- $i(x) = \dfrac{3x+1}{x^2}$



1.1.2. Image et antécédent

Exemple :

Dire que $f(2) = 5$ signifie que $2 \mapsto 5$
On dit que :

- l'**image** de 2 par la fonction f est 5.
- un **antécédent** de 5 par f est 2.

Remarque :


- Un nombre possède une **unique image**.
- Cependant, un nombre peut posséder plusieurs antécédents.

Méthode (Déterminer l'image d'une fonction par calcul)

Soit la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2$.
Calculons l'image de 6 par la fonction g.

$$\begin{aligned} g(6) &= 6^2 - 2 \\ &= 36 - 2 \quad = 34 \end{aligned}$$

L'image de 6 par la fonction g est 34.




Méthode (Déterminer un antécédent par calcul) .....

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$.

Déterminons un antécédent de (-5) par la fonction f.

On peut donc écrire :

$$f(x) = -5 \quad \Leftrightarrow \quad 2x - 3 = -5$$



On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned} & f(x) = -5 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x - 3 = (-5) \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = -5 + 3 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = (-2) \quad \Leftrightarrow \quad x = (-1) \end{aligned}$$

L'antécédent de (-5) par f est donc (-1).

1.1.3. Ensemble de définition

Définition .....

L'**ensemble de définition** d'une fonction f, noté $\mathscr{D}$ ou $\mathscr{D}_f$, est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels il est possible de calculer l'image $f(x)$.

Exemple :

- Pour la fonction $f(x) = 2x + 1$, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel.
  Son ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R}$.
- Pour la fonction $g(x) = \dfrac{1}{x}$, on ne peut pas diviser par 0. La valeur 0 est interdite.
  L'ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.2. Représentation graphique

Méthode .....

Représenter graphiquement une fonction Soit la fonction f définie sur $[0;5]$ par :

$$f(x) = 5x - x^2$$

Pour représenter la fonction f, il faut calculer quelques images de nombres :


- $f(0) = 5 \times 0 - 0^2 = 0$
- $f(1) = 5 \times 1 - 1^2 = 4$
- $f(2) = 5 \times 2 - 2^2 = 6$
- $f(3) = 5 \times 3 - 3^2 = 6$
- $f(4) = 5 \times 4 - 4^2 = 4$
- ...

On consigne nos résultats dans un tableau de valeurs :

x	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$f(x)$	0	4	5,25	6	6,25	6	5,25	4	2,25	0

On représente les données du tableau de valeurs dans un repère tel que :

- Les valeurs de x se trouvent **en abscisse**
- Les valeurs de $f(x)$ correspondantes se trouvent **en ordonnée**.



Remarque :


- Les **images** $f(x)$ se lisent sur l'**axe des ordonnées** (y).
- La courbe représentative de f définie par $f(x) = 5x - x^2$ peut se noter : $y = 5x - x^2$
- De façon générale, l'équation d'une courbe se note $y = f(x)$

1.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode (Résoudre graphiquement une équation)

On a représenté la courbe de f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'équation :

$$5x - x^2 = 4 \Leftrightarrow f(x) = 4$$

Ce qui revient à trouver des antécédents de 4 par la fonction f.

- On "part" de l'ordonnée 4
- On "rejoint" la courbe
- On lit les solutions sur l'axe des abscisses

On a :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$$

On peut noter :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow S = \{1;4\}$$


Remarque :

- Par **lecture graphique**, les solutions obtenues sont **approchées**.
- L'équation $f(x) = 7$, ne semble pas avoir de solution car la courbe représentée ne possède pas de point d'ordonnée 7.
- **Graphiquement**, on ne peut pas être certain que les solutions qui apparaissent sont les seules.
  Il pourrait y en avoir d'autres au-delà des limites de la représentation graphique tracée.

Méthode (Résoudre graphiquement une inéquation) .....

Dans la méthode précédente, on a représenté la fonction f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'inéquation :

$$5x - x^2 > 4 \Leftrightarrow f(x) > 4$$

L'inéquation $\left(5x - x^2\right) > 4$ peut s'écrire $f(x) > 4$.

Ce qui revient à déterminer les abscisses des points de la courbe dont l'**ordonnée est strictement supérieure** à 4.

On lit les solutions sur l'axe des abscisses et on peut noter :

$$f(x) > 4 \Leftrightarrow S =]1\,;4[$$


1.4. Variations d'une fonction

1.4.1. Taux de variation

Définition .....

Le **taux de variation** de la fonction f entre a et b est le nombre :


$$\text{Taux de variation} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Propriété .....

Le taux de variation de f entre a et b est la pente de la droite passant par les points d'abscisses a et b de la courbe représentative de f.

$$coef.dir = pente = \frac{Montée}{Avance} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$




Méthode (Déterminer un taux de variation d'une fonction) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 1$

Déterminons le **taux de variation** entre 1 et 3.

$$\begin{aligned} \text{Taux de variation} &= \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} \\ &= \frac{\left(2 \times 3^2 + 1\right) - \left(2 \times 1^2 + 1\right)}{2} \\ &= \frac{19 - 3}{2} \quad = \frac{16}{2} \quad = 8 \end{aligned}$$



La pente de la droite passant par les points d'abscisses 1 et 3 est égale à 8.

Propriété .....

Soit a et b, deux nombres d'un intervalle I tel que $a < b$.

Si le taux de variation d'une fonction f entre ***tous*** *les couples a et b de I est ... :*

- ***...positif,****, alors f est* ***strictement croissante*** *sur I.*
- ***...négatif****, alors f est* ***strictement décroissante*** *sur I.*
- ***...nul****, alors f est* ***constante*** *sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction à l'aide du taux de variation) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x - 3$$

Démontrons que f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

On considère deux nombres quelconques a et b.

Le taux de variation de f entre a et b est égal à :

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{(5b - 3) - (5a - 3)}{b - a} \\ &= \frac{5b - 5a}{b - a} \quad = \frac{5(b - a)}{b - a} \quad = 5 \end{aligned}$$

Or, $5 > 0$ donc $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$ et donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

1.4.2. Tableau de variations

Pour résumer les comportements d'une fonction (croissante, décroissante ou constante), on regroupe ces informations dans un **tableau de variations**.

Exemple :

Reprenons la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;5]$ dont la courbe a été étudiée précédemment.

Son tableau de variations est le suivant :


x	0		2,5		5
f	0	↗	6,25	↘	0

Exemple :

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2;2]$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

Sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$ dans un repère orthogonal est la suivante :



En observant la courbe, la fonction est :

- **croissante** de -2 à -1 (atteignant un maximum local de 3),
- … puis **décroissante** de -1 à 1 (atteignant un minimum local de -1),
- … et enfin **croissante** de 1 à 2.

On résume ces variations dans le tableau de variations suivant :

x	-2		-1		1		2
$f(x)$	-1	↗	3	↘	-1	↗	3

1.5. Signe d'une fonction

1.5.1. Lien avec la position relative de la courbe

Propriété

Déterminer le signe d'une fonction f sur un intervalle consiste à savoir pour quelles valeurs de x la fonction est positive ($f(x) \geqslant 0$) ou négative ($f(x) \leqslant 0$).

- *$f(x) > 0$ lorsque la courbe de f est située **au-dessus** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) < 0$ lorsque la courbe de f est située **en dessous** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) = 0$ aux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.*

Remarque :

Si l'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction, il est également possible de déterminer son signe par le calcul en résolvant les inéquations $f(x) > 0$ ou $f(x) \geqslant 0$, lorsque cela est possible.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{-1}{2}x + 1$$

Déterminons par le calcul le signe de la fonction f.

Pour cela, étudions l'inéquation $f(x) \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{-1}{2}x+1 \geqslant 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-1}{2}x \geqslant -1 \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \div \left(\frac{-1}{2}\right) \quad \text{(on inverse le sens car on multiplie par un nombre négatif)} \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \times \left(\frac{2}{-1}\right) \quad \Leftrightarrow x \leqslant 2 \end{aligned}$$

La fonction f est donc **positive** sur l'intervalle $]-\infty ; 2[$ (et s'annule en 2), et **négative** sur $]2 ; +\infty[$.

1.5.2. Tableau de signes

On résume ces informations dans un **tableau de signes** en utilisant les symboles + (pour positif), − (pour négatif) et un 0 sur une barre verticale pour indiquer l'annulation de la fonction.

Exemple :

Reprenons l'exemple précédent avec la fonction f définie par :


$$f(x) = \frac{-1}{2}x+1$$

En résolvant l'inéquation $f(x) \geqslant 0$, nous avons établi que :

- $f(2) = 0$
- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \leqslant 2$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \geqslant 2$

On résume ces informations dans le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	




Exemple :

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-3 ; 5]$.

À partir de sa représentation graphique, on détermine son signe que l'on résume dans le tableau de signes.

x	-3		-2		1		4		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	



2. Fonctions affines

2.1. Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de 15€ auquel s'ajoute 2€ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50$€ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

2.2. Définitions et vocabulaire

2.2.1. Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

2.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....
Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).


Correction :

1. On calcule $f(40)$:
$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$
Le prix pour 40 km est de 95€.
2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:
$$\begin{aligned} 2x + 15 = 55 &\Leftrightarrow 2x = 40 \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$
Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

2.3. Représentation graphique


Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
*Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite**.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0; p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0; 30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0; 15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20; 55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.




2.4. Détermination d'une fonction affine

Propriété (Calcul du coefficient directeur) .....

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Si a et b sont deux nombres distincts ($a \neq b$), alors le coefficient directeur m se calcule par la formule :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Démonstration :

Puisque f est une fonction affine, on a :

$$f(a) = ma + p \quad \text{et} \quad f(b) = mb + p$$

Calculons la différence $f(b) - f(a)$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (mb + p) - (ma + p) \\ &= mb - ma \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, on a $b - a \neq 0$, ce qui permet de diviser par $(b - a)$:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir du coefficient directeur et d'un point) .....

Soit f une fonction affine de coefficient directeur $m = -3$ et telle que $f(1) = 4$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. Puisque $m = -3$, l'expression de la fonction est de la forme :

$$f(x) = -3x + p$$

2. On utilise les coordonnées du point donné ($f(1) = 4$) pour trouver p :

$$\begin{aligned} -3 \times (1) + p = 4 &\Leftrightarrow -3 + p = 4 \\ &\Leftrightarrow p = 7 \end{aligned}$$

Conclusion : $f(x) = -3x + 7$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs) .....

Soit f une fonction affine telle que $f(2)=5$ et $f(5)=11$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$\begin{aligned} m &= \frac{f(5)-f(2)}{5-2} \\ &= \frac{11-5}{3} \\ &= \frac{6}{3} \quad =2 \end{aligned}$$

La fonction est donc de la forme $f(x)=2x+p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des valeurs, par exemple $f(2)=5$:

$$\begin{aligned} 2\times(2)+p=5 &\Leftrightarrow 4+p=5 \\ &\Leftrightarrow p=1 \end{aligned}$$


Conclusion : $f(x)=2x+1$

2.5. Sens de variation


Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....

Soit $f(x)=mx+p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation d'une fonction affine f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m>0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m<0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m=0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*



Fonction croissante



Fonction décroissante

Exemple :

- Pour la fonction $f(x)=2x+15$ (compagnie A), on a $m=2>0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x)=-1,5x+50$, on a $m=-1,5<0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si** $m>0$ **(Croissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↗	

Si** $m<0$ **(Décroissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↘	


2.6. Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ *avec* $m \neq 0$. *L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :*

$$x = \frac{-p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ *est donné par la règle suivante :* ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*



Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

2.7. Résolution d'équations et d'inéquations

2.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3{,}50x$ (Compagnie B)


À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 = 3{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 1{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{15}{1{,}50} = 10 \end{aligned}$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).



2.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....


En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 < 3{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 1{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & x > \frac{15}{1{,}50} \\ \Leftrightarrow \quad & x > 10 \end{aligned}$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.



3. Fonctions du 2nd degré

3.1. Définition et exemples

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction polynôme du second degré** ou plus simplement **trinôme**.

Exemple :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$
- $h(x) = 4 - 2x^2$

sont des fonctions polynômes de degré 2.

Contre-exemples :


- $k(x) = (x-4)(5-2x) \quad = (-2x^2 + 13x - 20)$ est une fonction polynôme de degré 1 (fonction affine).
- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

3.2. Représentation graphique

3.2.1. Parabole

Définition (Parabole)


La représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.



Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré, telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$

- *Si a est **positif** ($a > 0$), f est d'abord **décroissante**, puis **croissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le haut.*
- *Si a est **négatif** ($a < 0$), f est d'abord **croissante**, puis **décroissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas.*




3.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$

Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad avec \quad a \neq 0 \quad et \quad c \in \mathbb{R}$$

- *L'**axe des ordonnées** (la droite d'équation $x = 0$) est l'**axe de symétrie** de la parabole.*
- *Le **sommet** S de la parabole est le point de coordonnées $S(0\,;\,c)$.*
- *Si $a > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut et c est le **minimum** de f.*
- *Si $a < 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le bas et c est le **maximum** de f.*



Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8$.
Ici, $a = 2 > 0$ et $c = -8$.

- La courbe $\mathscr{C}_f$ est une parabole admettant l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Son sommet est le point $S(0\,;\,-8)$.

3.3.1. Variations

Propriété .....

Pour une fonction $f(x) = ax^2 + c$, l'extremum est atteint en $x = 0$ et a pour valeur $f(0) = c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	c	↗ $+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	c	↘ $-\infty$

Exemple :

Pour la fonction $f(x) = 2x^2 - 8$, comme $a = 2 > 0$, la fonction est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Son minimum vaut -8 et est atteint en $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-8	↗ $+\infty$

3.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$

Définition (Racines d'une fonction) .....

On appelle **racine** d'une fonction f tout nombre réel x solution de l'équation :

$$f(x) = 0$$

Interprétation graphique : Les racines de la fonction f sont les **abscisses des points d'intersection** de sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

Méthode (Résolution de l'équation $f(x) = 0$ et étude du signe) .....

Pour déterminer le signe d'une fonction $f(x) = ax^2 + c$, on cherche d'abord ses éventuelles racines en résolvant l'équation $f(x) = 0$, ce qui revient à résoudre une équation de la forme $x^2 = k$.

Étudions le signe de :

$$f(x) = 2x^2 - 8$$

1. **Résolution de l'équation $f(x) = 0$:**

$$\begin{array}{rlcl} & 2x^2 - 8 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 & = & 8 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 4 \end{array}$$

L'équation $x^2 = 4$ possède deux solutions positives et négatives :

- $x_1 = \sqrt{4} = 2$
- $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

Les racines de f sont donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$.

2. **Tableau de signes :**


Puisque $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut.

La fonction est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$

3. **Représentation grapnhique :**

Voici la courbe représentative de $f(x) = 2x^2 - 8$.



On retrouve bien :

- L'intersection avec l'axe des ordonnées au sommet $S(0;-8)$.
- Les points d'intersection avec l'axe des abscisses aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 2$.
- La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

3.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré

3.4.1. Définition et racines

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

… est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme factorisée**.

Les coefficients a, x_1 et x_2 sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Propriété


Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions (éventuellement égales) : $x = x_1$ et $x = x_2$.

*Ces nombres x_1 et x_2 sont appelés les **racines** de la fonction polynôme f.*

*Graphiquement, les racines x_1 et x_2 correspondent aux **abscisses des points d'intersection** de la parabole avec l'axe des abscisses.*




3.4.2. Axe de symétrie et sommet

Propriété

Soit f une fonction sous forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$.

- *La droite d'équation $x = p$ avec $p = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ (la moyenne des racines) est **l'axe de symétrie** de $\mathscr{C}_f$.*
- *Les coordonnées du **sommet** S de la parabole sont : $S\big(p\,;\,f(p)\big)$.*



3.4.3. Variations

Propriété

Le sens de variations d'une fonction du second degré sous forme factorisée dépend directement du signe du coefficient a :

- *Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est d'abord décroissante, puis croissante.*
  *La fonction possède un **minimum**.*
- *Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f est d'abord croissante, puis décroissante.*
  *La fonction possède un **maximum**.*

Si $a > 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(p)$	↗	$+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(p)$	↘	$-\infty$

3.4.4. Exemple complet d'étude

Méthode (Exploiter la forme factorisée d'une fonction)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2(x-2)(x+4)$$

Déterminons ses intersections avec l'axe des abscisses, son axe de symétrie, son sommet, ses variations, son signe et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines et intersections avec l'axe des abscisses :**
   On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0$.
   Il s'agit d'une équation-produit :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

   Les racines de f sont $x_1 = -4$ et $x_2 = 2$.
   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en ces points.
2. **Axe de symétrie :**
   L'abscisse p de l'axe de symétrie est la moyenne des deux racines :

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

   La droite d'équation $x = -1$ est l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.
3. **Coordonnées du sommet :**
   Le sommet S a pour abscisse $p = -1$ et pour ordonnée $f(-1)$:

$$f(-1) = 2(-1-2)(-1+4) = 2 \times (-3) \times 3 = -18$$

   Le sommet est donc le point $S(-1\,;-18)$.
4. **Variations :**
   Puisque $a = 2 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut.
   Le sommet S est donc un minimum.


x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-18	↗	$+\infty$

5. **Étude du signe :**
   Le coefficient $a = 2$ est positif.
   Le signe de $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :
   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-4\,;2]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$

6. **Représentation graphique :**



3.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré

3.5.1. Définition et signe

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$, est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme développée** (ou forme polynôme).

Pour étudier une telle fonction (recherche de racines, variations, signe, extremum), on utilise le **discriminant**.

Propriété

Soit l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
Le nombre de solutions dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- *Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes (les **racines** de f) :*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.*

Propriété

Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
Le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ et du coefficient a :

- ***Si** $\Delta > 0$ **:***
  f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
  Le signe de a est situé à « l'extérieur des racines ».

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	

- ***Si*** $\Delta = 0$ ***:***
  f admet une unique racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
  La fonction est toujours du signe de a (sauf en x_0 où elle s'annule).

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*		0	*signe de a*	

- ***Si*** $\Delta < 0$ ***:***
  f n'admet aucune racine réelle.
  La fonction est constamment du signe de a sur tout $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*	

3.5.2. Sommet et variations

Propriété
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- *L'abscisse du sommet S de la parabole est donnée par $p = \dfrac{-b}{2a}$.*
- *Les coordonnées du sommet S sont donc $S\big(p; f(p)\big)$.*
- *Le sens de variations de f dépend du signe de a :*
  - *Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum en p)*
  - *Si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum en p)*

3.5.3. Exemple complet d'étude

Méthode
Étudier une fonction sous forme développée Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Étudions ses racines, ses variations, son signe, son sommet et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines (résolution de $f(x) = 0$) :**
   On a $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$. Calculons le discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \quad = 16 \end{aligned}$$

   Puisque $\Delta = 16 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes (les racines) :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2+4}{2} \quad = 3 \end{aligned} \qquad \text{et} \qquad \begin{aligned} x_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2-4}{2} \quad = -1 \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.

2. **Coordonnées du sommet :**

   L'abscisse p du sommet est :

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\times 1} = 1$$

   L'ordonnée du sommet est :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 - 2\times(1) - 3 \\ &= 1 - 2 - 3 \quad = -4 \end{aligned}$$

   Le sommet de la parabole est donc le point $S(1\,;-4)$.

3. **Variations :**

   Puisque $a = 1 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Le sommet S est un minimum.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

4. **Étude du signe :**


   Le signe de a ($a = 1 > 0$) est à l'extérieur des racines -1 et 3 :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :

   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-1\,;3]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[$

5. **Représentation graphique :**



4. Fonctions du 3ème degré

4.1. Généralités et définitions

4.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré

Définition (Fonction du 3ème degré) .....
Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto ax^3 \qquad \text{ou} \qquad x \longmapsto ax^3 + b$$

… sont des **fonctions du 3ème degré**.
Les coefficients a et b sont des réels donnés avec $a \neq 0$.


- **Exemples**
  - $f(x) = 4x^3 + 1$
  - $g(x) = x^3 - 2$
  - $h(x) = 1 + x^2 - 2x^3$
- **Contre-exemples**
  - $m(x) = -x + 4$ … est une fonction affine
  - $n(x) = 2x^5 - x^3 + 5x - 1$ … est une fonction du 5ème degré


4.1.2. Représentation graphique et sens de variation

Propriété (Variations des fonctions $x \mapsto ax^3 + b$) .....
Soit f une fonction du 3ème degré, telle que :

$$f(x) = ax^3 + b$$

- *Si $a > 0$: f est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$: f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*





4.2. Forme factorisée, racines et étude de signe

4.2.1. Forme factorisée et racines

Exemple (Passage de la forme factorisée à la forme développée) *:*

La fonction f définie par $f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3)$ est une fonction du 3ème degré sous sa forme **factorisée**.

Si on développe l'expression de f, on obtient bien l'expression d'un polynôme du 3ème degré :

$$\begin{aligned} f(x) &= 5(x-4)\underbrace{(x-1)(x+3)} \\ &= 5\underbrace{(x-4)(x^2+2x-3)} \\ &= \underbrace{5(x^3-2x^2-11x+12)} \\ &= 5x^3-10x^2-55x+60 \end{aligned}$$

Définition (Forme factorisée) .....

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

... sont des fonctions du 3ème degré sous **forme factorisée**.

Les nombres a, x_1, x_2 et x_3 sont des réels avec $a \neq 0$.

Propriété (Racines et intersection avec l'axe des abscisses) .....


Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$.

L'équation $f(x) = 0$ possède trois solutions (éventuellement égales) :

$$S = \{x_1\,;\, x_2\,;\, x_3\}$$

*Ces solutions sont appelées les **racines** de la fonction f.*

Graphiquement, dire que x_1, x_2 et x_3 sont les racines de f signifie que la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en trois points de coordonnées respectives $(x_1\,;0)$, $(x_2\,;0)$ et $(x_3\,;0)$.



Exemple (Vérification des racines et représentation graphique) *:*


Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3) \quad = 5x^3-10x^2-55x+60$$

On peut vérifier par le calcul que -3, 1 et 4 sont des racines de f :

- $f(-3) = 5\times(-3)^3 - 10\times(-3)^2 - 55\times(-3) + 60 = -135 - 90 + 165 + 60 = 0$
- $f(1) = 5\times 1^3 - 10\times 1^2 - 55\times 1 + 60 = 5 - 10 - 55 + 60 = 0$
- $f(4) = 5\times 4^3 - 10\times 4^2 - 55\times 4 + 60 = 320 - 160 - 220 + 60 = 0$

Les nombres -3, 1 et 4 sont donc les racines de f.
Sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses en ces trois mêmes valeurs :



4.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré

Propriété (Allure générale et extremums) .....

Soit f une fonction du 3ème degré définie sur $\mathbb{R}$.

Lorsque la fonction f admet deux extremums locaux distincts atteints en α et β (avec $\alpha < \beta$), ses variations sont données par les tableaux ci-dessous :

Cas $a > 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↗	$f(\alpha)$	↘	$f(\beta)$	↗	

Cas $a < 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	

Remarque :

Pour les fonctions particulières de la forme $f(x) = ax^3 + b$, la fonction n'admet pas deux extremums locaux et est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (strictement croissante si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$).

4.2.3. Méthode : Étude du signe

Méthode (Étude du signe d'une fonction du 3ème degré) .....

Étudions le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$

Le signe de $2(x+1)(x-2)(x-5)$ dépend du signe des facteurs $(x+1)$, $(x-2)$ et $(x-5)$ et du signe de a.

On étudie ainsi le signe de chaque facteur et on présente les résultats dans un tableau de signes.

- $x+1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$
- $x-2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2$
- $x-5 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 5$


Les nombres -1, 2 et 5 sont donc les racines de f.

En appliquant la règle des signes dans le tableau ci-dessous, on en déduit le signe de $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$a = 2$		$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit que :

- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in [-1\,;2] \cup [5\,;+\infty[$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [2\,;5]$



4.3. Équations du type $x^3 = c$

4.3.1. Propriétés

Propriété (Résolution de l'équation $x^3 = c$) .....

*L'équation $x^3 = c$, avec c positif, possède une **unique** solution $\sqrt[3]{c}$.*
Cette solution peut également se calculer à l'aide de $\sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$.

$$x^3 = c \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$$

4.3.2. Méthodes de résolution

Méthode (Résoudre une équation du type $x^3 = c$) .....

- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^3 = 27$:**
  On cherche le nombre qui, élevé au cube, donne 27.
  Ce nombre est égal à la **racine cubique** de 27, soit $x = \sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$.
  Vérification :
  Comme $3^3 = 27$, 3 est bien une solution. C'est la seule et unique solution de l'équation.
- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^3 - 6 = 16$:**
  Pour résoudre cette équation, il faut se ramener à la forme $x^3 = c$:

$$\begin{array}{rrcl} & 2x^3 - 6 & = & 16 \\ \Leftrightarrow & 2x^3 & = & 22 \\ \Leftrightarrow & x^3 & = & 11 \\ \Leftrightarrow & x & = & \sqrt[3]{11} = 11^{\frac{1}{3}} \approx 2,22398 \end{array}$$

5. Dérivation

5.1. Nombre dérivé

5.1.1. Taux de variation et nombre dérivé


Définition (Taux de variation)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I

Soient x_A et h deux réels tels que $h \neq 0$, $x_A \in I$ et $(x_A + h) \in I$.

Le **taux de variation** de f entre x_A et $(x_A + h)$ est le nombre :

$$\frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$




Définition (Nombre dérivé)

Lorsque le taux de variation tend vers un réel quand h tend vers 0, on dit que f admet un **nombre dérivé** en x_A. Ce nombre dérivé est noté $f'(x_A)$.

On dit aussi que f est **dérivable** en x_A, et on a :

$$f'(x_A) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$



Exemple (Calculer un nombre dérivé à l'aide du taux de variation) *:*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

On cherche à calculer le nombre dérivé de f en 3.

- On calcule le taux de variation pour $x_A = 3$ en fonction de h :

$$\begin{aligned} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{(3+h)^2-3^2}{h} \\ &= \frac{9+6h+h^2-9}{h} \\ &= \frac{6h+h^2}{h} \qquad = 6+h \end{aligned}$$

- On fait tendre h vers 0 : le taux tend vers 6 quand h tend vers 0.


Donc 6 est le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en 3, et on note $f'(3) = 6$.

5.2. Tangente à une courbe

5.2.1. Définition et coefficient directeur

Définition (Tangente à une courbe) .....

Si f est dérivable en x_A, la **tangente** en A à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A est la droite obtenue comme position limite des droites sécantes à la courbe passant par le point d'abscisse x_A et le point d'abscisse $x_A + h$.



Propriété (Coefficient directeur de la tangente) .....


Soit f une fonction dérivable en x_A.

La tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A d'abscisse x_A :

- *… passe par le point $A\big(x_A ; f(x_A)\big)$;*
- *… a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(x_A)$.*

On retient ainsi que :

$$f'(x_A) = \textit{coef. dir. de la tangente en } A$$



5.2.2. Équation de la tangente

Propriété (Équation réduite de la tangente) .....
Soit f une fonction définie et dérivable sur I.
La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A a pour équation :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$$

Exemple (Calculer l'équation réduite de la tangente en un point) *:*
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2$.
Déterminons l'équation réduite de la tangente à sa courbe représentative au point d'abscisse $x_A = 1$.

1. **Calcul de l'ordonnée du point de contact $f(x_A)$:**

$$f(1) = 1^2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

Le point de contact a pour coordonnées $A(1\,;3)$.

2. **Calcul du nombre dérivé $f'(1)$ à l'aide du taux de variation :**
On calcule le taux de variation de f entre 1 et $1+h$ (avec $h \neq 0$) :

$$\begin{aligned}\frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{\left((1+h)^2+2\right)-(1^2+2)}{h}\\ &= \frac{1+2h+h^2+2-3}{h}\\ &= \frac{2h+h^2}{h} \qquad = \frac{h(2+h)}{h} \qquad = 2+h\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers 2.
On en déduit que $f'(1) = 2$. Le coefficient directeur de la tangente est donc égal à 2.


3. **Détermination de l'équation de la tangente :**
L'équation réduite de la tangente en $x_A = 1$ est donnée par la formule :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

En injectant nos valeurs ($x_A = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$) :

$$\begin{aligned}y &= 2 \times (x-1) + 3\\ &= 2x - 2 + 3\\ &= 2x + 1\end{aligned}$$

L'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est donc $y = 2x + 1$.



5.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles

5.3.1. Fonction dérivée

Définition (Fonction dérivée)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
La fonction f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout réel x de I.
La fonction qui, à tout $x \in I$, associe le nombre dérivé $f'(x)$, est appelée **fonction dérivée** de f.
Cette fonction est notée f'.

5.3.2. Dérivées des fonctions usuelles

Propriété (Dérivées de fonctions usuelles)

Ce tableau indique les fonctions dérivées des fonctions les plus souvent rencontrées :

$f(x)$	k ($k \in \mathbb{R}$)	x	x^2	x^3
$f'(x)$	0	1	$2x$	$3x^2$

5.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables

Propriété (Somme de fonctions)

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I.
Alors $u+v$ est définie et dérivable sur I et :

$$(u+v)' = u' + v'$$

La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.

Propriété (Multiplication par un nombre réel)

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et k un nombre réel.
Alors ku est définie et dérivable sur I et :

$$(ku)' = ku'$$

Si une fonction est multipliée par une constante, celle-ci est conservée lors de la dérivation.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 6x^2 + 1$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccc} f(x) & = & 6\times & x^2 & + & 1 & \\ \Leftrightarrow f'(x) & = & 6\times & 2x & + & 0 & \Leftrightarrow f'(x) = 12x \end{array}$$

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccccccc} f(x) & = & 3\times & x^3 & - & 5\times & x^2 & + & 2\times & x & - & 7 \\ \Leftrightarrow f'(x) & = & 3\times & 3x^2 & - & 5\times & 2x & + & 2\times & 1 & - & 0 \end{array} \quad \Leftrightarrow f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$$

5.4. Étude des variations d'une fonction

Propriété (Lien entre dérivée et variations) .....
Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **croissante** sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **décroissante** sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....
Pour étudier le sens de variation d'une fonction f dérivable sur un intervalle I :

1. Calculer la fonction dérivée $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur I (en résolvant notamment l'équation $f'(x) = 0$).
3. Conclure sur le sens de variation de f et dresser le tableau de variations.


Exemple (Étude d'une fonction et de sa tangente) *:*
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 1$$

1. **Étude des variations de f :**
   - La fonction dérivée est :
   $$f'(x) = 2 \times 2x - 8 \times 1 + 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(x) = 4x - 8$$
   - Signe de $f'(x)$:
   $$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 4x - 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$
   La dérivée est négative avant 2 et positive après 2.
   - Tableau de variations :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	

   On a :
   $$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 1 = -7$$
   La fonction f admet un minimum égal à -7 en $x = 2$.
2. **Équation de la tangente au point d'abscisse $x_A = 3$:**
   - Ordonnée du point de contact :
   $$\begin{aligned} f(3) &= 2(3)^2 - 8(3) + 1 \\ &= 18 - 24 + 1 \qquad = -5 \end{aligned}$$
   Le point de contact est $A(3; -5)$.
   - Nombre dérivé $f'(3)$:
   $$f'(3) = 4 \times (3) - 8 = 12 - 8 = 4$$
   - Équation réduite :
   $$\begin{aligned} y &= f'(3)(x-3) + f(3) \\ &= 4(x-3) - 5 \\ &= 4x - 12 - 5 \qquad \Leftrightarrow y = 4x - 17 \end{aligned}$$


y
x
0
2
3
−5
−7
A
Mini.
$\mathscr{C}_f$
T
4
1

Deuxième partie

Statistiques et probabilités

6. Proportion et évolution pourcentage

6.1. Proportion et pourcentage


6.1.1. Proportion

Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.
La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.



Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.
La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction : 1. 12 % de 75 $= \dfrac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.


2. La proportion de femmes est :
$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$
3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :
$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$
Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

6.1.2. Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage)

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.

Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :
$$p_3 = p_1 \times p_2$$



Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a 40 % de scolaires. Parmi les scolaires, 60 % sont des filles.
La proportion de filles scolaires dans le bus est :
$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

6.2. Évolution exprimée en pourcentage

6.2.1. Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution)

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.
Le **taux d'évolution** t est donné par :
$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

$$V_i \longrightarrow \boxed{\textbf{Taux } t} \longrightarrow V_f$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400. Le taux d'évolution est :


$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

6.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, appelé ***coefficient multiplicateur*** *(CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$



Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$


6.3. Évolutions successives et taux global

6.3.1. Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** *CM_g est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$



Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20 % puis une hausse de 30 %.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\,\%$ (soit une augmentation de $4\,\%$).

6.3.2. Taux d'évolution réciproque


Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$



Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de $20\,\%$ ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\,\%$. Pour compenser une baisse de $20\,\%$, il faut donc une augmentation de $25\,\%$.

6.4. Indices base 100

6.4.1. Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100.

Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1 + t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{364 - 350}{350} = \frac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$$

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de 4 %.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 :

$$I_{2018} = 100 \times \frac{5149}{4376} \approx 117,7$$

- Pour 2019 :

$$I_{2019} = 100 \times \frac{4813}{4376} \approx 110,0$$

Interprétation :

- L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de 17,7 % du nombre de visites par rapport à 2017.
- L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de 10 % par rapport à l'année de référence 2017.

7. Probabilité conditionnelle

7.1. Notions fondamentales de probabilité

7.1.1. Définition et propriétés

Définition

Dans le cadre de l'étude des probabilités :

- Une **expérience aléatoire** est une épreuve dont le résultat dépend du hasard et ne peut pas être prédit avec certitude avant qu'elle ne soit réalisée.
- Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- L'**univers**, noté Ω, est l'ensemble de toutes les issues possibles de cette expérience.
- Un **événement** est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble constitué d'une ou de plusieurs issues.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces :

- L'**expérience aléatoire** est le lancer du dé.
- Une **issue** est l'obtention d'un nombre (par exemple, le ⚂).
- L'**univers** est l'ensemble de tous les résultats possibles : $\Omega = \{⚀; ⚁; ⚂; ⚃; ⚄; ⚅\}$.
- Un **événement** est par exemple A : « obtenir un nombre pair », ce qui correspond à la partie $\{⚁; ⚃; ⚅\}$.

Définition

La **probabilité d'une issue** correspond à la fréquence à laquelle cette issue se réalise si on répète l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois (fréquence stabilisée à long terme).

Exemple :

Si on choisit une personne au hasard en France, la proportion de gauchers étant estimée à $14\,\%$, la probabilité de choisir une personne gauchère est de $0,14$.

Exemple :

On considère une classe de 30 élèves comprenant 18 filles et 12 garçons. On choisit un élève au hasard.

L'univers de cette expérience aléatoire est $\Omega = \{\text{Fille}, \text{Garçon}\}$.

Les deux issues ne sont pas équiprobables :

- La probabilité de l'issue « Fille » est : $\text{P}(\text{Fille}) = \dfrac{18}{30} = \dfrac{3}{5} = 0,6$
- La probabilité de l'issue « Garçon » est : $\text{P}\big(\text{Garçon}\big) = \dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5} = 0,4$

Définition

Soit une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.

Définir une **loi de probabilité**, c'est associer à chaque issue e_i un nombre réel p_i, appelé probabilité de l'issue, tel que :

- $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ pour chaque issue e_i ;
- La somme de toutes les probabilités est égale à 1 : $\quad p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

Remarque :

Cette loi est généralement présentée sous la forme d'un tableau :

Issue e_i	e_1	e_2	…	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	…	p_n

Exemple :

Reprenons l'exemple de la classe composée de 18 filles et 12 garçons (30 élèves en tout).

Si on choisit un élève au hasard, la loi de probabilité associée à cette expérience est donnée par le tableau suivant :

Issue e_i	Fille	Garçon
Probabilité p_i	$\frac{18}{30} = 0{,}6$	$\frac{12}{30} = 0{,}4$

On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 : $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

Propriété

Soit A un événement d'une expérience aléatoire.

Si A est constitué des issues $e_1, e_2, \ldots, e_k$, alors la probabilité de l'événement A est donnée par :

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(e_1) + \mathrm{P}(e_2) + \cdots + \mathrm{P}(e_k)$$

C'est-à-dire que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Remarque :

Par convention, la probabilité de l'événement impossible, noté $\emptyset$, est égale à 0.

Propriété

Soit une expérience aléatoire définie sur un univers $\Omega = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

Issue e_i	e_1	e_2	…	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	…	p_n

- *La somme des probabilités de toutes les issues est toujours égale à 1 :*

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \mathrm{P}(\Omega) = 1$$

- *La probabilité de l'événement contraire $\overline{A}$ se calcule par :*

$$\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathrm{P}(A)$$

Exemple :

- **Expérience aléatoire :** Lancer un dé à 6 faces.
- **Univers :** $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- **Événement** E **:** « On obtient un nombre pair »

$$E = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$$

- **Calcul de probabilité :**

$$\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}\left(\boxdot\right) + \mathrm{P}\left(\boxdot\right) + \mathrm{P}\left(\boxdot\right) = \frac{3}{6} = 0{,}5$$

- **Événement contraire** $\overline{E}$ **:** « Obtenir un nombre impair »

$$\mathrm{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathrm{P}(E) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

7.1.2. Intersection et union d'événements

Propriété

Soient A et B deux événements d'une même expérience aléatoire.

- ***Intersection*** *($A \cap B$)* **:**
  L'événement « A et B », noté $A \cap B$, est constitué de toutes les issues qui réalisent ***à la fois*** *l'événement A* ***et*** *l'événement B.*
- ***Union*** *($A \cup B$)* **:**
  L'événement « A ou B », noté $A \cup B$, est constitué de toutes les issues qui réalisent l'événement A, l'événement B, ***ou les deux en même temps****.*

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces, dont l'univers est noté Ω.
On a :

$$\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$$

Soit les événements :

- E : « Obtenir un nombre pair » $\Rightarrow E = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- F : « Obtenir au plus 4 » $\Rightarrow F = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$

1. **Intersection d'événements (« ET »)**
   Soit G l'événement : « Obtenir un nombre pair **et** au plus 4 ».
   On a $G = E$ et F, noté plus simplement $G = E \cap F$.
   Les issues réalisant à la fois E et F sont $\boxdot$ et $\boxdot$, donc $G = \{\boxdot; \boxdot\}$.

$$P(G) = P(E \cap F) = P(\boxdot) + P(\boxdot) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2. **Union d'événements (« OU »)**
   Soit H l'événement : « Obtenir un nombre pair **ou** au plus 4 ».
   On a $H = E$ ou F, noté $H = E \cup F$.
   Cet événement rassemble toutes les issues qui réalisent E, F, ou les deux, donc $H = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$.

$$\begin{aligned} P(H) &= P(E \cup F) \\ &= P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) \\ &= \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \end{aligned}$$

Propriété


Soient A et B deux événements d'une même expérience aléatoire. Pour tous événements A et B, on a la relation :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple :

On tire une boule dans l'urne ci-contre.
On a :

$$\Omega = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\}$$





On définit les événements suivants :

- A : « Tirer une boule portant le numéro 1 ou 2 » $\Rightarrow A = \{1\,;\,2\}$
- C : « Tirer une boule portant le numéro 1 ou 3 » $\Rightarrow C = \{1\,;\,3\}$

Calculs de probabilités et relations :

- **Probabilité de A et C :**
$$\mathrm{P}(A) = \frac{4}{8} = 0{,}5 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(C) = \frac{5}{8} = 0{,}625$$
- **Événement contraire $\overline{A}$:** « Ne pas être dans A »
$$\overline{A} = \{3\,;4\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \frac{4}{8} = 0{,}5$$
- **Intersection $A \cap C$:** « Être à la fois dans A et dans C »
$$A \cap C = \{1\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}(A \cap C) = \frac{2}{8} = 0{,}25$$
- **Union $A \cup C$:** « Être dans A ou dans C »
$$A \cup C = \{1\,;2\,;3\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}(A \cup C) = \frac{7}{8} = 0{,}875$$
- **Diagramme de Venn**





7.2. Probabilité conditionnelle

7.2.1. Définition

Définition

Dans une population ou un ensemble réparti selon deux critères :

- Une **fréquence marginale** correspond au rapport entre l'effectif d'une sous-population totale (considérant un seul critère) et l'effectif total de l'étude.
- Une **fréquence conditionnelle** correspond au rapport entre l'effectif d'une sous-population satisfaisant à la fois plusieurs critères et l'effectif restreint à une condition particulière.

Exemple :

Sur un groupe de 100 élèves, 40 sont des filles et 15 filles jouent au tennis.

- La **fréquence marginale** des filles est $\dfrac{40}{100} = 0{,}4$.
- La **fréquence conditionnelle** des joueuses de tennis parmi les filles est $\dfrac{15}{40} = 0{,}375$.

7.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé

Méthode (Déterminer une fréquence conditionnelle / marginale) .....

Dans une entreprise qui compte 360 employés, on compte :

- 60% d'hommes et parmi ceux-là, 12,5% sont des cadres.
- Par ailleurs, 87,5% des femmes de cette entreprise sont ouvrières ou techniciennes.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un tableau d'effectifs.
2. Calculer la fréquence marginale des cadres.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des ouvriers et techniciens parmi les hommes.

Correction :

1. Avec l'énoncé, le tableau d'effectif est le suivant :

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	$12,5\% \times 216 = 27$	$144 - 126 = 18$	$27 + 18 = 45$
Ouvriers	$216 - 27 = 189$	$87,5\% \times 144 = 126$	$189 + 126 = 315$
Total	$60\% \times 360 = 216$	$360 - 216 = 144$	360

2. La **fréquence marginale** se lit en "marge" du tableau.

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	27	18	45
Ouvriers	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 360 employés en tout et 45 sont des cadres.
La **fréquence marginale** de cadres est donc égale à :

$$\frac{45}{360} = 0,125 = 12,5\%$$

3. La **fréquence conditionnelle** restreint l'effectif total.
Calculons la fréquence **conditionnelle d'ouvriers, techniciens** parmi les hommes.
Ici, on ne considère que les hommes car la "condition" est "parmi les hommes".
La **fréquence conditionnelle** se lit sur **une ligne ou une colonne intérieure** du tableau.
Ici, on ne va donc considérer que la colonne concernant les hommes (condition).

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	27	18	45
Ouvriers	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 216 hommes en tout et parmi eux, 189 sont des ouvriers, techniciens.
La fréquence **conditionnelle d'ouvriers, techniciens** parmi les hommes est :

$$\frac{189}{216} = 0,875 = 87,5\%$$

Définition .....

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise **sachant que** l'événement A est réalisé.

On la note :

$$\mathrm{P}_A(B)$$

Remarque :

Probabilité de B…

$$\mathrm{P}_A(B)$$

… sachant que A est réalisé

Méthode (Calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau croisé) .....

Dans une classe, la répartition des élèves selon leur genre et la marque de leur téléphone est donnée par le tableau suivant :

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

- **Expérience aléatoire :** On choisit un élève au hasard dans la classe.
- **Événements :**
  - A : « L'élève a un téléphone **Apple** »
  - G : « L'élève est un **garçon** »

1. Probabilités simples et d'intersections

   - $\mathrm{P}(A)$: Probabilité que l'élève choisi possède un téléphone Apple :

$$\mathrm{P}(A) = \frac{21}{30} = 0,7$$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

   - $\mathrm{P}(A \cap G)$: Probabilité que l'élève choisi soit un garçon **et** possède un téléphone Apple :

$$\mathrm{P}(A \cap G) = \frac{11}{30}$$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

2. Probabilités conditionnelles (sachant que)

   - Calculer la probabilité que l'élève soit un garçon **sachant qu'**il possède un téléphone Apple.

     ⇒ **Notation :** $P_A(G)$ (Probabilité de G sachant A).

     ⇒ **Calcul :** $P_A(G) = \dfrac{11}{21} \approx 0,5238$

	Filles	**Garçons**	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

   - Calculer la probabilité que l'élève possède un téléphone Apple **sachant qu'**il s'agit d'une fille.

     ⇒ **Notation :** $P_{\overline{G}}(A)$ (Probabilité de A sachant $\overline{G}$).

     ⇒ **Calcul :** $P_{\overline{G}}(A) = \dfrac{10}{17} \approx 0,5882$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

3. Calcul de $P_{\overline{A}}\left(\overline{G}\right)$

   C'est la probabilité de $\overline{G}$ sachant que $\overline{A}$ est réalisé.

$$P_{\overline{A}}\left(\overline{G}\right) = \frac{7}{9} \approx 0,777$$

Parmi les élèves qui n'ont pas de téléphone Apple, 77,7% élèves sont des filles.

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

7.2.3. Calcul à l'aide de la formule

Remarque :

On note $\text{Card}(A)$ le nombre d'issues de l'événement A.

Propriété

Les effectifs conjoints et marginaux associés à deux événements A et B se résument dans le tableau croisé suivant :

	B	$\overline{B}$	***Total***
A	$\text{Card}(A \cap B)$	$\text{Card}\left(A \cap \overline{B}\right)$	$\text{Card}(A)$
$\overline{A}$	$\text{Card}\left(\overline{A} \cap B\right)$	$\text{Card}\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$	$\text{Card}\left(\overline{A}\right)$
Total	$\text{Card}(B)$	$\text{Card}\left(\overline{B}\right)$	$\text{Card}(\Omega)$

Propriété

Soient A et B deux événements d'une expérience aléatoire, avec $\mathrm{P}(A) \neq 0$.

*La **probabilité conditionnelle** de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé est donnée par :*

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

*Dans le cas où les issues de l'expérience sont **équiprobables**, cette formule s'exprime à l'aide des effectifs :*

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{Card}(A \cap B)}{\mathrm{Card}(A)}$$

Remarque :

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

Exemple (Étude pharmaceutique) *:*

Une étude pharmaceutique est réalisée sur un échantillon de 800 patients afin d'évaluer l'efficacité de deux nouveaux traitements.

Au cours de cet essai, les patients ont reçu soit le médicament A, soit le médicament B.

L'objectif est d'observer l'issue du traitement, en comptabilisant le nombre de personnes guéries et non guéries pour chacun des deux médicaments.

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau croisé ci-dessous :

	Médicament A	Médicament B	**Total**
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

On choisit un patient au hasard parmi ces 800 patients et on considère les événements suivants :

- A : « Le patient a pris le médicament A. »
- B : « Le patient a pris le médicament B. »
- G : « Le patient est guéri. »

	Médicament A	Médicament B	**Total**
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

On cherche la probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri**.

Calculons $\mathrm{P}_G(A)$:

$$\mathrm{P}_G(A) = \frac{\mathrm{Card}(G \cap A)}{\mathrm{Card}(G)} = \frac{383}{674} \approx 0,568$$

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** est d'environ $0,568$ (soit environ $56,8\%$).

8. Arbres et loi de Bernoulli


8.1. Représentation par un arbre pondéré

8.1.1. Modélisation

Méthode (Construire et utiliser un arbre) .....

Un arbre pondéré permet de visualiser les probabilités conditionnelles.

- Le 1er niveau donne les probabilités simples : $\mathrm{P}(A)$ et $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$.
- Le 2e niveau donne les probabilités conditionnelles : $\mathrm{P}_A(B)$, $\mathrm{P}_A\left(\overline{B}\right)$, etc.




Exemple :

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules **rouges** et 30 boules **noires**, marquées soit « Gagné » soit « Perdu ».

- Sur 15 rouges, il est marqué Gagné.
- Sur 9 noires, il est marqué Gagné.

Soient les événements :

- R : « On tire une boule rouge »
- G : « On tire une boule marquée Gagné »



Remarque :


On peut également modéliser cette situation à l'aide d'un tableau à double entrée :

	Gagné : G	Perdu : $\overline{G}$	**Total**
Rouge : R	15	5	20
Noir : $\overline{R}$	9	21	30
Total	24	26	50

8.1.2. Propriétés

Propriété (Règle n° 1) .....

La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud est égale à 1.




Exemple :

$P(R) + P\left(\overline{R}\right) = 1 \Longrightarrow$ « Soit on tire une boule rouge, soit une noire »

Propriété (Règle n° 2) .....

*La probabilité d'une « feuille » (extrémité d'un chemin) est égale au **produit** des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.*




Exemple :

On considère la feuille $R \cap G$:

$$P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$$

Propriété (Règle n° 3 : "Probabilités totales") .....

*La probabilité d'un événement associé à plusieurs « feuilles » est égale à la **somme** des probabilités de chacune de ces « feuilles ».*



Exemple :


L'événement G (« On tire une boule marquée Gagné ») est associé aux feuilles $R \cap G$ et $\overline{R} \cap G$.

$$\begin{aligned} P(G) &= P(R \cap G) + P\left(\overline{R} \cap G\right) \\ &= 0,3 + (0,6 \times 0,3) \\ &= 0,3 + 0,18 \qquad = 0,48 \end{aligned}$$

Méthode (Calculer la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles) .....

Dans une classe, il y a 65% de filles.
Un tiers des filles portent les cheveux courts, ainsi que 4 garçons sur 5.
On choisit un élève au hasard.

- F : « l'élève choisi est une fille »
- L : « l'élève choisi a les cheveux longs »



Calculons $\mathrm{P}(L)$:

- $\mathrm{P}(F \cap L) = \mathrm{P}(F) \times \mathrm{P}_F(L) = 0{,}65 \times \dfrac{2}{3} \Longrightarrow$ « Filles aux cheveux longs »
- $\mathrm{P}\left(\overline{F} \cap L\right) = \mathrm{P}\left(\overline{F}\right) \times \mathrm{P}_{\overline{F}}(L) = 0{,}35 \times \dfrac{1}{5} \Longrightarrow$ « Garçons aux cheveux longs »

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(L) &= \mathrm{P}(F \cap L) + \mathrm{P}\left(\overline{F} \cap L\right) \\ &= 0{,}65 \times \frac{2}{3} + 0{,}35 \times \frac{1}{5} = \frac{151}{300} \end{aligned}$$

Méthode (Modéliser, compléter et calculer avec un arbre de probabilités) .....

Dans une entreprise de fabrication de composants électroniques, deux chaînes de production approvisionnent le stock :

- La ligne A produit 60 % des composants.
- La ligne B produit le reste des composants.

Des tests de contrôle qualité révèlent que :


- 5 % des composants produits par la ligne A présentent un défaut.
- 2 % des composants produits par la ligne B présentent un défaut.

On prélève un composant au hasard dans le stock. On note les événements :

- A : « Le composant provient de la ligne A » ;
- B : « Le composant provient de la ligne B » ($\overline{A}$) ;
- D : « Le composant présente un défaut ».

Dans un exercice type, les questions suivent généralement une démarche progressive :

- **Étape 1 : Identifier les données de l'énoncé**
  - Probabilités du 1er niveau : $\mathrm{P}(A) = 0{,}60$ donc $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - 0{,}60 = 0{,}40$ (*Règle n° 1*).
  - Probabilités conditionnelles (2e niveau) :
    - Sachant A : $\mathrm{P}_A(D) = 0{,}05$ donc $\mathrm{P}_A\left(\overline{D}\right) = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$ (*Règle n° 1*).
    - Sachant B : $\mathrm{P}_B(D) = 0{,}02$ donc $\mathrm{P}_B\left(\overline{D}\right) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$ (*Règle n° 1*).
- **Étape 2 : Construire et compléter l'arbre pondéré**



$\Rightarrow \mathrm{P}(A \cap D) = 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}030$

$\Rightarrow \mathrm{P}\left(A \cap \overline{D}\right) = 0{,}60 \times 0{,}95 = 0{,}570$

$\Rightarrow \mathrm{P}(B \cap D) = 0{,}40 \times 0{,}02 = 0{,}008$

$\Rightarrow \mathrm{P}\left(B \cap \overline{D}\right) = 0{,}40 \times 0{,}98 = 0{,}392$

- **Étape 3 : Calculer des probabilités d'intersections (*Règle n° 2*)**
  - Probabilité que le composant vienne de A **et** soit défectueux :

$$\mathrm{P}(A \cap D) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}_A(D) = 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}03$$

  - Probabilité que le composant vienne de B **et** soit défectueux :

$$\mathrm{P}(B \cap D) = \mathrm{P}(B) \times \mathrm{P}_B(D) = 0{,}40 \times 0{,}02 = 0{,}008$$

- **Étape 4 : Calculer une probabilité totale** $\mathrm{P}(D)$ **(*Règle n° 3*)**
  D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(D) &= \mathrm{P}(A \cap D) + \mathrm{P}(B \cap D) \\ &= 0{,}03 + 0{,}008 = 0{,}038 \end{aligned}$$

La probabilité qu'un composant prélevé au hasard soit défectueux est donc égale à 3,8 %.

8.2. Expérience aléatoire à deux épreuves et épreuve de Bernoulli

8.2.1. Indépendance de deux événements

Définition

Deux expériences sont dites **indépendantes** si le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre.

Méthode (Calcul d'une probabilité associée à une expérience aléatoire à 2 épreuves)


Léa tente l'expérience suivante avec ses vêtements :
Elle dépose dans un panier 4 chemisiers indiscernables au toucher :

- 1 blanc
- 1 rouge
- 2 verts

Dans un autre panier, elle y dépose 2 jupes indiscernables au toucher :

- 1 blanche
- 1 noire

Elle tire au hasard, un chemisier du 1er panier et une jupe du 2ème panier.
Il s'agit de deux tirages successifs effectués dans des paniers distincts : le résultat du premier tirage n'impacte pas les probabilités du second.
Les deux expériences sont donc **indépendantes**.



Remarque :


Sur l'arbre de probabilités, cela se traduit par le fait que les sous-arbres du second niveau (issus de B, R et V) sont rigoureusement **identiques**.

8.2.2. Épreuve de Bernoulli

Définition

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à **deux issues** que l'on nomme traditionnellement « **succès** » (noté S) et « **échec** » (noté $\overline{S}$).

La probabilité du succès est notée p et la probabilité de l'échec est alors égale à $(1-p)$.



Remarque :

- Au succès, on peut associer le nombre 1
- À l'échec, on peut associer le nombre 0

Exemple :


- Le jeu du pile ou face :
  On considère comme **succès** "obtenir pile" et comme **échec** "obtenir face"
- Un lancer un dé à six faces :
  On considère comme **succès** "obtenir un ⚀" et comme **échec** "ne pas obtenir un ⚀"

Définition

Soit une épreuve de Bernoulli.

On appelle X la variable aléatoire qui prend :

- … la valeur 1 en cas de **succès**
- … et la valeur 0 en cas d'**échec**.



La loi de probabilité de X est appelée **loi de Bernoulli** de paramètre p, où p est la probabilité du succès.

On peut résumer cette loi dans le tableau suivant :

x_i	1	0
$P(X=x_i)$	p	$(1-p)$

Exemple :

- Le jeu du pile ou face :
  S=« Faire pile » $\rightarrow p = \dfrac{1}{2} = 0.5$


x_i	1	0
$P(X=x_i)$	0.5	0.5

- Lancer un dé
  S=« Faire ⚀ » $\rightarrow p = \dfrac{1}{6}$

x_i	1	0
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$

Méthode (Reconnaître une situation modélisée par une loi de Bernoulli) .....

Après la correction d'un contrôle, le professeur compte que 24 élèves ont obtenu une note $\geqslant 10$ et 6 ne l'ont pas obtenue.



Le professeur choisit une copie au hasard.

Cette expérience aléatoire possède 2 issues.

- Succès S : « la copie indique une note $\geqslant 10$ »;
- Échec $\overline{S}$: « la copie indique une note < 10 ».

La probabilité de l'issue "la copie indique une note $\geqslant 10$" est égale à :

$$p = \frac{24}{30} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

La situation est donc modélisée par une loi de **Bernoulli** de paramètre $p = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$.

8.2.3. Espérance

Propriété .....

*Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de **Bernoulli** de paramètre p.*

Alors l'espérance mathématique de X est :

$$E(X) = p$$

Exemple :

On considère une urne contenant 50 boules au total :

- 27 boules blanches
- 23 boules noires

On tire une boule au hasard dans l'urne. On s'intéresse à l'événement « obtenir une boule noire ».

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur :

- 1 si la boule tirée est noire (succès)
- 0 si elle est blanche (échec)

X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{23}{50} = 0{,}46$.

L'espérance mathématique de X est alors :

$$E(X) = p = 0{,}46$$

Interprétation :

Cela signifie qu'en répétant ce tirage un grand nombre de fois dans les mêmes conditions, on obtiendra en moyenne 0,46 **boule noire par tirage** (soit 46% de boules noires tirées).

Démonstration :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de **Bernoulli** de paramètre p.

On a :

x_i	1	0
$\mathrm{P}(X = x_i)$	p	$(1-p)$

Donc :

$$\begin{array}{rcccl} E(X) & = & p_1 \times x_1 & + & p_2 \times x_2 \\ & = & 1 \times p & + & 0 \times (1-p) \quad = p \end{array}$$

8.2.4. Répétitions d'épreuves de Bernoulli

Définition


Plusieurs expériences sont **identiques et indépendantes** si :

- … elles ont les mêmes issues,
- … chaque issue possède la même probabilité.

Exemple :

On lance 20 fois de suite une pièce de monnaie.
On considère :

- Succès : « obtenir Pile » ;
- Échec : « obtenir Face ».



Ces expériences de **Bernoulli** sont **identiques et indépendantes**.
On dit que $p = 0,5$ est le **paramètre** de l'épreuve de **Bernoulli** répétée 20 fois.

Exemple :

On lance 5 fois un dé à six faces et on note à chaque fois le résultat.
À chaque lancer, on considère :

- Succès : « obtenir un ⚃ » ;
- Échec : « ne pas obtenir un ⚃ ».

On répète ainsi 5 fois de suite la même expérience de **Bernoulli** (lancer un dé) et les expériences sont **indépendantes** l'une de l'autre : un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer.
On dit que $p = \dfrac{1}{6}$ est le **paramètre** de l'épreuve de **Bernoulli** répétée 5 **fois**.

Méthode (Calculer une probabilité associée à une épreuve de Bernoulli)


On considère l'expérience suivante :
Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges.
On tire au hasard une boule et **on la remet dans l'urne**.
On répète l'expérience 2 fois de suite.

- Représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre.
- Déterminer les probabilités suivantes :
  1. On tire deux boules blanches
  2. On tire une boule blanche et une boule rouge
  3. On tire au moins une boule blanche

Correction :

On note :

- A l'issue "On tire une boule blanche" $\quad \rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{3}{5} = 0,6$
- $\overline{A}$ l'issue contraire "On tire une boule rouge" $\quad \rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{2}{5} = 0,4$



1. Obtenir deux boules blanches correspond à l'issue $(A;A)$:

$$P_1 = \mathrm{P}(AA) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$


2. Obtenir une blanche et une rouge correspond aux issues $\left(A;\overline{A}\right)$ et $\left(\overline{A};A\right)$

$$\begin{array}{rcccccl} P_2 & = & \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) & + & \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) & & \\ & = & 0,6 \times 0,4 & + & 0,4 \times 0,6 & & \\ & = & 0,24 & + & 0,24 & & = 0,48 \end{array}$$

3. Obtenir **au moins** une blanche correspond à $\left(A;\overline{A}\right)$, $(A;A)$ et $\left(\overline{A};A\right)$

$$\begin{array}{rcccccccl} P_3 & = & \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) & + & \mathrm{P}(AA) & + & \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) & & \\ & = & 0,6 \times 0,4 & + & 0,6 \times 0,6 & + & 0,4 \times 0,6 & & \\ & = & 0,24 & + & 0,36 & + & 0,24 & & = 0,84 \end{array}$$

Arbre de probabilité de la situation :



Remarque :

Dans cette situation, on peut définir une variable aléatoire X qui compte le nombre de boules blanches obtenues (c'est-à-dire le nombre de succès) au cours des 2 tirages.

La variable aléatoire X peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2.

- $\mathrm{P}(X=0) = \mathrm{P}\left(\overline{AA}\right) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$;
- $\mathrm{P}(X=1) = \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) + \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) = 0,6 \times 0,4 + 0,4 \times 0,6 = 0,24 + 0,24 = 0,48$;
- $\mathrm{P}(X=2) = \mathrm{P}(AA) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$.

On peut alors établir la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau :

x_i	0	1	2
$\mathrm{P}(X=x_i)$	0,16	0,48	0,36

On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$0,16 + 0,48 + 0,36 = 1$$

La répétition de telles épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes constitue ce que l'on appelle un **schéma de Bernoulli**, et la variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit une loi bien spécifique appelée **loi binomiale**.

Notes