Página 1 de 25 — Apunte de cátedra

El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.

Página 2 de 25 — Apunte de cátedra

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Página 3 de 25 — Apunte de cátedra

Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).

Página 4 de 25 — Apunte de cátedra

Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.

Página 5 de 25 — Apunte de cátedra

Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.

Página 6 de 25 — Apunte de cátedra

El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.

Página 7 de 25 — Apunte de cátedra

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Página 8 de 25 — Apunte de cátedra

Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).

Página 9 de 25 — Apunte de cátedra

Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.

Página 10 de 25 — Apunte de cátedra

Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.

Página 11 de 25 — Apunte de cátedra

El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.

Página 12 de 25 — Apunte de cátedra

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Página 13 de 25 — Apunte de cátedra

Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).

Página 14 de 25 — Apunte de cátedra

Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.

Página 15 de 25 — Apunte de cátedra

Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.

Página 16 de 25 — Apunte de cátedra

El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.

Página 17 de 25 — Apunte de cátedra

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Página 18 de 25 — Apunte de cátedra

Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).

Página 19 de 25 — Apunte de cátedra

Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.

Página 20 de 25 — Apunte de cátedra

Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.

Página 21 de 25 — Apunte de cátedra

El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.

Página 22 de 25 — Apunte de cátedra

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x). Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú. Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo. Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026. El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!

Página 23 de 25 — Apunte de cátedra

Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).

Página 24 de 25 — Apunte de cátedra

Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.

Página 25 de 25 — Apunte de cátedra

Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.
Análisis Matemático I — Facultad de Ingeniería, año 2026.
El niño comió piñata en la montaña; ¿cuál es la solución? ¡Excelente!
Ecuaciones diferenciales: y'' + 3y' - 2y = 0 tiene solución general y(x) = C1*e^(r1 x) + C2*e^(r2 x).
Pingüino, cigüeña, acción, corazón, débil, río, útil, Ñandú.
Teorema: si f es continua en [a, b] entonces f alcanza máximo y mínimo.