

额外注释

这里用来放置一些内容，包括：

- 笔记未收录但是课本有所提及的内容（当然，至少我得认为这部分比较有用）
- 课本收录了的，一些个人认为比较重要的定理的证明
- 一些课本没有的扩展内容

需要注意的是，对于这里面打了tag的公式，其tag只在其内容内奏效，不会涉及外部的tag。

目录

额外注释

目录

结构的相关解释

一些符号总结

替换公理

代数的函数

符号函数 (sgn)

介值定理证明

自然数集 \mathbb{N} 是最小的无限集

结构的相关解释

在这份笔记里，部分字体格式对应特殊的意义，具体效果解释如下：

1. 一级标题 (#)

小节的标题，只用于笔记的开头。

2. 二级标题 (##)

小节内内容的分块，具体包括：

- 公理：其对应部分抄录原书中的公理内容
- 定义：其对应部分抄录原书中的定义内容
- 摘录：其对应部分记录原书中无任何标头的重要内容，根据个人总结，会有所删改。同时，这部分内容也是没有编号的
- 命题：其对应部分抄录原书中的定理，引理与命题内容
- 课后习题：其对应部分抄录原书中的小节下习题与个人习题解答
- 本节相关跳转：其对应部分记录本节笔记中提到的其它章节的跳转链接

3. 三级标题 (### **)

定义，命题等模块下，若原文内容有明显分类则添加三级标题注明分类，例子有：[实分析 4.3 绝对值与指数运算](#)

4. 五级标题 (##### **)

小节的相关习题

5. 六级标题 (##### **)

小节某习题下的分小题

6. 红色字体 (**)

有两种应用区域，其一是内容的编号与简称，典型例子如：(8.5.15 佐恩引理)，格式为：(原书编号 定理简称)，若简称后方带有问号则表示该简称并非原书内容，只是本人所写；其二是在课后习题部分中，当题目介绍某个未曾在书中定理，引理，命题出现的概念时，使用红色字体标注。

7. 蓝色字体 (**)

有四种应用区域，其一是原书部分重要的例，当我觉得重要时会把该例单独放在相关内容下方，另起一行并用括号标注，格式是：(注：例内容)；其二是在引理中原书打括号的部分，当我觉得它需要额外醒目一点时，使用蓝色字体标注；其三是原书习题后面的提示，使用蓝色字体抄录，格式是：(提示：提示内容)；其四就是个人对一个命题或定义的理解，这种直接在对应该命题后面用括号框住，格式大概是：(理解内容)。

8. 粗体字体 (**)

注释一些需要醒目的内容，比如当某个概念第一次出现时一定要用粗体标出。

9. 跳转链接 (**)

当内容提到原书其它小节时，给出对应章节的跳转链接，比如[4.3节](#)，链接格式统一使用：..\..\第n章\pdf\实分析 n.m 标题.pdf的格式，其中n.m是引用的章节对应数字。特别的，如果是额外注释则不需要在文末的[本节相关跳转](#)中给出跳转链接。

10. 数学公式 (\$**\$与\$\$**\$\$)

当一个地方需要使用数学内容的时候则使用数学公式，此外，当这一部分数学内容设计很多推导过程时，更建议使用行间。

上述字体格式允许在同一个地方应用多种格式。

一些符号总结

1. \mathbb{N} : 自然数集
2. \mathbb{N}^* 或者 \mathbb{N}^+ : 正自然数集
3. \mathbb{Z} : 整数集
4. \mathbb{Q} : 有理数集
5. \mathbb{R} : 实数集
6. \mathbb{R}^* : 广义实数集 (也即 $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$)

替换公理

代数替换公理 (algebraic substitution axiom)：在任一代数恒等式中，每一个字母符号只是一个泛指变量，因而可用其它形式的字母或恒等的函数表达式 (只要用这些表达式替换后等式两边均仍有意义) 替换，替换后等式仍成立。

详情可以参考[替换公理—百科](#)。

代数的函数

简单来说，即是不能通过有限次的加法（+），减法（-），乘法（×），除法（÷），乘方，开方（ $\sqrt{\quad}$ ）等关于 x 的标准代数运算来表达，在本书中我们暂时用不到这个概念。

关于代数函数的具体定义，可以参考：[代数函数—百科](#)。

符号函数 (sgn)

符号函数 $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下：

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

这个函数偶尔会被提到，故在此注明。

介值定理证明

定理内容：

(9.7.1 介值定理) 设 $a < b$ 都是实数， $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数，并且设 y 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的一个实数（即要么有 $f(a) \leq y \leq f(b)$ 要么 $f(b) \leq y \leq f(a)$ ），那么存在实数 $c \in [a, b]$ 使得 $f(c) = y$ 。

证明：

定理包含两种情形 $f(a) \leq y \leq f(b)$ 与 $f(b) \leq y \leq f(a)$ ，这里我们给出第一种情况下的证明，第二种情况的证明类似。

若 $y = f(a)$ 或 $y = f(b)$ ，那么我们只需要相应的考虑令有 $c = a$ 或 $c = b$ ，于是只需要考虑 $f(a) < y < f(b)$ 的情况。令 E 表示集合：

$$E := \{x \in [a, b] : f(x) < y\}$$

那么对 E 我们有：

- 显然 E 是 $[a, b]$ 的子集，从而 E 是有界的。
- 因为 $f(a) < y$ 且 $a \in [a, b]$ ，所以 E 也是非空的。

由[最小上界原理](#)，于是 $c := \sup(E)$ 是有限的。因为 E 包含 a ，于是 $c \geq a$ ，又因为 E 以 b 为上界（ E 是 $[a, b]$ 的子集），于是 $c \in [a, b]$ 。现在证明 $f(c) = y$ ，证明思路是从 c 的左侧证明 $f(c) \leq y$ ，然后从 c 的右侧证明 $f(c) \geq y$ 。

左侧的证明：

设 $n \geq 1$ 是一个整数, 数 $c - \frac{1}{n}$ 小于 c , 从而 $c - \frac{1}{n}$ 不可能是 E 的上界, 于是存在一个点, 我们记为 x_n , 它满足 $x_n \geq c - \frac{1}{n}$ 且 $x_n \in E$ 。于是同时由 $x_n \in E$ 有 $x_n \leq c$, 于是:

$$c - \frac{1}{n} \leq x_n \leq c$$

根据[夹逼定理](#), 于是有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$, 又由于 f 是连续的, 于是这蕴含着 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c)$, 此外, 由于对任意 x_n , 都有 $x_n \in E$, 于是有 $f(x_n) < y$, 根据[比较原理](#), 于是有 $f(c) \leq y$ 成立。

因为 $f(b) > y \geq f(c)$, 于是 $c \neq b$, 又根据 c 是 E 的上确界而 b 是 E 的上界, 于是 $c < b$ 。特别地, 存在一个正整数 N 使得对任意 $n \geq N$ 都有 $c + \frac{1}{n} < b$ 即 $c + \frac{1}{n} \in [a, b]$; 并且因为 $c + \frac{1}{n} > c$ 与 c 是上确界, 所以 $c + \frac{1}{n} \notin E$; 结合可得有 $f(c + \frac{1}{n}) \geq y$ 。又有 $c + \frac{1}{n}$ 收敛于 c 与 f 连续, 根据[比较原理](#), 于是有 $f(c) \geq y$ 成立。

综上, 我们同时有 $f(c) \leq y$ 与 $f(c) \geq y$ 成立, 于是只能有 $f(c) = y$, 此即我们要证明的结论。

自然数集 \mathbb{N} 是最小的无限集

使用反证法, 不妨假设 A 是一个基数小于 \mathbb{N} 的无限集, 从而存在一个自然数集 \mathbb{N} 的子集 B 与 A 有相同的基数, 然后我们考虑下面这样一个递归定义所给出的函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$:

$$f(i) := \min(B \setminus \{f(j) : j < i\}) \quad (i \in \mathbb{N}) \quad (1)$$

由于 $\{f(j) : j < i\}$ 对任意 $i \in \mathbb{N}$ 都是有限集, 而 B 根据假设应当是无限集, 所以集合 $B \setminus \{f(j) : j < i\}$ 总是非空的; 由于自然数集是良序的, 从而根据[良序原理](#), $B \setminus \{f(j) : j < i\}$ 的最小元素总是存在的。因此, 上面的递归定义对任意 $i \in \mathbb{N}$ 都是有效的。

然后我们考虑函数 f 的性质:

- f 是单射吗?

对任意 $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$ 且 $i_1 \neq i_2$, 不妨考虑设 $i_1 < i_2$ 。于是根据定义(1), 我们有:

$$f(i_2) = \min(B \setminus \{f(j) : j < i_2\})$$

由于[良序原理](#), 于是有 $f(i_2) \in B \setminus \{f(j) : j < i_2\} \iff f(i_2) \in B$ 且 $f(i_2) \notin \{f(j) : j < i_2\}$, 这表明对任意的 $j < i_2$, 都应该有 $f(i_2) \neq f(j)$ (不然就有 $f(i_2) \in \{f(j) : j < i_2\}$ 了), 特别地, 有 $f(i_2) \neq f(i_1)$ 。于是对任意 $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$ 且 $i_1 \neq i_2$, 我们都有 $f(i_2) \neq f(i_1)$, 即 f 确实是一个单射。

特别地, 我们还需要注意到

$f(i_2) \in [B \setminus \{f(j) : j < i_2\}] \cup \{f(j) : i_1 \leq j < i_2\} = B \setminus \{f(j) : j < i_1\}$ (因为 $f(i_2)$ 属于这个并集的第一个), 而根据定义(1), 我们有:

$$f(i_1) = \min(B \setminus \{f(j) : j < i_1\})$$

即 $f(i_1)$ 是 $B \setminus \{f(j) : j < i_1\}$ 的最小元素, 结合 $f(i_2) \neq f(i_1)$ 于是只能有 $f(i_1) < f(i_2)$, 从而 f 还是一个严格单调递增的函数。因此, 不难归纳得到对任意的 $i \in \mathbb{N}$, 都有 $i \leq f(i)$ 成立。

- f 是满射吗?

不妨使用反证法, 假设它不是满射, 从而存在 $j \in B$ 使得对任意 $i \in \mathbb{N}$ 都有 $f(i) \neq j$ 成立, 换言之, 即集合:

$$S = \{y \in B : \forall i \in \mathbb{N}, f(i) \neq y\} \quad (2)$$

是非空的。根据良序原理, 存在 S 的最小元素, 于是我们令有:

$$k = \min(S)$$

良序原理告诉我们 $k \in S$ 。又根据我们在单射证明中的结论, 我们知道有 f 是严格单调递增的且 $k \leq f(k)$, 于是即对任意 $i \geq k$, 都有 $k \leq f(i)$, 于是对集合 $S \cup \{f(i) : i \geq k\}$ 中的任意元素 y , 我们都有 $k \leq y$; 进而由于 $k \in S \cup \{f(i) : i \geq k\}$ (因为 k 属于 S), 因此 k 就是集合 $S \cup \{f(i) : i \geq k\}$ 的最小元素。然后注意到有:

$$\begin{aligned} S \cup \{f(i) : i \geq k\} &\iff \{y \in B : \forall i \in \mathbb{N}, f(i) \neq y\} \cup \{f(i) \in B : i \geq k\} \\ &\iff \{y \in B : [\text{对任意 } i \in \mathbb{N} \text{ 都有 } f(i) \neq y] \text{ 或 } [\text{存在 } i \geq k \text{ 使得 } f(i) = y]\} \\ &\iff \{y \in B : \text{对任意 } i \in \mathbb{N} \text{ 且 } i < k \text{ 都有 } f(i) \neq y\} \\ &\iff B \setminus \{f(i) : i < k\} \end{aligned}$$

于是即 $k = \min(B \setminus \{f(i) : i < k\})$, 此时返回定义(1), 于是即有 $f(k) = k$ 。从而即“存在一个自然数 k 使得 $f(k) = k$ ”, 和 S 定义里面的“对任意自然数 i 都有 $f(i) \neq k$ ”矛盾, 反证假设不成立, 反证结束。

综上, 即有对任意的 $j \in B$, 都存在 $i \in \mathbb{N}$ 使得 $f(i) = j$, 即 f 是满射。

经过上面的探究我们发现 $f : \mathbb{N} \rightarrow B$ 同时是单射和满射。也就是说, 存在 B 到 \mathbb{N} 的双射, 换言之 B 与 \mathbb{N} 有相同的基数, 这跟我们反证假设中假设的 B 基数小于 \mathbb{N} 矛盾, 于是反证假设不成立, 对任意的无限集其基数都不会小于 \mathbb{N} 。