14.2 逐点收敛和一致收敛

定义

1. **(14.2.1 逐点收敛)** 设 $(f^{(n)})_{n=1}^\infty$ 是从度量空间 (X,d_X) 到另一个度量空间 (Y,d_Y) 的函数序列,并设 $f:X\to Y$ 是一个函数。如果对所有的 $x\in X$ 都有

$$\lim_{n o\infty}f^{(n)}(x)=f(x)$$

也即

$$\lim_{n o \infty} d_Y(f^{(n)}(x),f(x)) = 0$$

那么我们称 $(f^{(n)})_{n=1}^\infty$ 在X上逐点收敛于f。也就是说对每一个x和任意的 $\varepsilon>0$,都存在一个N>0使得对所有的n>N都有 $d_Y(f^{(n)}(x),f(x))<\varepsilon$ 。我们称函数f为函数序列 $f^{(n)}$ 的逐点极限。

(注:事实上在这里我们并没有用到X是一个度量空间的前提,对逐点收敛的定义而言只需要X是一个纯粹的集合就行了,但是当我们考察X到Y上的连续函数时我们需要用到X上的度量,或者至少需要一个拓扑结构;由<u>命题12.1.20</u>可以得到一个函数序列最多有一个逐点极限;逐点收敛时一个相当自然的概念,但是它的缺陷很多,例如它不能保持连续性,导数运算,极限运算和积分运算,具体的例子可以参考原书例14.2.4到例14.2.6)

2. **(14.2.7** 一致收敛) 设 $(f^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ 是从度量空间 (X,d_X) 到另一个度量空间 (Y,d_Y) 的函数序列,并设 $f: X \to Y$ 是一个函数。如果对于任意的 $\varepsilon > 0$,存在一个N > 0使得对所有的 $n \geq N$ 和所有的 $x \in X$ 都有 $d_Y(f^{(n)}(x),f(x)) < \varepsilon$,那么我们称 $(f^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ 在X上一致收敛于f,并把函数f称为函数序列 $f^{(n)}$ 的一致极限。

(注:一致收敛与逐点收敛的最大区别在于逐点收敛的N依赖于 ε 与x的选取,而一致收敛的N只与 ε 的选取相关,这表明 $f^{(n)}$ 一致收敛于f关于x是**一致的**;很显然一致收敛的函数序列都是逐点收敛的,但是反过来就不一定;最后,无论是一致收敛还是逐点收敛,函数序列 $f^{(n)}$ 的收敛性都会继承到限制函数序列 $f^{(n)}|_E$ 上)

课后习题

14.2.1 本题的目的是阐述连续性和逐点收敛之间的具体联系,以及一致连续性和一致收敛性之间的具体联系。设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个函数。对于任意的 $a\in\mathbb{R}$,设 $f_a:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是平移函数 $f_a(x):=f(x-a)$

(a) 证明:f是连续的,当且仅当只要 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列,平移函数序列 f_{a_n} 就逐点收敛于f

分别证明充分必要性:

若f是连续的,则对任意 $\varepsilon>0$ 与任意的 $x_0\in\mathbb{R}$,存在一个 $\delta>0$ 使得对任意 $x\in\mathbb{R}$ 满足 $|x-x_0|<\delta$ 都有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 。又因为 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列,因此存在一个 $N\geq 0$ 使得对任意 $n\geq N$ 都有 $|a_n|<\delta$ 。从而我们可以组合这些结论得到:对任意 $\varepsilon>0$ 与任意的 $x_0\in\mathbb{R}$,存在一个N>0使得对所有的n>N都有:

$$|x_0 - (x_0 - a_n)| < \delta \Longrightarrow |f(x_0) - f(x_0 - a_n)| < \varepsilon$$

也就是 $|f(x_0) - f_{a_n}(x_0)| < \varepsilon$ 。于是根据定义14.2.1即有平移函数序列 f_{a_n} 逐点收敛于f。

反过来,若对任意 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列都有平移函数序列 f_{a_n} 逐点收敛于f。我们使用反证法,假设f不是连续的,那么存在某个 $x_0\in\mathbb{R}$ 使得存在某个 $\varepsilon>0$,对任意 $\delta>0$ 都存在 $x\in\mathbb{R}$ 满足 $|x-x_0|<\delta$ 与 $|f(x)-f(x_0)|\geq \varepsilon$ 。

于是考虑任意的自然数n,我们使用选择公理指定一个 $a_n\in\mathbb{R}$ 满足 $|(x_0-a_n)-x_0|<\frac{1}{n}$ 且 $|f(x_0-a_n)-f(x_0)|\geq \varepsilon$ (事实上这一步应该先找到一个 b_n ,然后令有 $a_n:=x_0-b_n$,这里省略了)。显然 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是一个收敛于0的序列,然后注意到根据比较原理,对 x_0 我们有:

$$\lim_{n o\infty}|f_{a_n}(x_0)-f(x_0)|=\lim_{n o\infty}|f(x_0-a_n)-f(x_0)|\geq arepsilon>0$$

这和逐点收敛的要求矛盾(逐点收敛要求 $\lim_{n\to\infty}|f_{a_n}(x_0)-f(x_0)|=0$),因此反证假设不成立,只能有f是连续的。

综上,于是结论得证。

(b) 证明:f是一致连续的,当且仅当只要 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列,平移函数序列 f_{a_n} 就一致收敛于f

分别证明充分必要性:

若f是一致连续的,则对任意 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$ 使得对任意x, $x'\in\mathbb{R}$ 满足 $|x-x'|<\delta$ 都有 $|f(x)-f(x')|<\varepsilon$ 。又因为 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列,因此存在一个 $N\geq0$ 使得对任意 $n\geq N$ 都有 $|a_n|<\delta$ 。从而我们可以组合这些结论得到:对任意 $\varepsilon>0$,存在一个 $N\geq0$ 使得对所有的n>N与 $x\in\mathbb{R}$ 都有:

$$|x - (x - a_n)| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x - a_n)| < \varepsilon$$

也就是 $|f(x) - f_{a_n}(x)| < \varepsilon$ 。于是根据定义14.2.1即有平移函数序列 f_{a_n} 一致收敛于f。

反过来,若对任意 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是收敛于0的实数序列都有平移函数序列 f_{a_n} 一致收敛于f。我们使用反证法,假设f不是一致连续的,那么存在某个 $\varepsilon>0$,对任意 $\delta>0$ 存在一对x, $x'\in\mathbb{R}$ 满足 $|x-x'|<\delta$ 与 $|f(x)-f(x')|\geq \varepsilon$ 。

于是考虑任意的自然数n,我们使用选择公理可以为每一个n指定一个 x_n 与 x_n' 满足 $|x_n-x_n'|<\frac{1}{n}$ (为了下文讨论方便,这里我们不失一般性地假设 $x_n< x_n'$) 与 $|f(x_n)-f(x_n')|\geq \varepsilon$,然后令有 $a_n:=x_n'-x_n$ 。由于对任意自然数n都有 $|a_n|<\frac{1}{n}$ 因此显然 有序列 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 是一个收敛于0的序列。但是对 ε ,考虑任意的 $N\geq 0$,根据上面的叙述都有存在 $x_N'\in\mathbb{R}$ 使得

$$|f_{a_N}(x_N') - f(x_N')| = |f(x_N) - f(x_N')| \ge \varepsilon$$

这和一致收敛的要求矛盾(一致收敛要求至少存在一个 $N\geq 0$ 使得对任意 $n\geq N$ 都有 $|f_{a_N}(x_N')-f(x_N')|<\varepsilon)$,因此反证假设不成立,只能有f是一致连续的。

综上,于是结论得证。

14.2.2 本题中我们讨论一致收敛于逐点收敛的关系与一些逐点收敛但不一致收敛的例子

(a) 设 $(f^{(n)})_{n=1}^\infty$ 是从度量空间 (X,d_X) 到另一个度量空间 (Y,d_Y) 的函数序列,并设 $f:X\to Y$ 是一个函数。证明:如果 $f^{(n)}$ 一致收敛于f,那么 $f^{(n)}$ 也逐点收敛于f

根据一致收敛的定义,于是对于任意的 $\varepsilon>0$,存在一个N>0使得对所有的 $n\geq N$ 和所有的 $x\in X$ 都有 $d_Y(f^{(n)}(x),f(x))<\varepsilon$ 。虽然N不依赖于x,但是也可以改写为对于任意的 $\varepsilon>0$ 与 $x\in X$,都存在N>0使得对任意的 $n\geq N$ 有 $d_Y(f^{(n)}(x),f(x))<\varepsilon$ 。于是根据定义14.2.1即有 $f^{(n)}$ 逐点收敛于f。

(b) 对于每一个整数 $n\geq 1$,设 $f^{(n)}:(-1,1)\to\mathbb{R}$ 为函数 $f^{(n)}(x):=x^n$ 。证明: $f^{(n)}$ 逐点收敛于零函数0,但不一致收敛于任何函数 $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$

对任意的 $x\in(-1,1)$,根据命题6.5.2我们知道有 $\lim_{n\to\infty}x^n=0$ 成立,因此根据定义14.2.1可以直接得到 $f^{(n)}$ 逐点收敛于零函数0。

然后我们不妨使用反证法,假设 $f^{(n)}$ 一致收敛于某个函数f,于是根据定义14.2.7对任意的 $\varepsilon>0$ 都存在 $N\geq 1$ 使得对任意的 $n\geq N$ 与任意的 $x\in (-1,1)$ 都有:

$$|x^n - f(x)| \le \varepsilon$$

我们特别考虑 $\epsilon \ll 0.1$ 是一个很小的数。由于N是给定的,并且考虑到 x^N 是一个连续函数,因此根据介值定理(考虑将 x^N 的定义域扩展到[-1,1]来寻找c,这里只是为了证明存在性,不需要真的扩大定义域)必然存在一个 $c \in [0,1]$ 使得 $c^N = 1/2 \in [0,1]$,特别地必然有 $c \neq 1$,从而c属于(-1,1)(也就是 $f^{(N)}$ 的定义域)。从而我们有:

$$\left|c^N-f(c)
ight|\leq arepsilonrac{arepsilon\ll 0.1}{c^{N}=1/2}\,f(c)>rac{1}{2}-0.1=0.4$$

然后考虑函数 $f^{(3N)}$,由于 $3N \geq N$ 于是我们也\$\$可以套用上面的结论,结合指数运算的法则即有:

$$\left|c^{3N}-f(c)
ight|\leqarepsilon rac{arepsilon\ll0.1}{c^{3N}=1/8}\,f(c)<rac{1}{8}+0.1=0.225$$

由于垂线测试因此函数值应该是唯一的,不可能出现同时有f(c)<0.225与f(c)>0.4的实数。于是导出了矛盾,反证假设不成立, $f^{(n)}$ 不可能一致收敛于某个函数f。

(c) 设 $g:(-1,1) o\mathbb{R}$ 是函数 $g(x):=\dfrac{x}{1-x}$ 。保持(b)中的记号,证明:当 $N o\infty$ 时,部分和序列 $\sum_{n=1}^N f^{(n)}$ 在开区间(-1,1)上逐点收敛于g,但不一致收敛于g(提示:利用引理7.3.3)。如果把开区间(-1,1)换成闭区间[-1,1],情况又如何

考虑到无限级数的定义因此引理7.3.3表明对任意的 $x \in (-1,1)$ 都有极限:

$$\lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} f^{(n)}(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$$

于是根据定义14.2.1即有部分和序列 $\sum_{n=1}^N f^{(n)}$ 在开区间(-1,1)上逐点收敛于g。然后考虑证明部分和序列 $\sum_{n=1}^N f^{(n)}$ 在开区间(-1,1)上不是一致收敛于g的。

注意到有:

$$orall \, N > 0, orall \, x \in (-1,1), g(x) - \sum_{n=1}^N f^{(n)}(x) = rac{x}{1-x} - rac{x-x^{N+1}}{1-x} = rac{x^{N+1}}{1-x}$$

然后我们不妨使用反证法,假设 $f^{(n)}$ 一致收敛于g,于是根据定义14.2.7对任意的 $\varepsilon>0$ 都存在 N>1使得对任意的n>N与任意的 $x\in (-1,1)$ 都有:

$$\left| rac{x^{N+1}}{1-x}
ight| \leq arepsilon$$

我们特别考虑 $\varepsilon\ll 0.1$ 是一个很小的数。然后类似我们在(b)中使用介值定理的方法我们能找到一个 $c\in (0,1)$ 使得 $c^{N+1}=\frac{1}{2}$,然后由于 $c\in (0,1)$ 于是必然有 $\left|\frac{c^{N+1}}{1-c}\right|>\frac{1}{2}>\varepsilon$ 。于是导出了矛盾,从而反证假设不成立,只能有 $f^{(n)}$ 不可能一致收敛于g。

把开区间改成闭区间 $f^{(n)}$ 依然不一致收敛于g,但是同时 $f^{(n)}$ 也不逐点收敛于g了,因为在x=-1处我们有:

$$\lim_{N o \infty} \sum_{n=1}^N f^{(n)}(-1) = \lim_{N o \infty} (-1)^N rac{1}{2} - rac{1}{2}$$

显然是发散的,这和逐点收敛的定义相悖。

14.2.3 设 (X,d_X) 是一个度量空间。对于每一个整数 $n\geq 1$,设 $f_n:X\to\mathbb{R}$ 是一个实值函数。设 f_n 在X上逐点收敛于另一个函数 $f:X\to\mathbb{R}$,并设 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个连续函数。证明:函数序列 $h\circ f_n$ 在X上逐点收敛于 $h\circ f$

由于 f_n 在X上逐点收敛于另一个函数f,因此根据定义14.2.1,对任意的 $x \in X$ 我们有:

$$\lim_{n o\infty}f_n(x)=f(x)$$

也即实数序列 $(f_n(x))_{n=1}^{\infty}$ 依标准度量收敛于f(x)。然后由于h是一个连续函数,因此根据命题 13.1.4(b)我们有序列 $(h(f_n(x)))_{n=1}^{\infty}$ 收敛于f(x),转化为复合函数的形式即有极限:

$$\lim_{n o\infty}h\circ f_n(x)=h\circ f(x)$$

由于这个极限对任意的 $x\in X$ 都成立,因此根据定义14.2.1即有函数序列 $h\circ f_n$ 在X上逐点收敛于 $h\circ f_n$

14.2.4 设 $f_n:X\to Y$ 是从度量空间 (X,d_X) 到另一个度量空间 (Y,d_Y) 的函数序列的有界函数序列。设 f_n 一致收敛于函数 $f:X\to Y$,并设 f 是一个有界函数,即在Y 中存在一个球 $B_{(Y,d_Y)}(y_0,R)$ 使得对所有的 $x\in X$ 都有 $f(x)\in B_{(Y,d_Y)}(y_0,R)$ 。证明:函数序列 f_n 是一致有界的。也就是说,在Y 中存在一个球 $B_{(Y,d_Y)}(y_0,R)$ 使得对所有的 $x\in X$ 和所有的正整数n都有 $f_n(x)\in B_{(Y,d_Y)}(y_0,R)$ (关于函数有界性的概念在下一节会提到)

根据一致收敛的定义,存在一个 $N\geq 1$ 使得使得对任意对任意 $n\geq N$ 与任意 $x\in X$ 都有 $d_Y(f_n(x),f(x))<1$ 。然后由于f是有界函数,因此存在一个Y中的度量球 $B_{(Y,d_Y)}(y_0,r_0)$ 使得 对任意 $x\in X$ 都有 $f(x)\in B_{(Y,d_Y)}(y_0,r_0)$ 。然后我们考虑任意的 $n\geq N$ 与任意的 $x\in X$,根据 度量空间的三角不等式有:

$$d_Y(f_n(x), y_0) \le d(f_n(x), f(x)) + d_Y(f(x), y_0) < r_0 + 1$$

然后对任意正整数n < N,由于 f_n 是有界函数于是存在度量球 $B_{(Y,d_Y)}(y_n,r_n)$ 使得对任意 $x \in X$ 都有 $f(x) \in B_{(Y,d_Y)}(y_n,r_n)$ 。于是对任意n < N与任意 $x \in X$,根据度量空间的三角不等式有:

$$d_Y(f_n(x), y_0) \le d(f_n(x), y_n) + d_Y(y_n, y_0) < r_n + d_Y(y_n, y_0)$$

又因为只有有限个正整数n满足n < N (准确点说就是N-1个), 于是定义下面的集合:

$$R := \{r_0 + 1\} \cup \{r_n + d_Y(y_n, y_0) : 1 \le n < N\}$$

显然这是个基数为N的集合,于是它应该存在一个最大元素 $\max(R)$,我们记有 $r:=\max(R)$ 。 从而我们可以将上面的结论总结有:对任意的正整数n与任意的 $x\in X$,我们有:

$$d_Y(f_n(x),y_0) \leq egin{cases} d(f_n(x),y_n) + d_Y(y_n,y_0) < r_n + d_Y(y_n,y_0) & ext{if } n < N \ d(f_n(x),f(x)) + d_Y(f(x),y_0) < r_0 + 1 & ext{if } n \geq N \end{cases} \leq r$$

即对任意的正整数n与任意的 $x\in X$,都有 $f_n(x)\in B_{(Y,d_Y)}(y_0,r)$ 。于是即有函数序列 f_n 是一致连续的,结论得证。

本节相关跳转

实分析 7.3 非负数的和

实分析 12.1 定义和例子

实分析 14.3 一致收敛性与连续性