

1 · ESCALAS TEMPORALES
DINÁMICA RÁPIDA
Microrrelatos Semanales
Resolución: t = 1 semana
Fluctuaciones afectivas, metas, desafíos situacionales y estrategias de afrontamiento.
DINÁMICA LENTA
Sintomatología Clínica
Resolución: quincenal
Evolución inercial de síntomas: ATQ-8 (depresión), GAD-7 (ansiedad), activación y EROS.
FUS
2 · ESPACIO DE ESTADOS
VARIEDAD TOPOLÓGICA
Espacio Latente z_t
Espacio continuo ℝ⁶⁴
Organización en atractores:
• F1: Malestar / Desesperanza
• F2: Afrontamiento y Metas
• F3: Estabilidad y Reflexión
Matriz de transición ergódica con persistencia P_ii > 0.44
TRA
3 · MÉTRICAS COMPLEJIDAD
PERSISTENCIA Y MEMORIA
Inercia Temporal AR(1)
Corrección Hurwicz: ρ¯≈ 0.45
Memoria de largo alcance (Hurst) y entropía ordinal (0.87) que cuantifican la rigidez afectiva.
TRANSICIONES DE RÉGIMEN
Reconfiguraciones PELT
Tasa media: 1.48 cambios/sujeto
Detección de saltos discretos en la dinámica latente, sin sobreinterpretar bifurcaciones.
4 · MONITOREO CLÍNICO
APLICACIÓN CLÍNICA
Monitoreo de Estabilidad
Seguimiento Fenotípico
Detección de consolidación del régimen abstinente y pérdida de resiliencia ante el tratamiento.
PRUDENCIA EPISTÉMICA
Límites de Predicción
Paridad Estricta LOO-CV
La inercia basal domina el pronóstico; el texto describe el proceso sin funcionar como oráculo predictivo.