



Informe de Resultados Médicos

> Laboratorio Clínico Vittalab — Análisis de Laboratorio



Laboratorio

Vittalab Laboratorio Clínico, C.A. — RIF: J-50367294-3.
Calle Bolívar, Quinta Ana María, Diagonal al Hospital Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná — Estado Sucre.
▪ **Correo:** lab.clin.vitta@gmail.com
▪ **Teléfono:** 0414.563.28.63



Información del Paciente

Nombre: ALISON HERRERA **Sexo:** MASCULINO
Edad: 8 AÑOS **Orden:** A00327
Fecha de examen: 25/08/2026

Marcadores Hepáticos



Hepatitis B y C

Prueba	Resultado	Interpretación
Hepatitis B HBsAg	NEGATIVO	Detección cualitativa de marcadores de Hepatitis B (HBsAg y HBcAb) en suero humano
Hepatitis B HBcAb	NEGATIVO	
Hepatitis C (Anti-HCV)	NEGATIVO	Inmunoensayo indirecto anti-Hepatitis C

Serología Especial



Herpes I — Técnica ELISA

Prueba	Resultado	Valor de referencia
Herpes I IgM	0.34	POSITIVO > 1.1

El valor 0.34 se encuentra por debajo del umbral de positividad (> 1.1), por lo que se interpreta como **negativo**.

Panel Viral

 Detección cualitativa de anticuerpos

Paneles	IgM	IgG	Técnica
Citomegalovirus (CMV)	NEGATIVO	NEGATIVO	Prueba rápida cualitativa
Epstein Barr (EBV)	POSITIVO DEBIL	—	Prueba rápida heterófilos
Herpes Simple 2 (HSV2)	NEGATIVO	NEGATIVO	Prueba rápida cualitativa

Observaciones

Los resultados de los marcadores hepáticos (Hepatitis B y C), Herpes I IgM (valor de 0.34 por debajo del umbral de positividad de > 1.1), Citomegalovirus y Herpes Simple 2 son **negativos**.

Sin embargo, se detecta un resultado **POSITIVO DEBIL** para IgM del Virus de Epstein Barr (EBV), lo que podría indicar una infección reciente o activa por este virus, comúnmente asociado a la mononucleosis infecciosa, una condición frecuente en niños.

Recomendación Clínica

 Hallazgo a correlacionar clínicamente

El resultado **POSITIVO DEBIL** para el Virus de Epstein Barr (EBV) IgM requiere una evaluación clínica por parte del médico tratante.

 Acción sugerida

Se recomienda correlacionar este hallazgo con los síntomas actuales del paciente y su historial médico para determinar la necesidad de pruebas adicionales (como una prueba de anticuerpos heterófilos o un panel más completo de EBV) o para establecer un plan de manejo adecuado, que podría incluir observación y tratamiento sintomático.

LCDA. MARÍA TERESA BRITO
CB: 16.0850 / M.P.P.S: 17925

Informe generado automáticamente por el sistema de análisis con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX.
Generado el 2026-08-27 • ELECTRÓNICA — Sistema de Análisis de Imágenes.