
$q = 6$, $q_c = 12$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
ρ
λ_c
1 .20 .14 .08 .06 .06 .05 .05 .05 .05
0.75 .26 .25 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23
0.5 .28 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
0.25 .30 .30 .31 .30 .30 .30 .31 .30 .29
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
1 .25 .23 .18 .17 .16 .15 .15 .14 .14
0.75 .31 .32 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
0.5 .29 .31 .31 .32 .32 .31 .32 .33 .32
0.25 .26 .28 .29 .28 .28 .28 .28 .27 .27
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
1 .93 .85 .74 .69 .68 .67 .67 .66 .67
0.75 .90 .90 .87 .86 .87 .87 .87 .87 .87
0.5 .92 .92 .91 .91 .92 .91 .91 .91 .92
0.25 .90 .90 .89 .90 .90 .90 .90 .89 .89
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0