
$q_c = 12$, $\lambda_c = 1$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
gold standard (B 30, W 48)
$B = 100$
$W = 24$
$W = 240$
ρ
q
1
0.75
0.5
0.25
3
6
12
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
.00 .00 .00
.24 .11 .04
.28 .33 .18
.24 .43 .40
.00 .00 .00
.12 .05 .02
.16 .21 .11
.14 .34 .31
– – –
.87 .91 .92
.90 .82 .83
.94 .84 .79
.00 .00 .00
.25 .12 .04
.29 .34 .19
.24 .44 .40
.00 .00 .00
.13 .05 .02
.17 .21 .12
.14 .34 .32
– – –
.86 .90 .92
.89 .82 .83
.94 .84 .78
-.00 .00 .00
.27 .12 .04
.33 .39 .20
.28 .49 .49
.00 .00 .00
.14 .05 .02
.20 .25 .13
.18 .42 .40
– – –
.85 .89 .93
.86 .78 .81
.93 .83 .76
.00 -.00 .00
.17 .10 .05
.20 .23 .17
.17 .29 .32
.00 .00 .00
.08 .05 .02
.09 .13 .11
.07 .19 .26
– – –
.91 .92 .93
.91 .88 .86
.95 .86 .81