
$q = 6$, $q_c = 12$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
gold standard (B 30, W 48)
$B = 100$
ρ
λ_c
1
0.75
0.5
0.25
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
-.00 .00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00
.09 .11 .12 .12 .13 .14 .13 .15 .15
.27 .33 .33 .34 .34 .36 .36 .37 .37
.37 .43 .45 .43 .43 .43 .43 .44 .44
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.04 .05 .06 .07 .07 .09 .08 .09 .09
.15 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .26 .27
.27 .34 .37 .36 .36 .36 .36 .37 .37
- - - - - - - - -
.91 .91 .91 .93 .92 .90 .92 .89 .90
.84 .82 .84 .84 .84 .83 .84 .83 .83
.86 .84 .85 .86 .86 .87 .87 .87 .87
-.00 .00 .00 -.00 .00 -.00 -.00 -.00 -.00
.09 .12 .14 .17 .16 .16 .15 .16 .16
.27 .34 .40 .45 .46 .48 .48 .49 .50
.37 .44 .49 .51 .52 .53 .53 .53 .53
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.04 .05 .07 .10 .09 .10 .09 .10 .10
.15 .21 .27 .32 .34 .36 .36 .37 .38
.27 .34 .42 .44 .46 .47 .48 .49 .48
- - - - - - - - -
.91 .90 .88 .85 .90 .89 .91 .89 .90
.84 .82 .79 .77 .77 .77 .77 .76 .76
.86 .84 .83 .83 .82 .82 .82 .83 .83