
$q_c = 12$, $\lambda_c = 1$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
$W = 24$
gold standard (B 30, W 48)
$W = 240$
ρ
q
1
0.75
0.5
0.25
3
6
12
.19 .15 .11
.23 .26 .24
.21 .32 .33
.18 .33 .40
.19 .14 .11
.22 .25 .23
.20 .29 .30
.16 .30 .37
.22 .17 .13
.21 .25 .23
.17 .26 .28
.16 .26 .32
.27 .23 .20
.23 .33 .34
.17 .36 .44
.12 .31 .49
.27 .23 .19
.21 .32 .32
.15 .31 .38
.10 .28 .43
.28 .24 .20
.18 .29 .31
.10 .24 .33
.08 .21 .33
.91 .85 .79
.93 .90 .85
.93 .91 .88
.89 .85 .84
.91 .85 .79
.93 .90 .84
.93 .92 .84
.93 .90 .85
.94 .89 .82
.91 .89 .83
.93 .90 .83
.93 .89 .82
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0