
$q = 6$, $q_c = 12$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
gold standard (B 30, W 48)
$B = 100$
ρ
λ_c
1 0.75 0.5 0.25
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
.20 .14 .08 .06 .06 .05 .05 .05 .05
.26 .25 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23
.28 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.30 .30 .31 .30 .30 .30 .31 .30 .29
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
.25 .23 .18 .17 .16 .15 .15 .14 .14
.31 .32 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
.29 .31 .31 .32 .32 .31 .32 .33 .32
.26 .28 .29 .28 .28 .28 .28 .27 .27
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
.93 .85 .74 .69 .68 .67 .67 .66 .67
.90 .90 .87 .86 .87 .87 .87 .87 .87
.92 .92 .91 .91 .92 .91 .91 .91 .92
.90 .90 .89 .90 .90 .90 .90 .89 .89
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
.20 .14 .08 .05 .05 .04 .03 .03 .02
.26 .25 .24 .22 .23 .23 .22 .22 .22
.28 .29 .30 .30 .31 .30 .30 .30 .30
.30 .30 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .32
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
.25 .23 .18 .16 .15 .14 .13 .13 .13
.31 .32 .31 .29 .30 .30 .29 .29 .28
.29 .31 .32 .33 .34 .34 .33 .33 .33
.26 .28 .30 .31 .32 .32 .32 .31 .31
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
.93 .85 .73 .67 .66 .64 .62 .61 .60
.90 .90 .87 .86 .86 .86 .85 .85 .84
.92 .92 .91 .91 .91 .91 .91 .90 .91
.90 .90 .89 .88 .89 .88 .89 .88 .89
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0