
target A0, $q = 3$
target A0, $q = 6$
target A0, $q = 12$
target A2, $q = 3$
target A2, $q = 6$
target A2, $q = 12$
$\rho = 0.75$
q_c
24
12
6
3
.09 .10 .12 .12 .13
.10 .12 .13 .15 .15
.11 .13 .15 .15 .15
.11 .13 .14 .14 .14
.06 .07 .08 .09 .10
.07 .08 .09 .11 .11
.08 .10 .11 .12 .13
.09 .10 .12 .13 .13
.03 .04 .05 .05 .06
.03 .04 .05 .05 .06
.04 .05 .06 .06 .07
.05 .06 .06 .07 .08
.13 .17 .16 .18 .19
.15 .20 .20 .20 .21
.14 .19 .19 .19 .20
.13 .16 .16 .16 .18
.08 .10 .10 .12 .14
.10 .13 .12 .13 .14
.10 .13 .12 .13 .14
.09 .11 .10 .11 .12
.07 .07 .08 .09 .11
.09 .09 .09 .10 .11
.10 .10 .09 .10 .11
.08 .10 .09 .09 .10
0.5 1 2 4 8
λ_c
gain $G(30)$, mean belief
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2