
theory: g(30)
1 (τ ∞)
0.94 (τ 16)
0.88 (τ 8)
0.78 (τ 4)
0.61 (τ 2)
0.37 (τ 1)
0.135 (τ 0.5)
0.018 (τ 0.25)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
0.08 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.04 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07
0.01 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07
1 2 3 4 6 8 12 16
q
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
theory: D(q→next)
1 (τ ∞)
0.94 (τ 16)
0.88 (τ 8)
0.78 (τ 4)
0.61 (τ 2)
0.37 (τ 1)
0.135 (τ 0.5)
0.018 (τ 0.25)
-0.002 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
-0.020 -0.006 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000
-0.035 -0.017 -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 -0.001
-0.023 -0.028 -0.018 -0.018 -0.008 -0.007 -0.003
+0.014 -0.015 -0.019 -0.028 -0.017 -0.017 -0.008
+0.033 +0.007 -0.003 -0.016 -0.016 -0.024 -0.014
+0.032 +0.015 +0.007 +0.003 -0.004 -0.012 -0.011
+0.029 +0.014 +0.008 +0.008 +0.004 +0.001 -0.003
1→2 2→3 3→4 4→6 6→8 8→12 12→16
q
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03