

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cuáles son los principios activos y qué aporta cada uno (Fosfatidilcolina, Fosfatidilserina, L-Tirosina, etc.)?	Quieren conocer los componentes y su rol en la función cerebral.	Neuro Vital Kid contiene una combinación de activos: Fosfatidilcolina y Fosfatidilserina (componentes clave de las membranas neuronales, importantes para la comunicación celular), L-Tirosina y L-Glutamina (aminoácidos precursores de neurotransmisores), Vitaminas B6, Niacina (B3) y Ácido Pantoténico (B5) (esenciales para el metabolismo energético neuronal y la síntesis de neurotransmisores), y Extracto seco de Ginkgo Biloba (conocido por mejorar la circulación cerebral y tener efectos antioxidantes).
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración o cantidad de cada principio activo por dosis/porción?	Necesitan saber las dosis exactas para evaluar la potencia y comparar.	[Indicar la cantidad exacta en mg o mcg de cada componente por porción/volumen, según la información completa del producto proporcionada por el laboratorio. La imagen no detalla las cantidades exactas por ingrediente].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué está indicado Neuro Vital Kid? ¿Cómo ayuda al rendimiento mental y aprendizaje?	Saber las condiciones o situaciones en las que es útil y el mecanismo por el cual mejora las funciones cognitivas.	Está indicado para [Las indicaciones clave visibles mencionan]: formar y mejorar el funcionamiento mental, mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje, promover la estimulación de la concentración y la atención, y apoyar la regeneración nerviosa y el estado de ánimo. Es un soporte nutricional para optimizar las funciones cognitivas en niños.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Hay evidencia clínica que respalde la eficacia de esta combinación en niños?	Buscan soporte científico para la prescripción.	[Mencionar si el laboratorio tiene estudios específicos con Neuro Vital Kid o evidencia robusta sobre la eficacia de los componentes individuales (ej. Fosfatidilserina en TDAH, Ginkgo en función cognitiva) en población pediátrica. Ser preciso sobre el tipo de evidencia].
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños? ¿Por edad o peso? ¿Cómo se toma?	Necesitan la pauta posológica precisa para niños.	La dosis recomendada es [Indicar la dosis exacta en volumen (mL) y frecuencia según la ficha técnica del laboratorio]. Se toma [Indicar si con o sin comidas, frecuencia diaria]. Es una emulsión oral.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Son seguros los componentes en niños?	Conocer los posibles efectos adversos y la seguridad en la población pediátrica.	Generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios son poco comunes y suelen ser leves, pudiendo incluir [Mencionar si aplica: molestias gastrointestinales leves]. Los componentes individuales suelen ser seguros a las dosis recomendadas en niños, pero siempre verificar la ficha técnica.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes?	Interacciones con otros medicamentos o suplementos.	[Mencionar si hay interacciones conocidas con los componentes individuales, ej: Ginkgo Biloba podría interactuar con anticoagulantes/antiagregantes, aunque a dosis bajas en un suplemento el riesgo es menor. Vitaminas del complejo B generalmente tienen pocas interacciones relevantes a dosis de suplemento].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (alergias, condiciones médicas)?	Saber cuándo no usarlo o usarlo con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Usar con precaución en pacientes con [Mencionar si aplica: trastornos de la coagulación por el Ginkgo, aunque a dosis bajas es menos probable; condiciones médicas donde ciertos componentes estén contraindicados].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Qué tal el sabor (si se menciona)?	Practicidad y aceptabilidad en niños.	Viene en presentación Emulsión con contenido neto de 180 mL. [Mencionar si tiene sabor y si está diseñado para ser agradable en niños, si esta información está disponible].

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cuáles son los principios activos (Acetaminofén, Clorfeniramina)? ¿Cómo actúan?	Quieren conocer los componentes y su mecanismo de acción para los síntomas del resfriado.	Los principios activos son Acetaminofén y Clorfeniramina Maleato. El Acetaminofén es un analgésico y antipirético (alivia el dolor y la fiebre). La Clorfeniramina Maleato es un antihistamínico que ayuda a reducir síntomas alérgicos como secreción nasal, estornudos y picor.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de cada principio activo por dosis?	Necesitan saber las dosis exactas para la dosificación pediátrica.	Cada dosis de 5 mL de Acetaclor Jarabe contiene 125 mg de Acetaminofén y 0.5 mg de Clorfeniramina Maleato.
Composición y Farmacología	¿Contiene otros componentes como azúcar?	Importante para pacientes diabéticos o consideraciones pediátricas.	Contiene sacarosa y vehículo. (Indicar si contiene azúcar o edulcorantes específicos, colorantes, conservantes, según la ficha técnica completa).
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué está indicado este jarabe? ¿Qué síntomas del resfriado alivia?	Saber las indicaciones específicas y el espectro de síntomas cubiertos.	Está indicado para el tratamiento sintomático del resfriado común. Ayuda a aliviar síntomas como [Basarse en la acción de los activos y síntomas comunes del resfriado: fiebre, dolor (ej. dolor de cabeza, muscular), congestión nasal, secreción nasal, estornudos].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es de uso pediátrico exclusivo o también se puede usar en adultos?	Confirmar la población objetivo.	Es de Uso Pediátrico. Las dosis están formuladas para esta población.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños? ¿Por edad o peso? ¿Con qué frecuencia?	Necesitan la pauta posológica precisa para niños.	[Indicar la dosis exacta en volumen (mL) o según la tabla de dosificación por edad/peso del laboratorio, y la frecuencia según la ficha técnica, ej: cada 4-6 horas]. (La imagen no especifica la dosificación exacta por edad/peso, solo la concentración).
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Somnolencia (por Clorfeniramina)?	Conocer los efectos esperados de los activos combinados.	Puede causar somnolencia debido a la Clorfeniramina. Otros efectos pueden incluir [Mencionar si aplica: sequedad de boca, visión borrosa, molestias gastrointestinales (por Acetaminofén)].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes?	Importante para evitar combinaciones peligrosas.	Puede potenciar el efecto sedante de otros depresores del SNC (alcohol, tranquilizantes). El Acetaminofén interactúa con ciertos medicamentos (ver Acetaten Forte).
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación (asma, problemas respiratorios)?	Saber cuándo usarlo con cuidado o no usarlo.	Contraindicado en hipersensibilidad a los componentes. Precaución en niños con problemas respiratorios preexistentes (asma) debido al antihistamínico. No usar con otros productos que contengan Acetaminofén para evitar sobredosis.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el uso pediátrico.	Viene en presentación Jarabe con contenido neto de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué vitaminas del complejo B contiene? ¿Cuál es la cantidad de cada una por dosis?	Quieren conocer la composición específica y las dosis de cada vitamina.	El principio activo es Vitaminas del complejo B. [Indicar específicamente qué vitaminas del complejo B contiene el jarabe (ej. B1, B2, B3, B5, B6, B12) y la cantidad exacta de cada una por dosis/porción, según la ficha técnica completa del laboratorio. La imagen solo dice "Vitaminas del complejo B"]. Son vitaminas hidrosolubles esenciales.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué está indicado este jarabe? ¿Cómo ayuda al crecimiento y desarrollo?	Conocer sus usos en deficiencias vitamínicas y como soporte general.	Está indicado como asociación de vitaminas hidrosolubles esenciales para crecimiento, desarrollo, cicatrización, integridad vascular, funciones inmunitarias, etc.. Es un suplemento para prevenir o tratar deficiencias del complejo B.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es solo para niños o también se usa en adultos?	Confirmar la población objetivo.	Es un suplemento vitamínico generalmente útil en diversas poblaciones con riesgo de deficiencia del complejo B. [Confirmar si está específicamente indicado para niños o si es para todas las edades según el laboratorio].
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Para quiénes? ¿Con qué frecuencia?	Necesitan la pauta posológica precisa.	[Indicar la dosis recomendada en volumen (mL) y frecuencia según la ficha técnica del laboratorio, para la población indicada (niños, adultos, si aplica)]. Se toma oralmente.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios?	Conocer los posibles inconvenientes (generalmente pocos con vitaminas hidrosolubles).	A dosis recomendadas, las vitaminas del complejo B suelen ser muy seguras. El exceso de vitaminas hidrosolubles se excreta por la orina. Rara vez reacciones alérgicas.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad.	Viene en presentación Jarabe con contenido neto de 120 mL. Tiene sabor a Naranja.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué vitaminas del complejo B y Lisina contiene? ¿Cuál es la cantidad de cada una?	Quieren conocer la composición específica, las dosis y el rol de la Lisina.	El principio activo es Vitaminas del complejo B y Lisina. Contiene una asociación de vitaminas hidrosolubles esenciales (igual que Vitacon B Complex, [Indicar específicamente qué vitaminas B y sus cantidades por dosis/porción, según laboratorio]) más Lisina. La Lisina es un aminoácido esencial, importante para la construcción de proteínas, incluyendo la masa muscular.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué está indicado este jarabe? ¿Cómo ayuda al crecimiento y la masa muscular?	Conocer sus usos en deficiencias vitamínicas y como soporte para el desarrollo físico.	Está indicado como asociación de vitaminas hidrosolubles, esenciales para el crecimiento y desarrollo. La Lisina añadida es esencial para la construcción de masa muscular y el crecimiento y desarrollo infantil. Es un suplemento para niños en crecimiento, especialmente aquellos con ingesta insuficiente de proteínas o bajo peso.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es principalmente para niños?	Confirmar la población objetivo.	Sí, está diseñado para el crecimiento y desarrollo infantil, con énfasis en la construcción de masa muscular. Es esencial para niños en crecimiento.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños? ¿Por edad o peso? ¿Con qué frecuencia?	Necesitan la pauta posológica precisa para niños.	[Indicar la dosis recomendada en volumen (mL) y frecuencia según la ficha técnica del laboratorio, para diferentes edades en niños]. Se toma oralmente.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios?	Conocer los posibles inconvenientes (generalmente pocos con vitaminas y aminoácidos).	A dosis recomendadas, suele ser muy bien tolerado. Los efectos secundarios son poco comunes.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad en niños.	Viene en presentación Jarabe con contenido neto de 180 mL. Tiene sabor a Naranja.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cuáles son los principios activos (Jengibre, Zinc, Vitamina C)? ¿Qué aporta cada uno?	Quieren conocer los componentes y su rol en la salud inmunológica y digestiva.	Los principios activos son Extracto de raíz de Zingiber officinale (jengibre), bisglicinato de zinc y ácido ascórbico (vitamina C). El Jengibre es conocido por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y beneficios digestivos. El Zinc es esencial para el sistema inmune y tiene acción antioxidante. La Vitamina C es un potente antioxidante y es crucial para la función inmune.
Composición y Farmacología	¿En qué forma está el Zinc y la Vitamina C? ¿Cuál es la cantidad de cada activo por dosis/porción?	Necesitan saber la forma química y las dosis exactas.	El Zinc está en forma de bisglicinato de zinc, una forma con buena biodisponibilidad. La Vitamina C es ácido ascórbico. [Indicar la cantidad exacta en mg o mcg de Extracto de jengibre, Zinc elemental (proveniente del bisglicinato) y Vitamina C por dosis/porción, según la información completa del producto proporcionada por el laboratorio. La imagen no detalla las cantidades exactas por ingrediente].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué está indicado este jarabe? ¿Cómo fortalece el sistema inmune y el proceso digestivo?	Saber las condiciones o situaciones en las que es útil y el mecanismo de acción.	Está indicado como complemento alimenticio con antioxidantes, que fortalecen el sistema inmune y al proceso digestivo. Ayuda a reforzar las defensas naturales del cuerpo y puede coadyuvar en casos de malestar digestivo leve.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil para prevenir resfriados o gripe? ¿O para aliviar síntomas digestivos como náuseas?	Conocer aplicaciones prácticas basadas en los componentes.	Basado en sus componentes, puede ser útil como soporte general para el sistema inmune en épocas de mayor riesgo. El jengibre tradicionalmente se ha usado para aliviar náuseas y mejorar la digestión. [Ser cauto y basarse en las indicaciones específicas del laboratorio - "fortalecen el sistema inmune y al proceso digestivo"].
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Para quiénes (edad)? ¿Cómo se toma?	Necesitan la pauta posológica exacta.	[Indicar la dosis recomendada en volumen (mL) y frecuencia según la ficha técnica del laboratorio. Especificar para qué edades está indicado (niños, adultos), si la información está disponible]. Se toma oralmente. [Indicar si se toma directo o diluido, con o sin comidas].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Molestias digestivas (por jengibre)? ¿Interacciones?	Conocer los posibles efectos adversos y precauciones.	Generalmente bien tolerado. El jengibre podría causar molestias digestivas leves en algunas personas. Las dosis altas de Vitamina C pueden causar efectos GI. El Zinc puede interactuar con ciertos medicamentos. [Mencionar efectos secundarios e interacciones relevantes según la ficha técnica completa].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (embarazo, lactancia, niños pequeños)?	Saber cuándo no usarlo o usarlo con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad a los componentes. [Mencionar precauciones específicas si existen, ej: en pacientes con cálculos biliares por el jengibre, o si no está indicado en embarazo/lactancia/niños muy pequeños].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad.	Viene en presentación Jarabe con contenido neto de 180 mL. [Mencionar si el sabor a jengibre/limón (implícito por la combinación) lo hace agradable].

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Citrato de Magnesio? ¿Cómo actúa como laxante?	Quieren conocer el principio activo y su mecanismo de acción laxante.	El principio activo es Citrato de Magnesio. Es un laxante salino osmótico que actúa atrayendo agua hacia el intestino. Este aumento de agua en el lumen intestinal ablanda las heces y estimula la motilidad intestinal, facilitando la evacuación. También tiene un efecto colagogo.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de estreñimiento está indicado? ¿Ocasional? ¿Constipación abdominal?	Saber las condiciones de uso para el estreñimiento.	Está indicado para el alivio temporal de la constipación abdominal y el tratamiento del estreñimiento ocasional causado por cambios en la dieta, estrés, o falta de actividad física.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Se usa para preparación intestinal antes de procedimientos? ¿Cuáles?	Conocer su utilidad en procedimientos médicos que requieren limpieza intestinal.	Sí, también está indicado para la preparación intestinal antes de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos, ayudando a vaciar completamente el intestino.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para cada indicación (estreñimiento, preparación)? ¿Es dosis única? ¿Se toma diluida?	Necesitan la pauta posológica exacta para cada uso.	La dosis varía según la indicación y la edad (si aplica). Para el alivio del estreñimiento ocasional, generalmente se toma una dosis única. Para la preparación intestinal, la pauta puede ser diferente. [Indicar la dosis exacta en mL o el volumen total del frasco según la indicación y edad (si está especificado) según la ficha técnica del laboratorio]. Se toma oralmente. [Indicar si se toma directo o diluido].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Diarrea, calambres? ¿Riesgo de deshidratación?	Conocer los efectos esperados y los riesgos, especialmente por pérdida de líquidos.	Los efectos secundarios más comunes son diarrea, calambres abdominales, náuseas y distensión abdominal. Debido a su mecanismo osmótico, puede causar deshidratación si no se acompaña de una adecuada ingesta de líquidos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay riesgo de hipermagnesemia? ¿En quiénes?	Preocupación por el exceso de magnesio, especialmente en insuficiencia renal.	El riesgo de hipermagnesemia (niveles altos de magnesio) existe, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, ya que no excretan el magnesio adecuadamente. También en casos de sobredosis. Los síntomas pueden incluir debilidad muscular, confusión y problemas cardíacos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes?	Interacciones con otros medicamentos.	Puede disminuir la absorción de ciertos medicamentos (ej. antibióticos como tetraciclinas y quinolonas). Debe tomarse separado de otros medicamentos (generalmente 2-3 horas antes o después). Usar con precaución en pacientes que toman medicamentos que afectan los electrolitos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones importantes (insuficiencia renal, obstrucción intestinal)?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en casos de insuficiencia renal grave, obstrucción intestinal, dolor abdominal intenso de origen desconocido (podría ser apendicitis), perforación intestinal, íleo, megacolon tóxico. Usar con precaución en pacientes con enfermedad cardíaca o renal leve a moderada, y desequilibrios electrolíticos preexistentes.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad.	Viene en presentación Solución Oral con contenido neto de 240 mL. [La imagen sugiere sabor a limón por el nombre "Limonada", confirmar si se especifica sabor en el producto].

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Bisglicinato ferroso y por qué lo usan?	Quieren saber sobre esta forma particular de hierro: su absorción, tolerancia GI, y si es superior a otras formas (sulfato ferroso, fumarato ferroso).	El Bisglicinato ferroso es una sal de hierro quelada con dos moléculas de glicina. Esta quelación [Explicar beneficio según laboratorio: mejora absorción, reduce efectos GI, es más biodisponible, etc.].
Composición y Farmacología	¿Cuántos mg de hierro elemental aporta Feryfol por porción?	Necesitan saber la cantidad exacta de hierro activo para calcular la dosis y comparar con otras sales.	[Indicar el dato exacto del laboratorio: "Cada porción de Feryfol aporta X mg de hierro elemental"]. El Bisglicinato ferroso tiene un ~20% de hierro elemental. Debes tener el dato exacto.
Composición y Farmacología	¿Por qué tiene Vitamina B9 (Ácido Fólico)?	Quieren saber la sinergia entre el hierro y el ácido fólico y su importancia en la anemia.	La Vitamina B9 (Ácido Fólico) es esencial para la formación de glóbulos rojos y la síntesis de ADN. Su inclusión potencia el efecto antianémico del hierro, tratando o previniendo anemias megaloblásticas concurrentes, comunes en el embarazo.
Composición y Farmacología	¿Contiene azúcar u otros excipientes relevantes (sabor, etc.)?	Importante por pacientes diabéticos, niños, alergias, o simplemente aceptabilidad.	La base es un jarabe con sabor a avellana. [Indicar si tiene azúcar o edulcorantes específicos]. [Mencionar otros excipientes relevantes como colorantes, conservantes].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué tipos de anemia ferropénica está indicado?	Necesitan saber si es para prevención, tratamiento, anemias leves/moderadas.	Feryfol está indicado para la prevención y el tratamiento de la anemia ferropénica en diversas etapas, incluyendo [Mencionar: deficiencia latente, anemia leve a moderada].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es suficiente para el tratamiento de la anemia en el embarazo?	El embarazo aumenta la necesidad de hierro; quieren saber si la dosis es adecuada.	Sí, Feryfol está específicamente indicado en el embarazo para prevenir y tratar la anemia ferropénica gestacional, una condición muy común. La dosis por porción está diseñada para cubrir las necesidades incrementadas.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Hay evidencia clínica que respalde su eficacia?	Buscan estudios o experiencia que muestren que realmente aumenta los niveles de hierro y hemoglobina.	[Mencionar si hay estudios específicos con Feryfol o evidencia robusta sobre la eficacia del Bisglicinato ferroso en anemia ferropénica]. "Estudios han demostrado que [Bisglicinato ferroso/Feryfol] es eficaz para restaurar los depósitos de hierro y mejorar los parámetros hematológicos."
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada (en adultos, embarazadas, niños)?	Necesitan pautas posológicas claras para prescribir.	La dosis recomendada es [Indicar la dosis exacta en volumen (mL) o número de porciones] al día para adultos y embarazadas. Para niños, la dosis se ajusta según la edad/peso [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Dosificación y Administración	¿Cómo se administra? ¿Con o sin alimentos?	Para optimizar la absorción y minimizar efectos secundarios.	Se recomienda administrar Feryfol [Indicar si con o sin alimentos, o si es flexible. Generalmente el hierro se absorbe mejor en ayunas, pero la tolerancia mejora con alimentos. El Bisglicinato puede tener mejor tolerancia]. [Si aplica: "Evitar tomar con lácteos, té o café"].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios gastrointestinales típicos?	El hierro es conocido por causar náuseas, estreñimiento o diarrea.	Gracias a la forma de Bisglicinato ferroso, Feryfol tiende a tener una mejor tolerancia gastrointestinal comparado con otras sales de hierro como el sulfato ferroso. Los efectos como náuseas o estreñimiento son menos frecuentes o intensos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones con otros medicamentos?	El hierro interactúa con varios medicamentos (antibióticos, antiácidos).	Sí, el hierro puede interactuar con [Mencionar interacciones clave: Tetraciclinas, Quinolonas, Antiácidos, Levotiroxina]. Recomendar separar la administración [Indicar tiempo según laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones?	Para evitar su uso en pacientes inadecuados (ej. hemocromatosis).	Contraindicado en casos de hipersensibilidad, anemias no ferropénicas (ej. megaloblásticas por déficit de B12 sin corregir, hemolíticas), hemocromatosis o hemosiderosis.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Para cuánto dura?	Aspecto práctico para el paciente y la prescripción.	Feryfol viene en envase de 120 mL. Con la dosis típica para adultos/embarazadas, dura aproximadamente [Calcular duración según dosis y volumen] días.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es exactamente el Sulfato de zinc heptahidratado?	Quieren saber la naturaleza química del compuesto, si es una forma común y estable de zinc para suplementación.	Es una sal inorgánica de zinc, en su forma más común y estable, que contiene siete moléculas de agua en su estructura cristalina ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$). Es una fuente fiable de zinc.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la cantidad de zinc elemental que proveen esos 15 mg por porción?	Necesitan saber la cantidad exacta de zinc activo para calcular la dosis y comparar.	Cada porción de 7.5 mL contiene 15 mg de zinc elemental, en forma de sulfato de zinc. Esto significa una concentración de 2 mg de zinc elemental por mL de jarabe.
Composición y Farmacología	¿Cómo se compara la biodisponibilidad del sulfato de zinc heptahidratado con otras formas?	Quieren saber si esta forma particular de zinc se absorbe bien y es efectiva.	El sulfato de zinc es una forma bien establecida y generalmente considerada con buena absorción intestinal. Es una forma eficaz para suplementar zinc.
Composición y Farmacología	¿Contiene algún otro componente o excipiente relevante (azúcar, alérgenos)?	Importante por posibles alergias, pacientes diabéticos, o aceptabilidad.	La base es un jarabe con sabor a uva. [Indicar si tiene azúcar u otros edulcorantes específicos, colorantes, conservantes, según la ficha técnica completa].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué casos específicos de deficiencia de zinc está indicado?	Saber si es para deficiencias leves, moderadas, o en poblaciones de riesgo.	Zincosol está indicado para corregir deficiencias de zinc en pacientes de todas las edades, y como apoyo al sistema inmunológico. Esto incluye poblaciones de riesgo (niños con ingesta insuficiente, malabsorción, etc.) y como coadyuvante en el manejo de diarrea aguda infantil.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cuál es la evidencia clínica que respalda el uso de zinc para el apoyo al sistema inmune?	Buscan evidencia científica que justifique esta indicación.	El zinc es esencial para el desarrollo y función de las células inmunes. La suplementación ha demostrado [Mencionar si aplica: ayudar a reducir la duración o severidad de los síntomas del resfriado común si se inicia tempranamente, o apoyar la función inmune en niños desnutridos]. [Si hay estudios específicos del laboratorio, mencionarlos].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil en alguna patología particular (ej. diarrea aguda en niños)?	Quieren saber si hay indicaciones terapéuticas específicas.	Sí, es útil en el manejo de la diarrea aguda en niños. La suplementación con zinc es recomendada por la OMS/UNICEF para reducir la duración y severidad de los episodios diarreicos.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños (por peso)? ¿Y para adultos?	Necesitan la pauta posológica precisa, especialmente para niños.	Para niños menores de 12 años, la dosis se calcula según el peso: 1 mg de zinc elemental por kg de peso corporal al día, con un tope de 20 mg/día. Puede usar la fórmula: Volumen (mL) = (Dosis mg/kg * Peso kg) / 2 mg/mL. O referirse a ejemplos prácticos. Para niños mayores de 12 años y adultos: una porción de 7.5 mL (que aporta 15 mg de zinc elemental) al día.
Dosificación y Administración	¿Cómo se administra el jarabe? ¿Con o sin comidas? ¿Se reparte la dosis?	Para optimizar absorción, tolerabilidad y adherencia.	La dosis diaria puede repartirse en 1-2 tomas (p.ej. mañana y tarde). Se recomienda tomar entre las comidas.
Dosificación y Administración	¿Cómo se mide "una porción" o los mL exactos? ¿Viene con dosificador?	Aspecto práctico para asegurar la administración correcta por parte del paciente.	Sí, el frasco incluye una cucharita/jeringa dosificadora para medir los 7.5 mL que equivalen a una porción. Permite medir el volumen exacto requerido según el cálculo por peso.
Sabor y Adherencia	¿El sabor a uva es bien aceptado por los niños? ¿Ayuda con la adherencia?	La adherencia en niños es clave.	El sabor a uva ha sido seleccionado específicamente para mejorar la palatabilidad y la adherencia al tratamiento en niños y adultos, ayudando a enmascarar el posible sabor metálico del zinc.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, especialmente gastrointestinales?	Saber qué esperar con este tipo de suplemento.	Los efectos secundarios más comunes son gastrointestinales leves, como náuseas, dolor abdominal o diarrea, especialmente con dosis altas o en ayunas. Tomarlo entre comidas ayuda a reducirlos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes con otros medicamentos o minerales?	Importante para evitar problemas de absorción o toxicidad.	El zinc puede interferir con la absorción de ciertos antibióticos (quinolonas, tetraciclinas) y otros minerales como hierro y calcio. Se recomienda separar la administración. Altas dosis de zinc a largo plazo pueden afectar la absorción de cobre.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna contraindicación para su uso?	Saber cuándo no prescribirlo.	Contraindicado en casos de hipersensibilidad a las sales de zinc. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Para cuánto dura?	Practicidad para la prescripción.	Viene en un envase de 120 mL. La duración del frasco dependerá de la dosis diaria prescrita según el peso del niño o si es para un adulto.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Acetaminofén (Paracetamol)? ¿Cómo actúa?	Química y mecanismo de acción del principio activo.	El Acetaminofén, también conocido como Paracetamol, es un analgésico y antipirético. Actúa [Explicar brevemente el mecanismo de acción: inhibición de COX central, acción sobre centros termorreguladores en hipotálamo]. No tiene acción antiinflamatoria periférica significativa.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Acetaminofén en esta suspensión?	Necesitan saber los mg por mL o por 5 mL para calcular la dosis en niños.	Acetaten Forte Suspensión contiene 180 mg de Acetaminofén por cada 5 mL. Esto facilita la dosificación pediátrica.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de dolor o fiebre está indicado?	Saber el espectro de uso: leve, moderado, qué condiciones trata.	Acetaten Forte está indicado para el alivio sintomático del dolor de intensidad leve a moderada (cefalea, dolor dental, mialgias) y para la reducción de la fiebre en cuadros virales o infecciosos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es seguro y eficaz en población pediátrica?	Confirmar su uso y dosificación adecuada en niños, que son un grupo clave para este fármaco.	Sí, Acetaten Forte Suspensión está formulado específicamente para uso pediátrico (y adulto que prefiera la suspensión). La dosificación se basa en el peso y la edad del niño para garantizar seguridad y eficacia.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis para niños (por peso/edad)? ¿Y para adultos?	Necesitan la pauta posológica precisa.	La dosificación pediátrica se calcula principalmente por peso: [Indicar dosis estándar en mg/kg y/o proporcionar la tabla de dosis por edad y peso del inserto]. Para adultos, la dosis es [Indicar dosis estándar en mL o mg, y frecuencia]. La dosis máxima diaria no debe exceder [indicar límite para niños y adultos].
Dosificación y Administración	¿Cada cuánto tiempo se puede administrar?	Intervalo mínimo entre dosis para evitar toxicidad.	Se puede administrar cada [Indicar el intervalo mínimo, usualmente 4-6 horas]. No exceder [Indicar número máximo de dosis por día].
Dosificación y Seguridad	¿Cuál es la principal precaución/riesgo del Acetaminofén?	La hepatotoxicidad es el riesgo más conocido con sobredosis.	La principal precaución es no exceder la dosis máxima recomendada, ya que una sobredosis puede causar daño hepático grave. Se debe advertir a los pacientes sobre el contenido de Acetaminofén en otros productos para evitar duplicidad.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene muchas interacciones farmacológicas?	Para evitar combinaciones peligrosas.	Generalmente tiene pocas interacciones significativas a dosis terapéuticas. Precaución con inductores enzimáticos hepáticos (ej. fenobarbital, carbamazepina) o alcohol en consumo crónico, que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad. La colestiramina puede disminuir su absorción.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Viene con dosificador?	Practicidad para la familia y la administración precisa.	El envase es de 120 mL. Incluye un dosificador [describir: vaso, jeringa] calibrado para facilitar la medición exacta de la dosis, especialmente en niños.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el extracto de berro y cómo actúa como fluidificante bronquial?	Quieren entender las propiedades de este extracto natural y su mecanismo de acción en la tos/mucosidad.	El extracto de berro contiene compuestos [Mencionar si se sabe: glucosinolatos, isotiocianatos] que le confieren propiedades expectorantes y mucolíticas suaves. Actúa [Explicar mecanismo postulado: estimulando la secreción bronquial, fluidificando el moco, facilitando su expulsión].
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Aceite de eucalipto?	Conocer el rol de este componente en la fórmula respiratoria.	El Aceite de eucalipto contiene cineol (eucaliptol), que tiene propiedades [Mencionar: mucolíticas, expectorantes, broncodilatadoras leves y antisépticas]. Ayuda a fluidificar las secreciones y puede tener un efecto calmante sobre la tos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué tipo de tos está indicado? ¿Tos seca, productiva? ¿Aguda, crónica?	Saber si es para aliviar la tos irritativa o para ayudar a expulsar flemas.	Jarabe de Berro está indicado principalmente en casos de tos productiva o con presencia de mucosidad, asociada a cuadros como [Mencionar: resfriado común, bronquitis, procesos catarrales]. Ayuda a fluidificar las secreciones para facilitar su expectoración.
Indicaciones y Eficacia Clínica	Menciona "antiviral", ¿Hay evidencia específica de esto para este producto?	Curiosidad sobre una indicación menos común para un jarabe a base de extractos.	El componente [Identificar si el Berro o el Eucalipto] posee propiedades [Mencionar si hay evidencia: in vitro, estudios preliminares] que sugieren actividad antiviral. Aunque la indicación principal es fluidificante/expectorante, esta propiedad [Explicar beneficio postulado: podría ayudar a combatir agentes causantes de la infección respiratoria]. Sé cauto con esta afirmación si no tienes evidencia robusta específica del producto.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis para niños y adultos?	Necesitan la pauta posológica.	La dosis recomendada es [Indicar dosis en volumen (mL) y frecuencia] para adultos. Para niños, la dosis se ajusta según la edad [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios relevantes?	Saber si puede causar somnolencia, efectos GI, o reacciones alérgicas.	Generalmente es bien tolerado. Los efectos secundarios son poco comunes y leves, pudiendo incluir [Mencionar si aplica: molestias digestivas suaves]. [Si aplica: "No causa somnolencia"].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay interacciones con otros medicamentos respiratorios (broncodilatadores, mucolíticos)?	Para evitar duplicidad o interacciones.	No se conocen interacciones relevantes con los medicamentos respiratorios comunes a dosis terapéuticas. Se puede usar concomitantemente [Confirmar con ficha técnica].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones?	Saber cuándo no prescribirlo.	Contraindicado en casos de hipersensibilidad a los componentes. Precaución en pacientes [Mencionar si aplica: con gastritis, úlcera péptica por el rábano en algunos compuestos similares, aunque aquí es berro].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el paciente.	Viene en un envase de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cómo actúa el Óxido de zinc en la dermatitis del pañal?	Quieren saber el mecanismo de acción de este componente clásico.	El Óxido de zinc es un astringente y protector cutáneo. Forma una barrera física sobre la piel que aísla de la humedad y las enzimas irritantes presentes en la orina y heces. También tiene propiedades antisépticas suaves que ayudan a prevenir la sobreinfección.
Composición y Farmacología	¿Qué aporta la Vitamina E a la formulación?	Conocer el beneficio adicional de este componente.	La Vitamina E es un antioxidante y tiene propiedades hidratantes y regeneradoras de la piel. Ayuda a nutrir y reparar la piel irritada o dañada, complementando la acción protectora del óxido de zinc.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la base de la crema? ¿Es oclusiva? ¿Contiene petrolato?	Saber si la textura y la base son adecuadas para la piel del bebé o quemaduras.	La crema tiene una base [Describir base: emoliente, con/sin petrolato, no grasa, etc.]. Es una formulación [Describir: oclusiva (si contiene petrolato/parafina) o semi-oclusiva] diseñada para crear una barrera protectora duradera. [Indicar si contiene petrolato u otros componentes clave].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de dermatitis del pañal está indicada? ¿Leve, moderada?	Saber la severidad de los casos que puede tratar.	Crema para Panalitis está indicada para la prevención y el tratamiento de la dermatitis del pañal leve a moderada. Es efectiva formando una barrera que promueve la curación y protege de futuras irritaciones.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil en otros tipos de irritaciones cutáneas o quemaduras leves?	Conocer otros posibles usos.	Sí, además de la dermatitis del pañal, puede ser útil para [Mencionar otras indicaciones de la ficha técnica: irritaciones menores de la piel, rozaduras, quemaduras leves] por sus propiedades protectoras y regeneradoras.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Cuántas veces al día?	Pauta de uso para los padres.	Limpiar y secar bien la zona afectada. Aplicar una capa generosa de crema en cada cambio de pañal, cubriendo toda el área. En quemaduras leves o irritaciones, aplicar [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: 2-3 veces al día] sobre la piel limpia y seca.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede causar alergia?	Saber el perfil de seguridad, especialmente en pieles sensibles como la del bebé.	Generalmente es muy bien tolerada. Los efectos secundarios son raros, principalmente reacciones de hipersensibilidad en personas sensibles a algún componente. Es hipoalérgica [Confirmar si tiene esta característica certificada].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución de uso?	Situaciones en las que no debería usarse.	Evitar aplicar sobre heridas abiertas o infecciones cutáneas severas sin supervisión médica. Solo para uso externo.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad tiene el tarro?	Practicidad para el uso frecuente.	Viene en un tarro de 50 g, un tamaño práctico para uso domiciliario y llevar en la pañalera.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Citrato tricálcico comparado con otras sales de calcio?	Quieren saber sobre la absorción, tolerancia y contenido de calcio elemental.	El Citrato tricálcico es una sal de calcio que generalmente ofrece buena absorción, incluso en pacientes con baja acidez gástrica, y suele ser mejor tolerada a nivel gastrointestinal comparada con el carbonato de calcio. Aporta un porcentaje [Indicar % de calcio elemental] de calcio elemental.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la función de la Vitamina D3 (Colecalciferol) en esta fórmula?	Conocen su importancia para el calcio, pero quieren entender su rol específico aquí.	La Vitamina D3 es crucial para la absorción intestinal de calcio y fósforo, y su incorporación a los huesos. Su presencia en Calzinc D asegura que el calcio administrado se absorba y utilice eficazmente para la salud ósea.
Composición y Farmacología	¿Por qué se incluye Óxido de zinc? ¿Qué papel juega el zinc con el calcio/hueso?	Quieren saber la justificación de esta combinación.	El zinc es un mineral importante para la salud ósea, participando en la síntesis de colágeno y la mineralización ósea. Su inclusión complementa la acción del calcio y la vitamina D3 en el metabolismo óseo y el crecimiento.
Composición y Farmacología	¿Cuántos mg/UI de cada componente (Calcio, Vitamina D3, Zinc) por porción?	Necesitan saber la dosis exacta de cada activo.	[Indicar la cantidad exacta en mg de calcio elemental (proveniente del citrato tricálcico), UI o mcg de Vitamina D3, y mg de zinc elemental (proveniente del óxido de zinc) por porción, según laboratorio].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué casos de osteoporosis está indicado? ¿Prevención o tratamiento?	Saber el rol de este suplemento en el manejo de la osteoporosis.	Calzinc D está indicado como coadyuvante en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, ayudando a asegurar un aporte adecuado de calcio y Vitamina D3, esenciales para mantener la densidad mineral ósea.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Por qué está indicado en embarazo, lactancia y crecimiento infantil?	Son etapas de alta demanda de calcio y otros minerales.	Estas son etapas fisiológicas con necesidades aumentadas de calcio, Vitamina D y zinc para el desarrollo óseo y general. Calzinc D ayuda a cubrir estos requerimientos para un adecuado crecimiento infantil y para preservar la salud ósea materna durante embarazo y lactancia.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para cada indicación (osteoporosis, embarazo, niños)?	Necesitan pautas claras para cada grupo de pacientes.	[Proporcionar el esquema posológico específico para adultos (osteoporosis, embarazo/lactancia) y para niños (por edad/peso) según las indicaciones del laboratorio].
Dosificación y Administración	¿Cómo se administra la suspensión? ¿Agitar antes de usar? ¿Con comidas?	Aspectos prácticos para el paciente y optimizar absorción/tolerancia.	Es una suspensión, por lo que debe agitarse bien antes de cada uso para asegurar una dosis homogénea. Se recomienda tomar [Indicar si con o sin comidas, generalmente con comidas mejora la absorción del calcio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios (GI, etc.)?	Saber qué esperar y si hay problemas comunes.	Generalmente es bien tolerado. Ocasionalmente pueden presentarse molestias gastrointestinales leves como estreñimiento o sensación de pesadez estomacal. La forma de citrato de calcio
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes (tiroideas, antibióticos, etc.)?	El calcio interactúa con varios medicamentos.	Sí, el calcio puede interactuar con [Mencionar interacciones clave: Tetraciclinas, Quinolonas, Levotiroxina, Bifosfonatos]. Se recomienda separar la administración [Indicar tiempo según ficha técnica]. El zinc también puede interactuar con antibióticos (ver Zincosol).
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (hipercalcemia, litiasis renal)?	Para evitar su uso en pacientes de riesgo.	Contraindicado en casos de hipercalcemia, hipercalcemia, litiasis renal cálcica, insuficiencia renal grave. Usar con precaución en pacientes con antecedentes de cálculos renales.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Para cuánto dura?	Practicidad para el paciente.	El envase es de 240 mL. La duración depende de la dosis prescrita [Calcular duración aproximada con la dosis típica].

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué contiene el Aceite de hígado de bacalao además de Vitaminas A y D?	Saber si aporta Omega-3 u otros componentes relevantes.	Principalmente aporta Vitaminas A y D. También contiene ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA), aunque en cantidades que varían y pueden no estar estandarizadas a menos que se indique lo contrario en la etiqueta.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Vitaminas A y D por porción? ¿En qué unidades (UI, mcg)?	Necesitan saber la dosis exacta de las vitaminas.	[Indicar la cantidad exacta en UI o mcg de Vitamina A y Vitamina D3 por porción, según el laboratorio. Es crucial saber si es D2 o D3, usualmente es D3].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Qué significa "Hipovitaminosis A/D"? ¿En qué casos se presenta?	Quieren saber las causas y síntomas de estas deficiencias vitamínicas.	La Hipovitaminosis A y D son deficiencias de estas vitaminas, comunes en dietas inadecuadas, desnutrición, o problemas de absorción. Pueden manifestarse con problemas de visión (vitamina A), salud ósea (vitamina D), función inmune, etc.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda en la desnutrición y el crecimiento infantil?	Saber su rol en el soporte nutricional y el desarrollo.	En la desnutrición, aporta vitaminas liposolubles esenciales (A y D) que suelen estar deficientes. Para el crecimiento infantil, la Vitamina D es clave para el desarrollo óseo, y la Vitamina A para el desarrollo general y la visión.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Hay otras indicaciones tradicionales o usos comunes (ej. sistema inmune)?	Conocer usos no listados explícitamente pero que son de conocimiento popular.	Tradicionalmente se ha asociado con el apoyo al sistema inmune y la salud general, aunque la indicación primaria es la corrección o prevención de deficiencias A y D y el soporte al crecimiento.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños (por edad) y adultos?	Necesitan la pauta posológica.	La dosis recomendada es [Indicar dosis en volumen (mL) y frecuencia] para adultos. Para niños, la dosis se ajusta según la edad [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Dosificación y Administración	¿Tiene un sabor fuerte o es bien tolerada? El sabor a naranja ayuda?	El sabor y la textura pueden ser una barrera para la adherencia, especialmente en niños.	Es una emulsión con sabor a naranja para mejorar la palatabilidad y hacerla más aceptable, especialmente para los niños, ayudando a enmascarar el sabor característico del aceite de hígado de bacalao.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios (GI, sabor persistente)?	Saber qué esperar con este tipo de producto (eructos con sabor a pescado).	Los efectos secundarios más comunes son gastrointestinales leves como eructos con sabor a pescado, náuseas o diarrea con dosis altas. Generalmente bien tolerada a dosis recomendadas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay riesgo de toxicidad por vitaminas liposolubles (A y D) con esta dosis?	Preocupación por la acumulación de Vitaminas A y D.	A las dosis recomendadas, el riesgo de toxicidad por Vitamina A o D es bajo. Sin embargo, se debe advertir sobre no exceder la dosis diaria recomendada y considerar el aporte de estas vitaminas de
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes?	Vitaminas liposolubles pueden interactuar con ciertos medicamentos.	Precaución con anticoagulantes (la Vitamina A en dosis muy altas podría potenciar su efecto, aunque poco probable a dosis de suplemento) y con medicamentos que afecten la absorción de grasas.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el paciente.	Viene en un envase de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Ácido ascórbico? ¿Cómo actúa como Vitamina C?	Conocer la forma química de la Vitamina C y su mecanismo.	El Ácido ascórbico es la forma química de la Vitamina C, una vitamina hidrosoluble esencial. Actúa como un potente antioxidante, participa en la síntesis de colágeno, la función inmune y la absorción de hierro.
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Extracto de cítricos? ¿Flavonoides? ¿Algún beneficio extra?	Saber si es solo sabor o si tiene un componente activo adicional.	El Extracto de cítricos [Confirmar con laboratorio si aporta solo sabor y aroma O si está estandarizado para aportar bioflavonoides]. Si aporta bioflavonoides: "Aporta bioflavonoides que [Explicar beneficio: pueden mejorar la absorción y el efecto antioxidante de la Vitamina C]".
Composición y Farmacología	¿Cuántos mg de Ácido ascórbico por porción?	Necesitan saber la dosis exacta de Vitamina C.	[Indicar la cantidad exacta en mg de Ácido ascórbico por porción, según laboratorio].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué casos de déficit de Vitamina C está indicado? ¿Escorbuto?	Saber si es para prevención o tratamiento de deficiencias clínicas.	Vitacon C está indicado para la prevención y el tratamiento del déficit de Vitamina C, incluyendo estados carenciales manifiestos (escorbuto, aunque menos común) o subclínicos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda en infecciones y estrés oxidativo?	Conocer el rol de la Vitamina C en estas condiciones.	La Vitamina C es un antioxidante clave que ayuda a proteger las células del daño causado por el estrés oxidativo. También modula la función inmune, lo que puede ser beneficioso durante procesos infecciosos [Ser cauteloso con afirmaciones sobre curar o prevenir infecciones, enfocar en soporte].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil para reducir la duración o severidad del resfriado común?	Es un uso popular de la Vitamina C; quieren saber la postura basada en evidencia.	[Basarse en la evidencia actual y la postura del laboratorio]: La evidencia sugiere que la suplementación regular con Vitamina C podría [Mencionar si aplica: reducir ligeramente la duración o severidad de los síntomas del resfriado común en algunas poblaciones (ej. deportistas extremos) O indicar que la evidencia es mixta y su principal rol es preventivo de la deficiencia y soporte general].
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para niños y adultos?	Necesitan la pauta posológica.	La dosis recomendada es [Indicar dosis en volumen (mL) y frecuencia] para adultos. Para niños, la dosis se ajusta según la edad [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puedo causar problemas gastrointestinales?	Saber qué esperar, especialmente con dosis altas.	A dosis recomendadas es muy segura. Dosis muy altas pueden causar molestias gastrointestinales como diarrea, náuseas o calambres abdominales, y aumentar el riesgo de cálculos renales de oxalato en personas susceptibles.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay interacciones relevantes?	Vitamina C puede interactuar con pruebas de laboratorio o medicamentos.	Dosis altas de Vitamina C pueden interferir con pruebas de laboratorio (glucosa en orina, pruebas de sangre oculta en heces). Puede aumentar la absorción de hierro (beneficioso en anemia).
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el paciente.	Viene en un envase de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Citrato de potasio? ¿Cuántos mEq de potasio por dosis?	Necesitan saber la cantidad de potasio elemental o sus equivalentes (mEq) para ajustar la dosis.	El Citrato de potasio es una sal que aporta potasio y citrato. [Indicar la cantidad exacta en mEq de potasio y/o mg de Citrato de potasio por dosis/volumen, según laboratorio]. El citrato se metaboliza a bicarbonato, teniendo un efecto alcalinizante.
Composición y Farmacología	¿Cuál es el rol del Ácido cítrico en esta fórmula?	Saber si es solo para el pH o si tiene otro efecto.	El Ácido cítrico se incluye principalmente para ajustar el pH de la solución y mejorar la estabilidad. [Si aplica y el laboratorio lo menciona: podría contribuir marginalmente al pool de citrato].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué casos de acidosis metabólica está indicado? ¿Qué tipo de acidosis?	Saber si es para acidosis renal tubular, acidosis por diarrea, etc.	Está indicado para el tratamiento de la acidosis metabólica crónica, particularmente la Acidosis Tubular Renal (ATR), o en otras condiciones donde se requiera un agente alcalinizante sistémico.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo funciona para la litiasis renal? ¿Qué tipo de cálculos previene?	Entender el mecanismo de prevención de cálculos renales con citrato.	El citrato urinario inhibe la cristalización y agregación de sales formadoras de cálculos, especialmente los de oxalato de calcio. El Citrato de Potasio también aumenta el pH urinario, ayudando a prevenir cálculos de ácido úrico. Está indicado para la prevención de [Mencionar tipos de cálculos: oxalato de calcio, ácido úrico] asociados a hipocitraturia o acidosis tubular renal.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de hipokalemia (déficit de potasio)? ¿Leve, moderada?	Saber si es para corregir deficiencias leves o moderadas de potasio.	Se utiliza para el tratamiento de la hipokalemia, especialmente cuando está asociada a acidosis metabólica o se requiere un agente alcalinizante. Es útil para reponer los niveles de potasio.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Cómo se ajusta? ¿Se puede diluir?	Necesitan la pauta posológica, ajuste según niveles séricos, y forma de administración.	La dosis es muy variable y debe ajustarse individualmente según la severidad de la condición y los niveles séricos de potasio y bicarbonato. [Proporcionar rango de dosis usual en mEq/día y frecuencia]. La solución debe diluirse en agua u otro líquido para minimizar irritación GI.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Náuseas, diarrea, hiperkalemia?	Conocer los riesgos, especialmente GI y el riesgo de exceso de potasio.	Los efectos secundarios más comunes son gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. El riesgo más serio es la hiperkalemia (niveles altos de potasio en sangre), especialmente en pacientes con insuficiencia renal o que toman ciertos medicamentos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son las interacciones farmacológicas clave?	El potasio y el citrato interactúan con varios fármacos.	Interacciones importantes con [Mencionar: Diuréticos ahorradores de potasio (espiro o eplerenona, amilorida, triamtereno) -> riesgo de hiperkalemia severa; IECA, ARA II -> riesgo de hiperkalemia; AINES -> pueden reducir excreción de potasio; Antiácidos con aluminio/magnesio -> pueden aumentar absorción de citrato].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones importantes?	Saber cuándo no usarlo (insuficiencia renal es crítica).	Contraindicado en casos de insuficiencia renal aguda o crónica severa, hiperkalemia, enfermedad de Addison, deshidratación aguda, daño miocárdico severo, obstrucción del tracto urinario,
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tienen los envases?	Practicidad para el paciente y la duración del tratamiento.	Viene en presentaciones de 500 mL y 1 L.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Cloruro de magnesio USP? ¿Es una buena fuente de magnesio elemental?	Quieren saber la cantidad de magnesio activo y la calidad del compuesto (USP).	El Cloruro de magnesio es una sal de magnesio que aporta [Indicar el % o mg de magnesio elemental por dosis/volumen, según laboratorio]. La calidad USP indica que cumple con los estándares de pureza y calidad de la Farmacopea de Estados Unidos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué casos de déficit de magnesio está indicado? ¿Qué síntomas trata?	Saber si es para hipomagnesemia clínica o deficiencia subclínica.	Indicado para la prevención y el tratamiento de la hipomagnesemia (déficit de magnesio). Puede ser útil en pacientes con [Mencionar causas: ingesta insuficiente, mala absorción, pérdidas renales/GI excesivas por diuréticos, alcoholismo]. Los síntomas de déficit incluyen [Mencionar: calambres musculares, fatiga, debilidad, arritmias].
Indicaciones y Eficacia Clínica	Menciona "equilibrio mental", ¿hay evidencia de esto? ¿Ansiedad, estrés?	Quieren saber si hay un beneficio documentado en el estado de ánimo o neurológico.	El magnesio juega un papel en la función neurotransmisora y neuromuscular. [Mencionar si hay evidencia o estudios que sugieran un posible beneficio en la reducción de síntomas asociados a estrés, ansiedad leve, o mejora del sueño, si el laboratorio lo respalda. Ser cauto con afirmaciones directas sobre tratamiento de trastornos mentales].
Indicaciones y Eficacia Clínica	Menciona "salud ósea", ¿cómo ayuda el magnesio a los huesos?	Conocen el calcio y la Vitamina D; quieren saber el rol del magnesio.	El magnesio es un componente estructural del hueso y participa en el metabolismo óseo. Un déficit de magnesio puede afectar la salud ósea. Su suplementación apoya el mantenimiento de una densidad mineral ósea saludable.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Cómo se ajusta? ¿Se puede diluir?	Necesitan la pauta posológica y forma de administración.	La dosis varía según la severidad del déficit y la indicación. [Proporcionar rango de dosis usual en mg de magnesio elemental/día o volumen]. La solución oral debe diluirse en agua u otro líquido para mejorar la tolerabilidad y reducir el efecto laxante.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? ¿El efecto laxante?	El efecto laxante es bien conocido con sales de magnesio.	El efecto secundario más común es la diarrea, debido al efecto osmótico del magnesio no absorbido en el intestino. Otros efectos pueden incluir náuseas o calambres abdominales. Generalmente dosis más bajas o dilución lo reducen.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuál es el riesgo de hipermagnesemia? ¿En quiénes?	Preocupación por el exceso de magnesio, especialmente en ciertas poblaciones.	El riesgo de hipermagnesemia es bajo en personas con función renal normal. El riesgo aumenta significativamente en pacientes con insuficiencia renal debido a la menor excreción de magnesio.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones con otros medicamentos?	El magnesio interactúa con varios fármacos.	Interacciones importantes con [Mencionar: Ciertos antibióticos (Tetraciclinas, Quinolonas) -> el magnesio disminuye su absorción, separar administración; Diuréticos (asa y tiazidas) -> pueden aumentar excreción de magnesio; Laxantes/Antiácidos que contienen magnesio -> riesgo de acumulación/efecto laxante excesivo].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones importantes?	Saber cuándo no usarlo (insuficiencia renal es crítica).	Contraindicado en casos de insuficiencia renal grave, hipermagnesemia, miastenia gravis, bloqueo cardíaco. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tienen los envases?	Practicidad para el paciente.	Viene en presentaciones de 500 mL y 1 L.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué son los extractos de Bálsamo de Tafú y Polígala? ¿Cómo actúan en la tos?	Quieren saber sobre estos componentes menos comunes y su mecanismo de acción.	El Bálsamo de Tafú es un bálsamo natural con propiedades [Mencionar si se conoce: balsámicas, expectorantes, antitusivas leves]. La Polígala (Polygala senega) es una planta tradicionalmente usada como expectorante, ya que contiene saponinas que irritan la mucosa gástrica y reflejamente aumentan la secreción bronquial, fluidificando el moco.
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Eucaliptol?	Conocer el rol de este componente más conocido.	El Eucaliptol (cineol) es un componente del aceite de eucalipto con propiedades [Mencionar: mucolíticas, expectorantes y broncodilatadoras leves]. Ayuda a fluidificar las secreciones y puede tener un efecto calmante.
Composición y Farmacología	¿Es un antitusivo, un expectorante, o ambos?	Clarificar la acción principal del jarabe.	Es una formulación compuesta que combina efectos expectorantes (Polígala, Eucaliptol) y balsámicos/calmantes (Bálsamo de Tafú). Está orientado a la tos asociada a la presencia de mucosidad para facilitar su expulsión.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué tipo de tos está indicado? ¿Tos con flema, tos seca?	Saber si es para tos productiva o irritativa.	Está indicado para el alivio sintomático de la tos productiva o con presencia de secreciones bronquiales, asociada a [Mencionar: bronquitis, resfriado común, procesos catarrales]. Ayuda a fluidificar el moco y facilitar la expectoración. No es ideal para tos seca.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis para niños y adultos?	Necesitan la pauta posológica.	La dosis recomendada es [Indicar dosis en volumen (mL) y frecuencia] para adultos. Para niños, la dosis se ajusta según la edad [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede causar somnolencia? ¿O irritación GI?	Saber qué esperar con este tipo de compuestos.	Generalmente es bien tolerado. Los efectos secundarios son poco comunes y leves, pudiendo incluir [Mencionar si aplica: molestias digestivas suaves por las saponinas de la polígala en personas sensibles]. [Indicar si causa o no somnolencia - usualmente no con estos componentes].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay interacciones relevantes?	Interacciones con otros medicamentos.	No se reportan interacciones mayores con medicamentos comunes a dosis terapéuticas. [Confirmar con ficha técnica del laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (asma, tos crónica)?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en casos de hipersensibilidad a los componentes. Precaución en pacientes con [Mencionar si aplica: asma, tos crónica persistente (evaluar causa subyacente), o historial de úlcera péptica por posible irritación de saponinas].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el paciente.	Viene en un envase de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Extracto de rábano? ¿Cómo actúa como expectorante?	Quieren saber sobre las propiedades de este extracto natural.	El Extracto de rábano contiene compuestos [Mencionar si se sabe: azufrados, isotiocianatos] que tienen propiedades mucolíticas y expectorantes suaves. Ayudan a fluidificar las secreciones bronquiales.
Composición y Farmacología	¿Qué aportan el Jengibre y la Canela? ¿Son solo sabor o tienen acción terapéutica?	Saber si son excipientes o principios activos con efecto propio.	El Jengibre y la Canela aportan [Mencionar si es solo sabor/aroma O si tienen efectos reconocidos: Jengibre puede tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a calmar la tos; Canela puede tener propiedades antisépticas suaves y ayudar con el sabor]. Contribuyen al sabor y pueden tener un efecto coadyuvante.
Composición y Farmacología	Menciona "apoyo en hipotiroidismo", ¿esto significa que contiene Yodo? ¿En qué forma?	Quieren saber si realmente aporta Yodo y si es relevante para la función tiroidea.	Sí, el término "Yodado" implica que contiene una fuente de Yodo [Indicar la forma química si se conoce, ej: Yoduro de potasio o está inherentemente en algún extracto si el laboratorio lo especifica]. El Yodo es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, por lo que puede ser útil como soporte [Aclarar: No es un tratamiento para el hipotiroidismo, es un suplemento de Yodo]. [Indicar la cantidad de Yodo por porción si es relevante].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué tipo de tos está indicado? ¿Es un expectorante?	Saber si es para ayudar a eliminar la flema.	Rábano Yodado está indicado como expectorante para aliviar la tos productiva con dificultad para expulsar flemas, asociada a [Mencionar: resfriado, bronquitis]. Ayuda a fluidificar y movilizar las secreciones.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo apoya en el hipotiroidismo? ¿Es un tratamiento sustitutivo?	Necesitan saber el alcance de esta indicación.	No es un tratamiento sustitutivo hormonal para el hipotiroidismo. Su utilidad como "apoyo" se basa en aportar Yodo, un nutriente esencial para la función tiroidea, en casos donde la ingesta dietética pueda ser insuficiente o como soporte nutricional general. No sustituye la medicación tiroidea.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis para niños y adultos?	Necesitan la pauta posológica.	La dosis recomendada es [Indicar dosis en volumen (mL) y frecuencia] para adultos. Para niños, la dosis se ajusta según la edad [Proporcionar esquema posológico pediátrico según laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede afectar la tiroides en pacientes no hipotiroideos?	Saber qué esperar y si el componente Yodado tiene riesgos.	Generalmente bien tolerado. Podrían presentarse molestias digestivas leves por los extractos. En cuanto al Yodo, a dosis suplementarias normales no debería causar problemas en personas con función tiroidea normal. En personas con ciertas condiciones tiroideas preexistentes (ej. tiroiditis autoinmune) o ingesta excesiva de Yodo de otras fuentes, podría haber riesgo.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (problemas tiroideos, yodo)?	Saber cuándo no usarlo, especialmente por el Yodo.	Contraindicado en casos de hipersensibilidad a los componentes. Precaución extrema en pacientes con hipertiroidismo o nódulos tiroideos tóxicos debido al contenido de Yodo. Usar con precaución en pacientes con tiroiditis de Hashimoto u otras enfermedades tiroideas autoinmunes (consultar al endocrinólogo).
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase?	Practicidad para el paciente.	Viene en un envase de 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cómo actúan el Mentol y el Eucaliptol para la congestión nasal?	Quieren saber el mecanismo de alivio sintomático.	El Mentol y el Eucaliptol (cineol) son rubefacientes y descongestionantes tópicos. Al aplicarse en el pecho/cuello, sus vapores son inhalados, produciendo una sensación refrescante que alivia la percepción de la congestión nasal y ayuda a respirar mejor. No descongestionan directamente las mucosas.
Composición y Farmacología	¿Qué base tiene la pomada? ¿Es oclusiva (Petrolato)?	Saber la textura, capacidad hidratante/protectora y si puede bloquear poros.	La base principal es el Petrolato. Es una base grasa oclusiva que forma una capa protectora sobre la piel. Esto ayuda a retener la humedad y facilita la liberación lenta de los vapores de mentol y eucaliptol.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda con la congestión nasal? ¿Es solo sintomático? ¿Para quién es (niños/adultos)?	Clarificar su uso principal y poblaciones objetivo.	Está indicada para el alivio sintomático temporal de la congestión nasal y el malestar asociado al resfriado común, mediante la inhalación de sus vapores. Es útil en [Confirmar poblaciones según laboratorio: niños (>X años, importante por el mentol en niños pequeños) y adultos].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda con las picaduras de insectos?	Conocer el mecanismo de alivio en picaduras.	El Mentol tiene un efecto refrescante y anestésico local leve que ayuda a aliviar la picazón (prurito) y la irritación asociada a las picaduras de insectos.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Dónde? ¿Cuántas veces al día?	Necesitan la pauta de aplicación.	Aplicar una capa fina en el pecho y el cuello, frotando suavemente. Se puede aplicar [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: 2-3 veces al día], especialmente antes de dormir para facilitar la respiración. Evitar aplicar cerca de las fosas nasales, especialmente en niños pequeños.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación de la piel?	Saber qué esperar con la aplicación tópica.	Generalmente bien tolerada. Puede causar irritación local, enrojecimiento o sensación de quemazón en pieles sensibles. Raramente reacciones alérgicas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución de uso? ¿En niños pequeños?	El mentol puede causar laringoespasma en bebés.	Muy importante: No aplicar directamente en las fosas nasales ni en el área cercana a la nariz, especialmente en niños menores de [Indicar edad límite según ficha técnica, crucial por riesgo de laringoespasma/broncoespasmo con mentol/eucaliptol en lactantes]. Evitar aplicar sobre piel lesionada o irritada.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad tiene el tarro?	Practicidad.	Viene en un tarro de 50 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Aceite de parafina y la Cera de abejas a la crema?	Quieren saber los componentes principales y su función en la piel.	El Aceite de parafina es un emoliente y oclusivo que forma una película sobre la piel, reduciendo la pérdida de agua y proporcionando hidratación. La Cera de abejas ayuda a espesar la crema y contribuye a formar una barrera protectora suave.
Composición y Farmacología	¿Qué significa que es una "Crema Fría"?	El término implica una sensación o tipo de formulación específica.	El término "Crema Fría" se refiere a una emulsión (generalmente agua en aceite) que al evaporarse el agua tras la aplicación produce una sensación refrescante. Es un tipo clásico de formulación emoliente.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de piel está indicada? ¿Seca, sensible, hipoalergénica?	Saber las características de la crema y su público objetivo.	Está indicada como hidratante para pieles normales a secas, y es especialmente útil para pieles sensibles o propensas a irritación ya que se describe como hipoalergénica [Confirmar si tiene estudios o certificación de hipoalergenicidad].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo funciona como desmaquillante?	Quieren saber si es efectiva y suave para retirar maquillaje.	Su base emoliente y oleosa (Aceite de parafina) permite disolver y retirar eficazmente el maquillaje, incluso el resistente al agua, de forma suave sin irritar la piel. La fase acuosa ayuda a limpiar.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica como hidratante? ¿Y como desmaquillante?	Pauta de uso para cada indicación.	Como hidratante: aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, según necesidad. Como desmaquillante: aplicar sobre el rostro, masajear suavemente para disolver el maquillaje y retirar con algodón o pañuelo. No requiere enjuague con agua si se usa solo como desmaquillante suave.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede obstruir los poros (comedogénica)?	Saber si puede causar acné o irritación.	Generalmente muy segura y bien tolerada debido a su formulación simple y protectora. El Aceite de parafina puede ser comedogénico en algunas personas con piel propensa al acné, aunque en una base de Crema Fría y con cera puede ser menos problemático. [Confirmar si es no comedogénica según laboratorio]. Reacciones alérgicas a la cera de abejas son raras pero posibles.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Es segura para pieles muy sensibles o de bebé?	Confirmar su idoneidad para pieles delicadas.	Siendo hipoalergénica y con una base emoliente simple, es generalmente muy segura para pieles sensibles, secas e incluso para la piel delicada del bebé. [Confirmar restricción de edad si aplica].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad tiene el tarro?	Practicidad.	Viene en un tarro de 50 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cómo actúa el Azufre micronizado en estas condiciones de piel?	Quieren saber el mecanismo de acción del azufre en escabiosis, acné, etc.	El Azufre micronizado tiene propiedades [Mencionar: queratolíticas (ayuda a descamar la piel), antibacterianas, antifúngicas y parasitocidas suaves]. En escabiosis, actúa directamente contra el ácaro; en acné y dermatitis seborreica, ayuda a reducir la inflamación, controlar la proliferación bacteriana/fúngica y regular la producción de sebo. La micronización mejora su dispersión y actividad.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Azufre?	Dato clave para la potencia y seguridad del producto.	[Indicar el porcentaje (%) de Azufre micronizado en la pomada, según laboratorio]. La concentración es importante para la eficacia y el riesgo de irritación.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es efectivo para la escabiosis (sarna)? ¿Cómo se usa?	Saber si es un tratamiento de primera línea o coadyuvante, y la pauta de aplicación.	La Pomada de Azufre es un tratamiento tradicional y efectivo para la escabiosis, especialmente en ciertas poblaciones (ej. bebés) o como alternativa. [Indicar la pauta de tratamiento específica según laboratorio: aplicar en todo el cuerpo (excepto cara/cabeza en adultos, sí en niños), dejar actuar X horas o toda la noche, lavar, repetir por X días/noches]. Es fundamental tratar a contactos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda en el acné y la dermatitis seborreica?	Conocer el rol del azufre en estas patologías comunes.	En el acné, ayuda a [Mencionar: reducir la inflamación, controlar la bacteria P. acnes, y tiene un efecto queratolítico que ayuda a destapar poros]. En la dermatitis seborreica, ayuda a [Mencionar: controlar la proliferación del hongo Malassezia y reducir la inflamación/descamación].
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿En qué frecuencia para cada indicación?	Pauta de uso para las diferentes patologías.	Para escabiosis: [Repetir pauta de tratamiento específica]. Para acné/dermatitis seborreica: Aplicar una capa fina solo en las áreas afectadas [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: 1-2 veces al día], generalmente después de limpiar la piel.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Irritación, sequedad, olor?	El azufre puede ser irritante y tiene un olor característico.	Puede causar irritación, enrojecimiento, sequedad y descamación de la piel, especialmente al inicio o con uso excesivo. Tiene un olor característico a azufre. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad al azufre. Usar con precaución en pieles muy sensibles o con eczema agudo. No aplicar en grandes extensiones de piel ni por periodos prolongados sin supervisión médica.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad tiene el tarro?	Practicidad.	Viene en un tarro de 50 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Calamina? ¿Cómo actúa en la piel?	Quieren saber la composición y el mecanismo de acción de este clásico tópico.	La Calamina es una mezcla de Óxido de zinc (aproximadamente 98%) y Óxido férrico (aproximadamente 2%). Actúa como un protector cutáneo suave con propiedades astringentes, antisépticas suaves y antipruriginosas (alivia el picor). El Óxido de zinc es el componente principal responsable de la acción calmante y protectora.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Calamina en la loción?	Dato clave para la potencia del producto.	La Loción Calamina contiene Calamina al 8%. Esta concentración es la habitual y efectiva para su uso indicado.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿En qué tipo de picaduras o irritaciones cutáneas está indicada? ¿Prurito?	Saber el espectro de condiciones que alivia.	Está indicada para el alivio sintomático del picor y la irritación de la piel causados por [Mencionar: picaduras de insectos, quemaduras solares leves, hiedra venenosa, roble venenoso, zumaque venenoso, y otras irritaciones cutáneas leves]. Tiene un efecto refrescante y calmante.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica la loción? ¿Cuántas veces al día? ¿Se agita?	Pauta de uso y preparación del producto.	Es una suspensión, por lo que debe agitarse bien antes de cada uso para redistribuir la calamina. Aplicar una capa fina sobre el área afectada con algodón o un paño suave. Dejar secar. Puede aplicarse [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: varias veces al día] según sea necesario para aliviar el picor.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede secar la piel?	Saber qué esperar con el uso tópico.	Generalmente muy bien tolerada. El efecto secundario más común es la sequedad de la piel debido al efecto astringente y secante del óxido de zinc. Esto puede ser más notorio con el uso frecuente. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a los componentes. Solo para uso externo. No aplicar sobre piel lesionada, heridas abiertas o infecciones cutáneas (fúngicas, bacterianas) sin supervisión médica.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tienen los envases?	Practicidad para el paciente y la duración del tratamiento.	Viene en envases de 110 mL y 180 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cuál es el principio activo y su concentración en este gel?	La concentración de alcohol es clave para la efectividad antimicrobiana.	El principio activo es Alcohol etílico desnaturalizado al 70% v/v. Esta concentración es la recomendada por autoridades sanitarias por su eficacia para eliminar gérmenes.
Composición y Farmacología	¿Cómo actúa este gel para eliminar gérmenes en las manos?	Mecanismo de acción antimicrobiana.	El alcohol al 70% actúa desnaturalizando las proteínas de los microorganismos (bacterias, virus y hongos), dañando su estructura y eliminándolos eficazmente.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza principalmente? ¿Elimina hasta el 99.9% de los gérmenes?	Conocer su uso principal y el grado de efectividad declarado.	Está indicado específicamente para la limpieza de manos. Es un antiséptico y antibacterial de uso tópico. Elimina hasta el 99.9% de los gérmenes instantáneamente.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Sustituye el lavado de manos con agua y jabón?	Clarificar su rol en la higiene de manos.	Es una alternativa eficaz y conveniente para la higiene de manos cuando no se dispone de agua y jabón, o como complemento. El lavado con agua y jabón es preferible si las manos están visiblemente sucias.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Qué cantidad?	Pauta de uso para asegurar la efectividad.	Aplicar una cantidad suficiente en la palma de la mano para cubrir todas las superficies de ambas manos. Frotar vigorosamente hasta que estén completamente secas. No necesita enjuague.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Puede resecar la piel con el uso frecuente? ¿Irritación?	El alcohol puede ser secante.	El uso frecuente puede causar sequedad de la piel debido al alcohol. [Mencionar si el producto contiene emolientes (como glicerina o aloe vera) que ayuden a mitigar la sequedad, si esta información está en el catálogo aunque no se vea en la imagen].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Es inflamable? ¿Hay que tener precauciones?	El alcohol es inflamable.	Sí, es inflamable. Mantener alejado del fuego, chispas y fuentes de calor. No usar cerca de llamas abiertas. Dejar secar completamente en las manos antes de manipular fuentes de ignición.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones? ¿Uso en niños?	Seguridad en poblaciones especiales.	Solo para uso externo. No ingerir. Usar en niños bajo supervisión de un adulto. Evitar el contacto con ojos y mucosas. No aplicar sobre piel lesionada.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tiene el envase? ¿Cómo son los dispensadores?	Practicidad para diferentes usos (personal, familiar, institucional).	Disponible en presentaciones de 60 mL, 120 mL, 240 mL (con tapa flip top), 500 mL y 1 L (con válvula dispensadora).

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Alcohol etílico? ¿Es suficiente para desinfectar?	La concentración de alcohol es clave para la efectividad antimicrobiana.	Contiene Alcohol etílico al 70%. Esta concentración es la recomendada por las autoridades sanitarias (ej. CDC, OMS) por ser óptima para la acción bactericida y virucida, ya que el agua permite que el alcohol penetre mejor la membrana celular de los microorganismos.
Composición y Farmacología	¿Cómo actúa el alcohol para desinfectar las manos?	Mecanismo de acción antimicrobiana.	El alcohol actúa desnaturalizando las proteínas esenciales para la supervivencia de bacterias, virus y hongos. Causa daño a la membrana celular microbiana.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Contra qué microorganismos es efectivo? ¿Bacterias, virus (coronavirus), hongos?	Conocer el espectro de acción.	Es efectivo contra una amplia gama de bacterias y virus (incluyendo virus encapsulados como coronavirus, virus de la gripe) y algunos hongos. Es una medida eficaz para reducir la transmisión de infecciones cuando el lavado de manos con agua y jabón no es posible.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Sustituye el lavado de manos con agua y jabón?	Clarificar su rol en la higiene de manos.	El lavado de manos con agua y jabón es el método preferido para la higiene de manos, especialmente si las manos están visiblemente sucias o grasosas. El gel antibacterial es una alternativa eficaz cuando no se dispone de agua y jabón, o como complemento.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Cuánta cantidad? ¿Hasta que se seque?	Pauta de uso para asegurar la efectividad.	Aplicar una cantidad suficiente en la palma de una mano (cubrir toda la superficie de las manos). Frotar las manos vigorosamente, cubriendo todas las superficies (palmas, dorsos, entre dedos, debajo de uñas), hasta que estén completamente secas. No enjuagar.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Puede resecar la piel con el uso frecuente? ¿Irritación?	El alcohol puede ser secante.	El uso frecuente de geles con alcohol puede causar sequedad de la piel. [Mencionar si el producto contiene emolientes como glicerina o aloe vera que ayuden a mitigar la sequedad]. Ocasionalmente puede haber irritación leve en pieles sensibles.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Es inflamable? ¿Hay que tener precauciones?	El alcohol es inflamable.	Sí, es inflamable debido a su alto contenido de alcohol. Mantener alejado del fuego o fuentes de calor. No usar cerca de llamas abiertas. Dejar secar completamente antes de manipular fuentes de ignición.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones? ¿Uso en niños?	Seguridad en poblaciones especiales.	Solo para uso externo. No ingerir. Usar en niños bajo supervisión de un adulto. No aplicar sobre piel lesionada o quemada.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tienen los envases?	Practicidad para diferentes usos (personal, familiar).	Viene en presentaciones de 80 mL (personal) hasta 1 L (familiar/institucional).

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué son el Timol y el Triclosán? ¿Cómo actúan como antisépticos bucales?	Quieren conocer los principios activos y su mecanismo de acción antimicrobiana en la boca.	El Timol es un fenol con propiedades antisépticas y antifúngicas. El Triclosán es un agente antibacteriano de amplio espectro. Juntos, ayudan a reducir la carga microbiana en la cavidad bucal [Explicar mecanismo: dañan la membrana celular, inhiben enzimas bacterianas].
Composición y Farmacología	¿Ayuda a controlar la placa y la gingivitis?	Saber si es efectivo para problemas comunes de salud bucal.	Sí, gracias a la acción antiséptica del Timol y Triclosán, Denti-OL ayuda a [Mencionar beneficios según laboratorio: reducir la acumulación de placa bacteriana (una de las principales causas de gingivitis) y, por ende, contribuye a la prevención y el control de la gingivitis].
Composición y Farmacología	¿Contiene alcohol? ¿Es relevante para la salud bucal?	El alcohol en enjuagues es un tema de debate por sequedad o irritación.	[Indicar si contiene alcohol y en qué porcentaje]. Si contiene alcohol: "Contiene X% de alcohol, lo cual ayuda a solubilizar los principios activos y potencia la acción antiséptica. [Si aplica: Mencionar si es bajo en alcohol o sin alcohol como una ventaja si el laboratorio lo promueve]". Si no contiene alcohol: "Es libre de alcohol, lo que lo hace más suave y menos propenso a causar sequedad bucal o irritación".
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cuándo se recomienda su uso? ¿Como complemento al cepillado?	Saber su lugar en la rutina de higiene bucal.	Denti-OL está indicado como complemento a la higiene bucal diaria (cepillado e hilo dental) para potenciar la eliminación de bacterias, controlar la placa y ayudar a mantener las encías saludables.
Dosificación y Administración	¿Cómo se usa? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces al día?	Pauta de uso correcta para la efectividad.	Enjuagar la boca con [Indicar volumen recomendado en mL] de enjuague sin diluir, durante [Indicar tiempo recomendado, ej: 30 segundos], [Indicar frecuencia, ej: 2 veces al día] después del cepillado. No ingerir. No enjuagar con agua inmediatamente después.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede teñir los dientes? ¿Alterar el gusto?	Conocer los posibles inconvenientes con el uso de antisépticos bucales.	Posibles efectos secundarios incluyen [Mencionar: sensación de ardor o picor leve, alteración temporal del gusto]. [Indicar si puede causar tinción dental con el uso prolongado, especialmente si contiene Clorhexidina, aunque en este caso son Timol y Triclosán, menos propensos, pero confirmarlo con laboratorio].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones? ¿Uso en niños?	Seguridad en poblaciones especiales.	Contraindicado en hipersensibilidad a los componentes. No recomendado para niños menores de [Indicar edad límite según laboratorio/normativa, usualmente 6-12 años] que no puedan escupir correctamente.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad para el uso regular.	Viene en un frasco de 250 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Mentol? ¿Es solo para refrescar?	Quieren saber la función de este componente conocido.	El Mentol proporciona una sensación refrescante y calmante sobre la piel. También puede tener un efecto antiprurítico (alivia el picor) leve.
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Ácido bórico? ¿Cuál es su rol? ¿No es riesgoso?	Quieren saber sobre este componente y posibles preocupaciones de seguridad.	El Ácido bórico tiene propiedades antisépticas suaves y ayuda a controlar el crecimiento bacteriano y fúngico, contribuyendo a reducir el mal olor. [Abordar la seguridad]: A las concentraciones permitidas y en formulaciones tópicas para piel intacta, es considerado seguro para uso externo. No debe usarse en piel lesionada o irritada, especialmente en niños pequeños, debido al riesgo de absorción sistémica.
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Talco? ¿Cuál es su función principal?	Conocer el componente base.	El Talco es un polvo inerte que actúa como base absorbente. Ayuda a absorber el exceso de humedad en la piel, manteniéndola seca y reduciendo la fricción, lo que previene irritaciones y maceración.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué sirve como desodorante y refrescante corporal?	Saber cómo funciona para controlar el olor y dar sensación de frescura.	Actúa absorbiendo la humedad (sudor), un medio de cultivo para bacterias que causan el mal olor. El Ácido bórico tiene una acción antiséptica suave contra estas bacterias, y el Mentol proporciona una sensación refrescante.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Ayuda a prevenir rozaduras o irritaciones por humedad?	Saber si es útil en zonas de pliegues o fricción.	Sí, al mantener la piel seca y reducir la fricción gracias al talco, ayuda a prevenir la formación de rozaduras, irritaciones y maceración en zonas propensas a la humedad (ej. axilas, ingles, pies).
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso.	Aplicar sobre la piel limpia y seca en las áreas deseadas (axilas, pies, pliegues corporales). Espolvorear una pequeña cantidad y extender suavemente. Usar según necesidad, generalmente 1-2 veces al día. Evitar inhalar el polvo.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación? ¿Problemas respiratorios (inhalación)?	Saber qué esperar y los riesgos de inhalación del polvo.	Generalmente bien tolerado. La principal precaución es evitar la inhalación del polvo, ya que puede causar irritación respiratoria. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Rara vez irritación local en pieles muy sensibles.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones importantes (Ácido Bórico)?	Saber cuándo no usarlo, especialmente en niños pequeños o piel dañada.	Contraindicado en piel lesionada, quemada o irritada, especialmente en niños pequeños, debido al riesgo de absorción sistémica del Ácido bórico. Solo para uso externo en piel intacta. No usar en el área del pañal en bebés. Evitar inhalar.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidades tienen las talqueras?	Practicidad para el consumidor.	Viene en talqueras de 90 g y 200 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Petrolato puro? ¿Cómo actúa como hidratante y protector?	Quieren conocer la naturaleza del componente y su mecanismo de acción.	El Petrolato puro (Vaselina) es un hidrocarburo semisólido altamente refinado. Actúa formando una barrera oclusiva sobre la superficie de la piel, lo que reduce significativamente la pérdida de agua transepidérmica (TEWL), manteniendo la piel hidratada indirectamente. No aporta humedad por sí mismo.
Composición y Farmacología	¿Es comedogénico (obstruye poros)? ¿Es relevante para ciertos pacientes?	Preocupación en pieles propensas al acné.	El Petrolato puro puede ser comedogénico (obstruir los poros) en algunas personas, especialmente aquellas con piel grasa o propensa al acné. [Confirmar si el laboratorio tiene algún proceso de purificación extra o lo etiqueta como no comedogénico].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de piel o condiciones está indicada? ¿Sequedad, irritación?	Saber el espectro de uso de este emoliente clásico.	Está indicada como hidratante para pieles muy secas o agrietadas, como protector para pieles irritadas o expuestas (ej. frío, viento), para prevenir rozaduras, y como base para formulaciones magistrales. Es útil en la recuperación de la barrera cutánea dañada.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil para proteger la piel alrededor de heridas o irritaciones?	Conocer su uso como barrera protectora.	Sí, forma una excelente barrera protectora para aislar la piel sana o irritada de la humedad, la fricción o agentes externos, facilitando el proceso de curación natural subyacente. Útil alrededor de estomas, heridas en cicatrización (no aplicar en la herida abierta a menos que esté indicado).
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Cuántas veces al día?	Pauta de uso.	Aplicar una capa fina sobre la piel limpia y seca en el área afectada. Masajear suavemente si es necesario. Aplicar según necesidad, especialmente después del baño o exposición a condiciones adversas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede causar alergias?	Conocer los posibles inconvenientes.	Es uno de los ingredientes tópicos más inertes y con menor potencial de causar reacciones alérgicas. El principal efecto secundario, si aplica, sería la comedogenicidad en pieles predispuestas o una sensación "grasosa".
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución?	Situaciones en las que hay que tener cuidado.	Solo para uso externo. Evitar aplicar sobre heridas abiertas profundas o quemaduras severas sin supervisión médica. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidades tienen los tarros?	Practicidad para el consumidor.	Viene en tarros de 25 g y 85 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aportan el Hidróxido de magnesio y el Hidróxido de aluminio?	Quieren saber los principios activos y su mecanismo de acción como antiácidos.	NeutroX combina Hidróxido de magnesio e Hidróxido de aluminio. Son antiácidos no sistémicos que actúan neutralizando el exceso de ácido clorhídrico en el estómago 1 . El Hidróxido de magnesio tiende a ser más rápido y el Hidróxido de aluminio más lento, pero más prolongado, además de contrarrestar el efecto laxante del magnesio.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de cada hidróxido por porción?	Necesitan saber la potencia del antiácido para la dosificación.	La suspensión contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 185 mg y gel de hidróxido de magnesio equivalente a 200 mg por cada 5 mL 1 .
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de hiperacidez gástrica está indicado? ¿Síntomas?	Saber las condiciones que alivia.	Está indicado para el tratamiento de la hiperacidez gástrica, proporcionando alivio rápido y efectivo de síntomas como [Mencionar síntomas comunes: acidez estomacal, indigestión ácida, ardor] 2 .
Dosificación y Administración	¿Cómo se toma la suspensión? ¿Con qué frecuencia? ¿Antes o después de comidas?	Pauta de uso para el paciente.	La dosis es [Indicar dosis en volumen (mL) según ficha técnica, usualmente 5-10 mL]. Se toma según necesidad para aliviar los síntomas. Generalmente se recomienda tomar [Indicar si entre comidas, después de comidas, o al acostarse, según ficha técnica para optimizar alivio]. Agitar antes de usar 3 .
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios comunes? ¿Estreñimiento, diarrea?	Balance de efectos GI entre el aluminio (estreñimiento) y el magnesio (diarrea).	La combinación busca minimizar los efectos sobre el tránsito intestinal. El Hidróxido de aluminio puede causar estreñimiento y el Hidróxido de magnesio puede causar diarrea. La combinación suele ser mejor tolerada. Otros efectos pueden ser [Mencionar si aplica: sabor a menta persistente].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes con otros medicamentos?	Los antiácidos interactúan con muchos fármacos.	Sí, los antiácidos pueden disminuir la absorción de muchos medicamentos, incluyendo [Mencionar ejemplos clave: Tetraciclinas, Quinolonas, algunos antifúngicos orales, hierro, digoxina]. Se recomienda separar la administración [Indicar tiempo: usualmente 2-4 horas] de otros medicamentos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones importantes (problemas renales)?	El aluminio y el magnesio pueden acumularse en insuficiencia renal.	Contraindicado en hipersensibilidad a los componentes. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que el aluminio y el magnesio pueden acumularse. No usar por periodos prolongados o a dosis altas sin supervisión médica.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tiene el envase?	Practicidad.	Viene en envases de 180 mL 1 y 240 mL 3 .

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Hidróxido de Magnesio y cómo actúa como antiácido y laxante?	Quieren saber el principio activo y su doble mecanismo de acción.	La Leche de Magnesio es una suspensión de Hidróxido de Magnesio. Actúa como antiácido neutralizando el ácido gástrico. Como laxante, el magnesio no absorbido atrae agua hacia el intestino, aumentando el volumen y la motilidad intestinal.
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Hidróxido de Magnesio?	Dato clave para dosificar tanto el efecto antiácido como el laxante.	La suspensión contiene 8.5 g% (equivalente a 8.5 g por 100 mL) de Hidróxido de Magnesio.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cuándo se usa como antiácido? ¿Es rápido?	Saber si es una opción para alivio de la acidez.	Se usa para el alivio ocasional de la hiperacidez gástrica y la indigestión ácida. Su efecto antiácido es rápido, pero también puede tener un efecto laxante concurrente.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cuándo se usa como laxante? ¿Para qué tipo de estreñimiento?	Saber su indicación principal como laxante.	Se usa como laxante para el alivio del estreñimiento ocasional. Es un laxante osmótico suave.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada para cada indicación (antiácido, laxante)?	Necesitan pautas claras para cada uso.	La dosis varía según la indicación: Como antiácido: [Indicar dosis en volumen (mL) según ficha técnica, usualmente menor]. Como laxante: [Indicar dosis en volumen (mL) según ficha técnica, usualmente mayor]. Siempre agitar bien antes de usar.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios principales? ¿La diarrea es común?	El efecto laxante es el más conocido.	El efecto secundario más común es la diarrea, especialmente con dosis mayores usadas como laxante. También puede causar calambres abdominales.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay riesgo de acumulación de magnesio? ¿En quiénes?	Preocupación por la hipermagnesemia, especialmente en insuficiencia renal.	El riesgo de hipermagnesemia es bajo en personas con función renal normal. El riesgo aumenta significativamente en pacientes con insuficiencia renal, ya que el magnesio no se excreta adecuadamente.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones con otros medicamentos?	El magnesio interactúa con varios fármacos.	Sí, el magnesio puede disminuir la absorción de muchos medicamentos (similar a otros antiácidos de magnesio), incluyendo [Mencionar ejemplos clave: Tetraciclinas, Quinolonas]. Se
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones importantes?	Saber cuándo no usarlo (insuficiencia renal es crítica).	Contraindicado en casos de insuficiencia renal grave, hipermagnesemia, síntomas de apendicitis, obstrucción intestinal. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. No usar como laxante por periodos prolongados.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tienen los envases? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad.	Viene en envases de 120 mL. Está disponible con sabor a menta y sabor original.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Albendazol? ¿Cómo actúa contra los parásitos intestinales?	Quieren conocer el principio activo y su mecanismo antiparasitario.	El Albendazol es un antihelmíntico de amplio espectro. Actúa [Explicar mecanismo: uniéndose a la beta-tubulina del parásito, inhibiendo la polimerización de los microtúbulos. Esto altera funciones vitales del parásito como la captación de glucosa, llevándolo a la inmovilización y muerte].
Composición y Farmacología	¿Cuál es la concentración de Albendazol en la suspensión?	Dato clave para dosificar, especialmente en niños.	La suspensión de Nemozol contiene 400 mg de Albendazol en 10 mL. Esto permite una dosificación conveniente.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Contra qué parásitos específicos es efectivo?	Saber el espectro de acción para elegir el tratamiento adecuado.	Es efectivo contra parasitosis intestinales simples y múltiples causadas por [Mencionar los parásitos específicos listados: oxiuros, áscaris, tricocéfalos (Trichuris), strongiloides y tenias]. También es ovicida y vermificada.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Es útil para la giardiasis? ¿En qué poblaciones?	La giardiasis es común, quieren saber si es una opción y para quién.	Sí, Nemozol está indicado específicamente para el tratamiento de la giardiasis en niños [Indicar rango de edad según catálogo: desde los 2 y hasta los 10 años].
Dosificación y Administración	¿Cuál es la dosis recomendada (por parásito, por edad)? ¿Es dosis única o por días?	Necesitan la pauta de tratamiento exacta para cada infestación y grupo de edad.	La dosis varía según el parásito y la edad. Para la mayoría de las parasitosis comunes (oxiuros, áscaris, tricocéfalos), la dosis habitual es de 400 mg (10 mL de suspensión) como dosis única en adultos y niños mayores de 2 años. Para giardiasis en niños de 2 a 10 años, la dosis es también 400 mg al día por [Indicar duración del tratamiento para giardiasis según ficha técnica, usualmente 5 días]. Consultar inserto para dosis en otras infestaciones o edades.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?	Saber qué esperar durante el tratamiento antiparasitario.	Generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios son poco comunes y leves, pudiendo incluir [Mencionar si aplica: molestias gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas, vómitos), cefalea, mareo]. Rara vez reacciones alérgicas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene interacciones relevantes?	Interacciones con otros medicamentos.	Se han reportado interacciones con [Mencionar si aplica: Cimetidina, Dexametasona, Praziquantel] que pueden aumentar los niveles plasmáticos de Albendazol. Importancia clínica variable.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones (embarazo, daño hepático)?	Saber cuándo no usarlo, especialmente por su metabolismo.	Contraindicado en casos de hipersensibilidad al Albendazol u otros benzimidazoles. No se recomienda su uso durante el embarazo. Usar con precaución en pacientes con enfermedad hepática.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el envase? ¿Tiene sabor?	Practicidad y aceptabilidad, especialmente en niños.	Viene en un envase de 10 mL. Tiene sabor a banana. Esto es una dosis única o diaria conveniente.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aporta el Óxido de zinc y la Glicerina en esta pasta?	Quieren saber los componentes principales y su función.	Contiene Óxido de zinc, que actúa como astringente, protector cutáneo y antiséptico suave. Ayuda a secar lesiones exudativas y formar una barrera protectora. La Glicerina es un humectante que ayuda a mantener la hidratación de la piel y le da consistencia a la pasta.
Composición y Farmacología	¿Es similar a una crema para pañalitis? ¿En qué se diferencia?	Comparación con un producto conocido para la misma indicación.	Es similar en el uso del Óxido de zinc para protección y secado, y está indicada también para lesiones por el pañal. La diferencia principal radica en la base; la "Pasta al Agua" tradicionalmente tiene un alto contenido de polvo (óxido de zinc, talco si lo incluyera) disperso en una base acuosa y glicerina, lo que le da un mayor efecto secante y desinfectante para lesiones exudativas (que supuran). La Crema para Panalitis (Pasta Lassar) suele tener una base más grasa y oclusiva.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de lesiones cutáneas está indicada? ¿Lesiones exudativas?	Saber su nicho de uso, especialmente si es para lesiones húmedas.	Está indicada para el tratamiento [Mencionar si es tratamiento o coadyuvante] y desecación de lesiones cutáneas exudativas, como [Mencionar ejemplos según catálogo: escaras, lesiones ocasionadas por el pañal (dermatitis del pañal cuando hay exudación)]. También tiene acción desinfectante.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo ayuda en las escaras?	Conocer su rol en el manejo de úlceras por presión en cierta fase.	En las escaras (úlceras por presión), está indicada en fases donde hay exudación, ayudando a secar la lesión y proteger la piel circundante. [Aclarar: No es un tratamiento curativo para la escara, es un coadyuvante para manejar la humedad y proteger la zona].
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica la pasta? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso.	Limpiar y secar bien la zona afectada. Aplicar una capa fina de pasta sobre las lesiones [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: 2-3 veces al día o en cada cambio de pañal si aplica].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede reseca mucho la piel?	Saber qué esperar con el efecto secante.	Generalmente bien tolerada. El principal efecto es el secado de la piel, que es el objetivo terapéutico en lesiones exudativas. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a los componentes. Solo para uso externo. No usar sobre heridas abiertas profundas o infecciones cutáneas extendidas sin supervisión médica.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad tiene el tarro?	Practicidad.	Viene en un tarro con contenido neto de 100 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Violeta de Genciana? ¿Cuál es su composición?	Quieren saber el principio activo y su naturaleza.	La Violeta de Genciana es un colorante de anilina con propiedades antisépticas y antifúngicas. Su composición incluye Violeta de genciana, Alcohol etílico desnaturalizado y Agua purificada.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de infecciones o gérmenes está indicada? ¿Uso tópico?	Saber el espectro de acción y vía de administración.	Está indicada como antiséptico, antimicótico y germicida de uso externo. Es útil en infecciones cutáneas y de mucosas causadas por bacterias Gram-positivas y hongos (especialmente Cándida).
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso correcta.	Aplicar directamente sobre el área afectada [Indicar frecuencia según indicaciones específicas del producto o prácticas comunes, ej: 1-2 veces al día]. Debe usarse en pequeñas cantidades y solo sobre la zona a tratar.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede irritar la piel? ¿Mancha la ropa/piel?	Conocer los posibles inconvenientes, especialmente la tinción.	Puede causar irritación o sensibilización en algunas personas, especialmente con el uso prolongado o en pieles sensibles. Tiñe la piel y la ropa de color violeta intenso. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación? ¿Uso en heridas abiertas?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a la Violeta de Genciana. No se recomienda su uso en heridas profundas o extensas, ya que puede retrasar la cicatrización. [Mencionar si aplica alguna restricción de edad según el laboratorio].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Azul de Metileno? ¿Cuál es su composición?	Quieren saber el principio activo y su naturaleza.	El Azul de Metileno es un colorante con propiedades antisépticas y cicatrizantes suaves. Su composición es Azul de metileno y Agua purificada.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de lesiones o gérmenes está indicado? ¿Uso tópico? ¿Cicatrizante?	Saber el espectro de acción y su rol en la cicatrización.	Está indicado como antiséptico, cicatrizante y vermífugo. Se usa tópicamente en el tratamiento de [Mencionar si hay indicaciones más específicas aparte de antiséptico/cicatrizante, si el laboratorio las proporciona]. Ayuda a desinfectar lesiones menores y favorecer la cicatrización.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso correcta.	Aplicar directamente sobre el área afectada [Indicar frecuencia según indicaciones específicas del producto o prácticas comunes, ej: 1-2 veces al día]. Tiñe la piel de color azul.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Mancha la piel/ropa?	Conocer los posibles inconvenientes, especialmente la tinción.	Generalmente bien tolerado. El efecto secundario más notorio es la tinción azul de la piel y la ropa. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo no usarlo o usarlo con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad al Azul de Metileno. Usar con precaución en pieles sensibles.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aportan el Alumbre potásico y el Borato de sodio? ¿Cómo actúan?	Quieren conocer los principios activos y su mecanismo de acción en la mucosa bucal.	Contiene Alumbre potásico (una sal con propiedades astringentes y antisépticas) y Borato de sodio (Bórax), que tiene propiedades antisépticas y antifúngicas suaves. [Mencionar si la "Miel" en el nombre implica la presencia de miel o solo la consistencia/sabor].
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de afecciones de la mucosa bucal está indicada? ¿Aftas, irritaciones?	Saber las condiciones específicas que trata.	Está indicada como antiséptico y desinfectante de uso tópico en la mucosa bucal en el tratamiento de [Mencionar indicaciones según catálogo: aftas y otras lesiones], ayudando a evitar la sobreinfección y acelerar su curación.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica en la boca? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso correcta y segura para uso bucal.	Aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la lesión en la mucosa bucal [Indicar frecuencia según indicaciones específicas del producto, ej: varias veces al día]. Evitar la ingestión excesiva.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede irritar? ¿Riesgo si se ingiere?	Conocer los posibles inconvenientes y la seguridad del uso oral.	Generalmente bien tolerada en uso tópico bucal. La ingestión de grandes cantidades de borato de sodio puede ser tóxica, por lo que debe usarse solo tópicamente y evitar la ingestión.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación? ¿Uso en niños?	Saber cuándo no usarlo o usarlo con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a los componentes. Usar con precaución en niños pequeños (asegurar que no ingieran el producto). No usar en heridas abiertas o extensas de la mucosa bucal.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Ácido bórico USP? ¿Cómo actúa en infecciones vaginales?	Quieren conocer el principio activo, su calidad y mecanismo de acción para esta indicación.	Contiene Ácido bórico USP (grado farmacéutico, indicando pureza). Actúa creando un ambiente ácido en la vagina, lo que ayuda a restaurar el pH vaginal normal y a inhibir el crecimiento de ciertos hongos y bacterias que causan infecciones.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de infecciones vaginales está indicado? ¿Hongos, levaduras, Vaginosis Bacteriana?	Saber el espectro de acción.	Está indicado para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por [Mencionar según catálogo: hongos y levaduras]. Es particularmente útil para la candidiasis vaginal recurrente o resistente a tratamientos convencionales. [Confirmar si también cubre Vaginosis Bacteriana según laboratorio].
Dosificación y Administración	¿Cómo se usan las cápsulas? ¿Cuántas veces al día? ¿Por cuánto tiempo?	Pauta de tratamiento.	Son cápsulas vaginales. La dosis habitual es [Indicar dosis y frecuencia según ficha técnica, ej: 1 cápsula insertada profundamente en la vagina, 1-2 veces al día]. La duración del tratamiento varía según la infección [Indicar duración típica, ej: 7-14 días para candidiasis, o más tiempo para casos recurrentes]. Insertar preferiblemente al acostarse.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación vaginal? ¿Riesgos por absorción?	Conocer los posibles inconvenientes y la seguridad del uso vaginal.	Puede causar irritación, ardor o enrojecimiento vaginal leve en algunas usuarias. Es crucial no ingerir las cápsulas bajo ninguna circunstancia. La absorción sistémica de ácido bórico es posible, por lo que no debe usarse en embarazo, lactancia, ni en caso de heridas o úlceras vaginales.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones importantes (embarazo)?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en el embarazo y la lactancia debido al riesgo potencial para el feto/bebé. No usar si hay heridas abiertas, úlceras o laceraciones vaginales. Contraindicado en hipersensibilidad al ácido bórico.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Cuántas cápsulas vienen en la presentación?	Practicidad para el tratamiento.	La presentación es de 10 cápsulas.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Aceite de almendras dulces? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren saber la naturaleza del producto.	El principio activo es Aceite de almendras dulces. Es un aceite vegetal rico en ácidos grasos (principalmente oleico y linoleico).
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como emoliente y humectante? ¿Para qué tipo de piel es útil?	Conocer sus propiedades para la piel seca o sensible.	Está indicado como emoliente y humectante. Ayuda a suavizar, hidratar y nutrir la piel, mejorando su elasticidad y apariencia. Es útil para pieles secas, deshidratadas o sensibles.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso.	Aplicar directamente sobre la piel limpia y seca, masajeando suavemente hasta su absorción. Puede usarse según necesidad, varias veces al día.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios o contraindicaciones? ¿Puede causar alergias?	Conocer el perfil de seguridad, especialmente por ser un producto natural.	Generalmente es bien tolerado. En personas con alergia a los frutos secos, podría haber riesgo de reacción alérgica cutánea. Evitar el contacto con ojos.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Aceite mineral? ¿Cuál es su composición?	Quieren saber la naturaleza del producto.	El principio activo es Aceite mineral NF. Es una mezcla de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo, altamente refinados para uso farmacéutico/cosmético. NF significa que cumple con los estándares del National Formulary.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como emoliente y suavizante? ¿Y como vehículo farmacéutico?	Conocer sus propiedades para la piel y su uso en preparaciones.	Está indicado como emoliente y suavizante de manos y piel, lubricante y vehículo farmacéutico. Forma una capa oclusiva sobre la piel que reduce la pérdida de agua. Como vehículo, se usa para disolver o dispersar otros ingredientes en formulaciones tópicas.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Es para uso interno o externo?	Pauta de uso y vía de administración.	Es principalmente para uso externo como emoliente. [Si está indicado como lubricante o para otra vía, especificar según ficha técnica. Tradicionalmente el aceite mineral también se usa como laxante, pero aquí no está listado como indicación]. Aplicar sobre la piel según necesidad.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede obstruir los poros (comedogénico)?	Preocupación en pieles propensas al acné.	Generalmente bien tolerado. Puede ser comedogénico (obstruir poros) en algunas personas, especialmente si se usa en exceso en pieles propensas al acné. [Confirmar si es de bajo grado de comedogenicidad según el laboratorio].
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Aceite de Ricino? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren saber la naturaleza del producto.	El principio activo es Aceite de castor NF. NF significa que cumple con los estándares del National Formulary. Es un aceite vegetal obtenido de la semilla de ricino, cuyo principal componente activo es el ácido ricinoleico.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como laxante? ¿Es fuerte? ¿Para qué tipo de estreñimiento?	Conocer su uso principal como laxante y su potencia.	Está indicado como laxante natural y digestivo. Actúa irritando la mucosa intestinal y estimulando la motilidad, lo que produce un efecto laxante rápido y potente. Se usa para el alivio del estreñimiento ocasional.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo se emplea en tratamientos capilares y cuidado de la barba/pestañas?	Conocer sus otros usos tradicionales no laxantes.	Tradicionalmente se ha usado tópicamente en tratamientos capilares y para el cuidado de la barba y el crecimiento de las pestañas. Se cree que sus ácidos grasos pueden ayudar a hidratar y nutrir el folículo piloso, aunque la evidencia científica es limitada para estas indicaciones.
Dosificación y Administración	¿Cómo se toma como laxante? ¿Cuál es la dosis? ¿Y cómo se aplica tópicamente?	Pauta de uso para las diferentes indicaciones.	Como laxante: [Indicar la dosis oral usual para adultos y niños mayores, según sepa del producto o prácticas comunes. Es una dosis única]. Tiene un sabor fuerte. Para uso tópico capilar/pestañas: aplicar una pequeña cantidad en el área deseada, masajeando si es en cuero cabelludo/barba.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Dolor abdominal? ¿Uso crónico?	Saber qué esperar y los riesgos del uso prolongado.	Puede causar calambres abdominales, náuseas y diarrea. No debe usarse de forma crónica como laxante, ya que puede generar dependencia intestinal, pérdida de electrolitos y dañar la función intestinal.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones importantes? ¿Embarazo?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en obstrucción intestinal, apendicitis, dolor abdominal de origen desconocido, enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, Colitis ulcerosa). No debe usarse durante el embarazo ya que puede inducir contracciones uterinas. Evitar en niños pequeños a menos que sea específicamente indicado y bajo supervisión médica estricta.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Glicerina USP? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren saber la naturaleza del compuesto y su calidad.	El principio activo es Glicerina USP. Es un poliol (alcohol de azúcar) con propiedades humectantes y emolientes. USP significa que cumple con los estándares de pureza y calidad de la Farmacopea de Estados Unidos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como hidratante, humectante y suavizante? ¿Para qué se utiliza?	Conocer sus propiedades para la piel y otros usos.	Está indicada para disuelta en agua en partes iguales se emplea como hidratante, humectante y suavizante de la piel. Atrae agua a la piel y ayuda a mantenerla suave. También se utiliza como edulcorante y vehículo en preparaciones farmacéuticas.
Dosificación y Administración	¿Cómo se usa? ¿Se diluye? ¿Para uso tópico o como vehículo?	Pauta de uso y formas de aplicación.	Para uso tópico en la piel: se recomienda diluirla en agua en partes iguales antes de aplicar. Como edulcorante o vehículo en formulaciones farmacéuticas, se usa según la formulación específica.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede ser irritante si no se diluye?	Conocer los posibles inconvenientes del uso concentrado.	Generalmente muy segura. En su forma concentrada, puede tener un efecto irritante o causar una sensación de calor en la piel debido a su naturaleza higroscópica (atrae agua). Por eso se recomienda diluirla para uso tópico.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a la glicerina. Solo para uso externo o como vehículo en formulaciones orales (no inyectable a menos que se especifique).
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Tintura de Valeriana? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren saber la naturaleza del extracto vegetal y su forma de presentación.	El principio activo es Tintura de Valeriana. Es una preparación alcohólica (extracto hidroalcohólico) de la raíz de la planta Valeriana officinalis, que contiene ácidos valerénicos y otros compuestos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Ansiedad, insomnio, nerviosismo?	Conocer sus usos tradicionales como sedante natural.	Está indicada como sedante, tranquilizante y auxiliar en el tratamiento del insomnio, nerviosismo, y estados de ansiedad leve a moderada [Basarse en usos tradicionales de la Valeriana]. Ayuda a calmar el sistema nervioso.
Dosificación y Administración	¿Cómo se toma la tintura? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuántas veces al día?	Pauta de uso correcta (generalmente diluida).	La dosis recomendada es [Indicar dosis en número de gotas y frecuencia según ficha técnica, ej: X gotas diluidas en agua, Y veces al día]. Para el insomnio, se toma una dosis [Indicar si dosis única antes de acostarse].
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Somnolencia diurna? ¿Interacciones con sedantes?	Conocer los posibles efectos adversos y precauciones con depresores del SNC.	Puede causar somnolencia (especialmente al inicio o con dosis altas), mareos, o molestias gastrointestinales leves. Puede potenciar el efecto de sedantes, tranquilizantes o alcohol. Evitar operar maquinaria pesada o conducir bajo sus efectos hasta conocer la respuesta individual.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna contraindicación o precaución (embarazo, niños)?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad a la Valeriana. No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia por falta de estudios de seguridad. Usar con precaución en niños (si está indicado, ajustar dosis) y en personas que toman otros sedantes.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco? ¿Viene con gotero?	Practicidad para la dosificación en gotas.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL. Incluye un gotero para facilitar la dosificación precisa.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Tintura de Árnica? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren saber la naturaleza del extracto vegetal y su forma de presentación.	El principio activo es Tintura de Árnica. Es una preparación alcohólica (extracto hidroalcohólico) de la planta Arnica montana, que contiene lactonas sesquiterpénicas (como la helenalina) y flavonoides.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Golpes, moretones, inflamación? ¿Es de uso externo?	Conocer sus usos tradicionales como antiinflamatorio tópico.	Está indicada para uso externo como antiinflamatorio y analgésico local en el tratamiento de [Mencionar usos tradicionales: golpes, contusiones, moretones (equimosis), esguinces leves, dolor muscular y articular superficial] [Basarse en usos tradicionales de la Árnica]. Ayuda a reducir la hinchazón, el dolor y la coloración de los moretones.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica la tintura? ¿Se diluye? ¿Cuántas veces al día?	Pauta de uso correcta (generalmente diluida o en compresas).	Es para uso externo únicamente. Puede aplicarse [Indicar forma de uso según sepa del producto: directamente sobre la piel (si no está lesionada y la concentración lo permite), diluida en agua para compresas, o frotando suavemente]. [Indicar frecuencia según ficha técnica, ej: varias veces al día]. No aplicar sobre heridas abiertas o piel irritada.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación de la piel? ¿Es tóxica por vía oral?	Conocer los posibles efectos adversos y la toxicidad si se ingiere.	Puede causar irritación, enrojecimiento, picor o dermatitis alérgica en personas sensibles, especialmente con el uso prolongado o en altas concentraciones. Es tóxica por vía oral y puede causar síntomas graves (trastornos digestivos, cardíacos, nerviosos). Nunca debe ingerirse.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones? ¿Piel lesionada? ¿Embarazo?	Saber cuándo no usarla o usarla con cuidado.	Contraindicada en hipersensibilidad al Árnica o plantas de la familia Asteraceae/Compositae. No aplicar sobre heridas abiertas, piel lesionada, quemaduras o mucosas. No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia por falta de estudios.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco? ¿Viene con gotero?	Practicidad para la dosificación/aplicación.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL. Incluye un gotero para facilitar la aplicación.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué contiene la Solución Fisiológica? ¿Cuál es su composición?	Conocer los componentes y su naturaleza (isotónica).	El principio activo es Cloruro de sodio y Agua destilada. Es una solución isotónica de cloruro de sodio al 0.9%, lo que significa que tiene la misma concentración de sales que los fluidos corporales.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza principalmente en esta presentación de 30 mL? ¿Descongestión nasal?	Conocer las indicaciones para este volumen pequeño, a menudo para uso nasal u oftálmico.	Está indicada como descongestionante nasal. Ayuda a fluidificar y limpiar las secreciones nasales, facilitando la respiración. También puede usarse para limpieza de ojos o heridas menores [Si aplica según sepa del producto].
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica como descongestionante nasal? ¿Con qué frecuencia? ¿Es segura en bebés?	Pauta de uso, especialmente en niños pequeños y bebés.	Para descongestión nasal: aplicar [Indicar si son gotas o si permite chorro suave, y el número de gotas/cantidad] en cada fosa nasal, según necesidad. Es segura para usar en bebés y niños, ya que es una solución salina suave que no causa rebote como los descongestionantes con vasoconstrictores.
Dosificación y Administración	¿Viene con algún aplicador específico?	Practicidad para la administración, especialmente en fosas nasales o ojos.	Viene en frasco con gotero, lo que facilita la aplicación precisa en gotas en fosas nasales u ojos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios o contraindicaciones?	Conocer el perfil de seguridad (generalmente muy seguro).	Es muy segura y bien tolerada. No tiene efectos secundarios relevantes a dosis terapéuticas. La única precaución es mantener la higiene del gotero para evitar contaminación.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volumen tiene el frasco?	Practicidad para el uso individual o en viajes.	Viene en frasco con contenido neto de 30 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Alcohol Absoluto? ¿Cuál es su concentración?	Quieren saber la pureza del alcohol y su principio activo.	El principio activo es Alcohol etílico desnaturalizado al 98° GL. "Absoluto" se refiere a su alta concentración, que es cercana al 100% de alcohol (98° GL es equivalente a 98% v/v aproximadamente). Está desnaturalizado para uso externo.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Cicatrizante? ¿Astringente? ¿Ombigo de neonatos?	Conocer sus usos específicos.	Está indicado como cicatrizante y astringente. Se emplea en la rápida y efectiva cicatrización del ombigo en neonatos. Su acción astringente ayuda a secar tejidos y la cicatrizante promueve el cierre.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica en el ombigo del neonato? ¿Con qué frecuencia?	Pauta de uso correcta para esta indicación específica.	Aplicar directamente sobre la base del cordón umbilical en cada cambio de pañal o según indicación médica [Basarse en prácticas comunes para el cuidado del cordigo umbilical]. Asegurarse de cubrir bien la zona.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación de la piel? ¿Es seguro en neonatos?	Conocer los posibles efectos adversos y la seguridad en esta población sensible.	Puede causar irritación o sequedad en la piel circundante si se usa en exceso. Es importante usar la concentración adecuada (98°) para esta indicación. A pesar de ser alcohol de alta concentración, su uso tópico y localizado en el cordón umbilical es una práctica común y generalmente segura si se usa correctamente. Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Es inflamable? ¿Hay que tener precauciones?	El alcohol es inflamable.	Sí, es altamente inflamable. Mantener alejado del fuego, chispas y fuentes de calor. No usar cerca de llamas abiertas.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tiene el frasco?	Practicidad para el uso domiciliario o profesional.	Disponible en presentaciones de 60 mL, 120 mL, 240 mL, 500 mL y 1000 mL (1 L).
Exportar a Hojas de cálculo			

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Alcohol Yodado? ¿Cuál es su composición (Yodo y Alcohol)?	Quieren conocer los principios activos y sus concentraciones.	El principio activo es Alcohol etílico desnaturalizado al 70% V/V y Yodo metaloide-Yoduro de potasio. Es una combinación de yodo al 2% con alcohol etílico al 70%. El alcohol potencia la acción del yodo.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como antiséptico? ¿Contra qué microorganismos es efectivo?	Conocer su mecanismo de acción y espectro antimicrobiano.	Actúa como antiséptico de elección con amplio espectro. El yodo libera lentamente yodo libre, que oxida componentes celulares de los microorganismos. Es activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas y hongos.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Preparación de la piel antes de cirugía? ¿Curación de heridas?	Conocer sus usos principales en antisepsia cutánea.	Se emplea para el tratamiento y cuidado de heridas y en la preparación de la zona operatoria de la piel. Ayuda a desinfectar la piel antes de procedimientos invasivos o al tratar heridas superficiales.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica? ¿Es para uso externo solamente?	Pauta de uso correcta y vía de administración.	Es para uso externo únicamente. Aplicar sobre la piel limpia y seca en el área a desinfectar. Dejar secar al aire. No cubrir con vendajes oclusivos hasta que esté seco.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Puede irritar la piel? ¿Mancha? ¿Riesgo de toxicidad por Yodo?	Conocer los posibles inconvenientes, especialmente la irritación y la tinción.	Puede causar irritación, sequedad o reacciones alérgicas en pieles sensibles. Tiñe la piel de color pardo. La absorción sistémica de yodo es posible con uso prolongado o en grandes áreas de piel, con riesgo de afectar la función tiroidea, especialmente en personas sensibles o con trastornos tiroideos preexistentes. Es tóxico si se ingiere.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay contraindicaciones o precauciones importantes (problemas tiroideos)?	Saber cuándo no usarlo, especialmente por el componente Yodo.	Contraindicado en hipersensibilidad al yodo o alcohol. Evitar el uso repetido en grandes áreas de piel, en quemaduras extensas, o en piel lesionada debido al riesgo de absorción de yodo. Usar con precaución en pacientes con trastornos tiroideos. No ingerir.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué volúmenes tiene el frasco?	Practicidad para diferentes usos.	Viene en frascos con contenido neto de 60 mL y 120 mL.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Ácido Bórico USP en polvo? ¿Cómo actúa como antiséptico tópico?	Quieren conocer el principio activo, su calidad y mecanismo de acción para uso externo.	El principio activo es Ácido Bórico USP. USP indica que cumple con los estándares de pureza de la Farmacopea de Estados Unidos. Tiene propiedades antisépticas y astringentes suaves.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Preparación de agua boricada? ¿Lavados? ¿Tratamiento del acné?	Conocer sus usos.	Está indicado como antiséptico de uso tópico. Se usa para la preparación de agua boricada para lavados vaginales y la limpieza de la cutis en el tratamiento del acné.
Dosificación y Administración	¿Cómo se prepara el agua boricada? ¿Cuál es la concentración recomendada?	Pauta de preparación y uso seguro.	Para preparar agua boricada, se disuelve el polvo en agua [Indicar la proporción o concentración recomendada si se especifica en el producto, ej: una cucharadita en un litro de agua hervida y tibia]. Usar según indicación para lavados o limpieza de cutis.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Es seguro usarlo tópicamente? ¿Riesgos por absorción?	Conocer los posibles inconvenientes y la seguridad, especialmente en piel lesionada.	Generalmente seguro para uso tópico en piel intacta y mucosas. Es crucial evitar su uso en piel lesionada, quemada o en grandes extensiones, especialmente en niños pequeños, debido al riesgo de absorción sistémica y toxicidad. Evitar la ingestión.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación importante?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en hipersensibilidad al ácido bórico. No usar en piel dañada, quemaduras, heridas abiertas ni en el área del pañal en bebés. Evitar la ingestión.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene el sobre?	Practicidad.	Viene en sobre con contenido neto de 20 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Azufre precipitado micronizado? ¿Cómo actúa en la piel?	Quieren conocer el principio activo, su forma (micronizado) y mecanismo de acción.	El principio activo es Azufre precipitado resublimado micronizado. Tiene propiedades queratolíticas, antifúngicas, antibacterianas y parasitocidas suaves. La micronización mejora su dispersión y actividad.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Pediculosis? ¿Escabiosis? ¿Acné? ¿Cómo se prepara?	Conocer sus usos tradicionales y cómo se formula para aplicarlo.	Está indicado para el tratamiento de la pediculosis (piojos), escabiosis (sarna) y el acné. Se emplea incorporado en un vehículo adecuado como crema fría o vaselina para su aplicación tópica.
Dosificación y Administración	¿Cuál es la concentración de Azufre precipitado a usar en la preparación?	Necesitan saber la proporción para formular.	[Indicar la concentración recomendada de Azufre precipitado a incorporar en la base, si se especifica en el producto o según prácticas farmacéuticas comunes, ej: al 5% o 10%]. La base (crema fría o vaselina) y la concentración varían según la indicación.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Olor? ¿Irritación?	Conocer los posibles inconvenientes (olor característico) y la tolerancia cutánea.	Puede causar irritación, enrojecimiento o sequedad de la piel. Tiene un olor característico a azufre. Evitar el contacto con ojos y mucosas. No usar en piel lesionada.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo usarlo con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad al azufre. Usar con precaución en pieles sensibles. No usar en grandes extensiones de piel.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene el sobre?	Practicidad.	Viene en sobre con contenido neto de 20 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Sulfatiazol? ¿Cómo actúa como antimicrobiano?	Quieren conocer el principio activo y su mecanismo de acción antibacteriana.	El principio activo es Sulfatiazol puro, que es una sulfonamida. Actúa como antimicrobiano de acción rápida inhibiendo el crecimiento bacteriano al interferir con la síntesis de ácido fólico esencial para las bacterias.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué tipo de infecciones está indicado? ¿Es solo para uso externo?	Saber el espectro de acción y la vía de administración.	Está indicado exclusivamente en infecciones dérmicas. Se emplea incorporado en un vehículo semisólido como crema fría o vaselina. Es para uso tópico únicamente.
Dosificación y Administración	¿Cómo se prepara la pomada/crema con el Sulfatiazol? ¿Cuál es la concentración?	Necesitan saber la proporción para formular.	Para preparar la formulación tópica, se incorpora el Sulfatiazol puro del sobre en una base adecuada (crema fría o vaselina) [Indicar la concentración recomendada si se especifica en el producto o según prácticas farmacéuticas, ej: al 5% o 10%]. Aplicar sobre las lesiones según indicación.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Reacciones alérgicas? ¿Absorción sistémica?	Conocer los posibles inconvenientes, especialmente las reacciones cutáneas a sulfonamidas.	Las sulfonamidas tópicas pueden causar reacciones de hipersensibilidad local (enrojecimiento, picor, erupción cutánea). La absorción sistémica es baja con el uso tópico en piel intacta, pero puede aumentar en piel lesionada o quemada, con riesgo de efectos sistémicos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación? ¿Alergia a sulfonamidas? ¿Embarazo?	Saber cuándo usarlo con cuidado o no usarlo.	Contraindicado en hipersensibilidad a las sulfonamidas. Usar con precaución en pacientes con antecedentes de alergias. No aplicar en grandes áreas, heridas profundas, quemaduras extensas. No se recomienda su uso en embarazo y lactancia a menos que sea estrictamente necesario y bajo supervisión médica.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene el sobre?	Practicidad.	Viene en sobre con contenido neto de 5 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Alumbre potásico en polvo? ¿Cómo actúa?	Quieren conocer el principio activo y su mecanismo de acción.	El principio activo es Alumbre potásico. Es una sal con propiedades astringentes (seca tejidos), antisépticas y antitranspirantes suaves.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza? ¿Astringente? ¿Antitranspirante? ¿Duchas vaginales? ¿Sudoración?	Conocer sus usos.	Está indicado como antiséptico, astringente y antitranspirante. Es empleado en duchas vaginales y en soluciones para el control de la sudoración. Ayuda a reducir la humedad y controlar el mal olor.
Dosificación y Administración	¿Cómo se prepara la solución para duchas vaginales o para la sudoración?	Pauta de preparación y uso seguro.	Disolver el polvo en agua para preparar la solución [Indicar la proporción o concentración recomendada si se especifica en el producto]. Usar según indicación para duchas vaginales externas o aplicar en las áreas afectadas para controlar la sudoración.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación?	Conocer los posibles inconvenientes.	Puede causar irritación o sequedad en pieles sensibles o mucosas si se usa en concentraciones altas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación?	Saber cuándo usarlo con cuidado.	Contraindicado en hipersensibilidad al alumbre. Evitar el contacto con ojos y mucosas. No usar en piel lesionada.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene el sobre?	Practicidad.	Viene en sobre con contenido neto de 20 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es la Sal de Epsom / Higuera? ¿Cuál es su principio activo?	Quieren conocer el principio activo y su naturaleza.	El principio activo es Sulfato de Magnesio heptahidratado. Comúnmente conocido como Sal de Epsom. Es una sal mineral de magnesio.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo actúa como laxante y catártico? ¿Y como colagogo? ¿Qué significa eso?	Conocer sus usos principales y el término "colagogo".	Está indicado como laxante y catártico suave. Actúa como laxante osmótico, atrayendo agua al intestino. Como colagogo, es una sustancia que estimula la producción y/o secreción de bilis, lo cual induce la depuración hepato-biliar.
Dosificación y Administración	¿Cómo se toma? ¿Cuál es la dosis para el efecto laxante? ¿Se disuelve?	Pauta de uso correcta.	Se disuelve el contenido del sobre en agua y se toma oralmente. [Indicar la dosis y el volumen de agua recomendado según sepa del producto, ej: disolver el sobre en un vaso grande de agua]. Se toma generalmente en ayunas.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Diarrea? ¿Dolor abdominal? ¿Uso crónico?	Conocer los posibles inconvenientes (principalmente diarrea) y el riesgo del uso prolongado.	El efecto secundario más común es la diarrea. También puede causar náuseas, vómitos o calambres abdominales. No debe usarse de forma crónica como laxante, ya que puede generar dependencia y desequilibrios electrolíticos.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación importante (problemas renales)?	Saber cuándo no usarlo.	Contraindicado en casos de obstrucción intestinal, dolor abdominal intenso, insuficiencia renal grave (riesgo de hipermagnesemia), deshidratación severa. Usar con precaución en embarazo, lactancia, ancianos y pacientes con enfermedad cardíaca.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene la papelata?	Practicidad.	Viene en papelata con contenido neto de 20 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué es el Bicarbonato de Sodio? ¿Cómo actúa para el alivio de la acidez?	Quieren conocer el principio activo y su mecanismo de acción antiácida.	El principio activo es Bicarbonato de Sodio. Es un antiácido sistémico que actúa neutralizando el ácido clorhídrico en el estómago para formar cloruro de sodio, agua y dióxido de carbono.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza principalmente? ¿Alivio de la acidez estomacal?	Conocer su uso principal.	Está indicado para el alivio de la acidez estomacal. Proporciona un alivio rápido y temporal de la pirois (ardor de estómago) y la indigestión ácida.
Dosificación y Administración	¿Cómo se toma? ¿Cuál es la dosis? ¿Se disuelve?	Pauta de uso correcta.	Disolver el contenido del sobre en agua y tomar oralmente. [Indicar la dosis recomendada y el volumen de agua según sepa del producto, ej: disolver en medio vaso de agua]. Se toma según necesidad, después de las comidas o al sentir acidez.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Eructos? ¿Riesgo de alcalosis? ¿Sodio?	Conocer los posibles inconvenientes (producción de gas, carga de sodio).	Puede causar eructos debido a la producción de dióxido de carbono en el estómago. El uso frecuente o a dosis altas puede causar alcalosis metabólica (aumento del pH sanguíneo) y una carga significativa de sodio, lo que puede ser problemático en pacientes con hipertensión o problemas cardíacos/renales.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación importante (Hipertensión, problemas renales)?	Saber cuándo no usarlo o usarlo con cuidado debido al contenido de sodio y el efecto sistémico.	Contraindicado en hipersensibilidad, alcalosis metabólica o respiratoria, hipocalcemia, hipoclorhidria. Usar con extrema precaución en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o edema debido a su alto contenido de sodio. No usar por periodos prolongados.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué cantidad contiene la papelata?	Practicidad.	Viene en papelata con contenido neto de 20 g.

Tipo de Pregunta	Pregunta del Médico	Lógica del Médico	Posible Respuesta Técnica del Visitador Médico
Composición y Farmacología	¿Qué aportan el Mentol y el Salicilato de Metilo? ¿Cómo actúan en conjunto?	Quieren conocer los principios activos y su mecanismo de acción en el músculo/piel.	Los principios activos son Mentol y Salicilato de Metilo. El Mentol produce una sensación refrescante y tiene un leve efecto analgésico local. El Salicilato de Metilo es un derivado del ácido salicílico con propiedades analgésicas y antiinflamatorias tópicas, que produce una sensación de calor. Su combinación potencia el alivio del dolor muscular.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Para qué se utiliza esta línea de productos? ¿Antes o después de actividad física?	Conocer sus usos específicos en el contexto deportivo o de actividad física.	La fórmula está desarrollada para la previa adecuación a las diferentes actividades físicas y deportivas y para la apropiada relajación en el descanso post-actividad. Ayuda a preparar los músculos antes del ejercicio y a aliviar la tensión o el dolor muscular después.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Proporciona una sensación de calor o frío?	Saber el efecto sensorial que tendrá en el paciente.	La combinación de Mentol y Salicilato de Metilo generalmente produce una sensación inicial de frescor (por el Mentol) seguida de una sensación de calor (por el Salicilato de Metilo) al aumentar el flujo sanguíneo local.
Indicaciones y Eficacia Clínica	¿Cómo contribuyen al "aroma reconfortante"?	Saber el origen del aroma y su beneficio.	Sus ingredientes aportan un agradable aroma reconfortante al cuerpo y el ambiente, lo que contribuye a la sensación de relajación post-actividad. El Mentol y el Salicilato de Metilo tienen olores característicos usados en productos rubefacientes.
Dosificación y Administración	¿Cómo se aplica cada presentación (Crema, Spray, Roll-on)? ¿Cuándo? ¿Masajes?	Pauta de uso para cada formato.	Aplicar [Según presentación: la crema, el spray, o el roll-on] sobre el área deseada antes o después de la actividad física o deportiva que se realice. Se puede aplicar acompañada de masajes circulares suaves para facilitar la absorción y potenciar el efecto.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Tiene efectos secundarios? ¿Irritación? ¿Reacciones alérgicas?	Conocer los posibles inconvenientes con el uso tópico de estos activos.	Puede causar irritación local, enrojecimiento, picor o sensación de quemazón, especialmente en pieles sensibles. Rara vez reacciones alérgicas. Evitar el contacto con ojos, mucosas y piel lesionada o irritada.
Efectos Secundarios y Seguridad	¿Hay alguna precaución o contraindicación (embarazo, niños)?	Saber cuándo usarlo con cuidado o no usarlo.	Contraindicado en hipersensibilidad al Mentol, Salicilato de Metilo, o a otros salicilatos. No usar en niños pequeños (consultar edad límite si aplica). Usar con precaución en embarazo y lactancia (consultar indicación específica del laboratorio). No aplicar sobre heridas abiertas o quemaduras.
Presentación y Aspectos Prácticos	¿Qué presentaciones y volúmenes tiene esta línea?	Variedad de formatos para diferentes preferencias de uso.	La línea MENTOL con Salicilato de Metilo está disponible en presentación Crema 40 mL, Spray 120 mL, y Roll-on 80 mL.