

Guía de dosificación de Zincosol

1. ¿Qué es “una porción de 7,5 mL”?

Es el volumen que cabe en la cucharita/jeringa dosificadora incluida con el frasco.

7,5 mL = 1 porción

15 mg de zinc elemental (en forma de sulfato de zinc)

Concentración: $15 \text{ mg Zn} \div 7,5 \text{ mL} = 2 \text{ mg Zn por mL}$

2. Cálculo de la dosis según el peso

En pediatría se suele usar 1 mg de Zn elemental por kg de peso corporal al día (con un tope de 20 mg/día). Formular:

1. $\text{mg de Zn totales} = \text{dosis (mg/kg)} \times \text{peso (kg)}$
2. $\text{Volumen de jarabe (mL)} = \text{mg de Zn totales} \div 2 \text{ mg/mL}$
3. $\text{Porciones (7,5 mL)} = \text{Volumen (mL)} \div 7,5 \text{ mL}$

3. Ejemplos prácticos

Peso niño	Dosis Zn (1 mg/kg)	Zn totales	Volumen (mL)	Porciones (7,5 mL)
6 kg	6 mg/día	6 mg	3 mL	0,4 porciones
10 kg	10 mg/día	10 mg	5 mL	0,7 porciones
15 kg	15 mg/día	15 mg	7,5 mL	1 porción
20 kg	20 mg/día (tope)	20 mg	10 mL	1,3 porciones

4. Nota sobre forma de administración

- Repartir la dosis diaria en 1-2 tomas (p.ej. mañana y tarde).
- 10 mg de Zn: 5 mL ($\approx \frac{1}{2}$ porción).
- 20 mg de Zn: 10 mL ($\approx 1\frac{1}{3}$ porciones).



Guía de dosificación de Feryfol

1. ¿Qué es “una porción de 10 mL”?

Es el volumen que cabe en la cucharita/jeringa dosificadora incluida con el frasco.

10 mL = 1 porción

18 mg de hierro elemental (en forma de bisglicinato ferroso)

Concentración: $18 \text{ mg Fe} \div 10 \text{ mL} = 1,8 \text{ mg Fe por mL}$

2. Cálculo de la dosis según el peso

Para tratamiento de anemia por deficiencia de hierro en niños <12 años se usa 3 mg de Fe elemental por kg/día, con un tope de 60 mg/día. Formular:

1. mg de Fe totales = dosis (3 mg/kg) $\times$ peso (kg)

2. Volumen (mL) = mg de Fe totales $\div$ 1,8 mg/mL

3. Porciones (10 mL) = Volumen (mL) $\div$ 10 mL

Para niños ≥ 12 años y adultos: 1 porción (10 mL) al día según indicación del laboratorio.

3. Ejemplos prácticos

Peso niño	Dosis Zn (1 mg/kg)	Zn totales	Volumen (mL)	Porciones (7,5 mL)
6 kg	6 mg/día	6 mg	3 mL	0,4 porciones
10 kg	10 mg/día	10 mg	5 mL	0,7 porciones
15 kg	15 mg/día	15 mg	7,5 mL	1 porción
20 kg	20 mg/día (tope)	20 mg	10 mL	1,3 porciones

4. Recomendaciones de administración

- Tomar entre comidas para mejorar absorción.
- Repartir la dosis diaria en 1-2 tomas (p. ej. mañana y tarde).
- Administrar con un pequeño sorbo de zumo de naranja si hay molestias gastrointestinales.



Guía de dosificación de Calzinc D

1. ¿Qué es “una porción de 10 mL”?

Es el volumen que cabe en la cucharita/jeringa dosificadora incluida con el frasco.

10 mL = 1 porción

Contiene por porción:

- Calcio elemental: 175 mg (como citrato tricálcico)
- Vitamina D₃: 5 µg (200 UI)
- Zinc elemental: 7,5 mg (como óxido de zinc)

Concentraciones:

- Calcio: $175 \text{ mg} \div 10 \text{ mL} = 17,5 \text{ mg/mL}$
- Vitamina D₃: $5 \text{ µg} \div 10 \text{ mL} = 0,5 \text{ µg/mL}$
- Zinc: $7,5 \text{ mg} \div 10 \text{ mL} = 0,75 \text{ mg/mL}$

2. Cálculo de la dosis según el peso

Para suplementación en pediatría se puede usar:

- ****Calcio****: 30 mg de Ca elemental por kg de peso corporal al día (hasta un tope de ~1000 mg/día).

Formular:

1. Mg de Ca totales = dosis (30 mg/kg) × peso (kg)
2. Volumen de suspensión (mL) = mg de Ca totales ÷ 17,5 mg/mL
3. Porciones (10 mL) = Volumen (mL) ÷ 10 mL

3. Ejemplos prácticos (Calcio 30 mg/kg)

Peso niño	Ca total (30 mg/kg)	Volumen (mL)	Porciones (10 mL)
10 kg	300 mg/día	17,1 mL	1,7 porciones
15 kg	450 mg/día	25,7 mL	2,6 porciones
20 kg	600 mg/día	34,3 mL	3,4 porciones

4. Recomendaciones de administración

- Administrar con las comidas para mejorar absorción de calcio y vitamina D.
- Repartir la dosis diaria en 1–2 tomas (p. ej. mañana y tarde).
- Asegurar adecuada ingesta de vitamina D para optimizar metabolismo del calcio.
- En caso de complementar solamente zinc, considerar 0,75 mg/mL según requerimiento zincífico (1 mg/kg/día).

