

Producto	Principio Activo(s)	Dosificación / Aplicación (Según Información Disponible)
Acetaclor Jarabe	Acetaminofén, Clorfeniramina Maleato	Dosis 5 mL contienen: 125 mg de Acetaminofén, 0.5 mg de Clorfeniramina Maleato. (Dosificación por edad/peso no detallada en archivos, se debe consultar ficha técnica completa).
Acetaten Forte	Acetaminofén (Paracetamol)	Suspensión 180 mg/5 mL. (Dosificación por edad/peso/indicación no detallada en archivos, se debe consultar ficha técnica completa).
Ácido Bórico (Polvo Uso Externo)	Ácido Bórico USP	Para preparación de agua boricada para lavados vaginales y limpieza de cutis. Disolver el polvo en agua (Proporción/concentración no detallada en archivos).
Aceite de Almendras Dulces	Aceite de almendras dulces	Aplicar directamente sobre la piel limpia y seca, masajeando suavemente. Usar según necesidad.
Aceite Mineral	Aceite mineral NF	Aplicar sobre la piel según necesidad.
Aceite de Ricino	Aceite de castor NF	Como laxante natural y digestivo. (Dosis oral no especificada en archivos). Para tratamientos capilares y cuidado de barba/pestañas: aplicar una pequeña cantidad.
Alcohol Absoluto (98° GL)	Alcohol etílico desnaturalizado 98° GL	Empleado en la rápida y efectiva cicatrización del ombligo en neonatos. Aplicar directamente sobre la base del cordón umbilical [Basado en uso común].
Alcohol Yodado (2% Yodo en Alcohol 70%)	Alcohol etílico desnaturalizado 70% v/v, Yodo metaloide-Yoduro de potasio	Para el tratamiento y cuidado de heridas y en la preparación de la zona operatoria de la piel. Aplicar sobre la piel limpia y seca [Basado en uso común].
Alumbre en Polvo	Alumbre potásico	Empleado en duchas vaginales y en soluciones para el control de la sudoración. Disolver el polvo en agua para preparar la solución (Proporción/concentración no detallada en archivos).
Azul de Metileno	Azul de metileno	Antiséptico, cicatrizante, vermífida de uso externo. Aplicar directamente sobre el área afectada. Usar en pequeñas cantidades.
Azufre en Polvo (Azufre precipitado)	Azufre precipitado resublimado micronizado	Se emplea incorporado en un vehículo semisólido como crema fría o vaselina para tratamiento tópico (Pediculosis, Escabiosis, Acné). (Concentración a incorporar no especificada en archivos).
Bicarbonato de Sodio	Bicarbonato de Sodio	Alivio de la Acidez Estomacal. Disolver el contenido del sobre en agua y tomar oralmente [Basado en uso común]. (Dosis/volumen de agua no especificado en archivos).
Calzinc D	Citrato tricálcico, Vitamina D3, Óxido de zinc	Porción = 10 mL. Contiene por porción: 175 mg Ca++, 5 µg (200 UI) Vit D3, 7.5 mg Zn++. Concentraciones: 17.5 mg Ca/mL, 0.5 µg Vit D3/mL, 0.75 mg Zn/mL. Dosis pediátrica (Calcio): 30 mg Ca elemental por kg/día (máx \$1000 mg/día). mL = (Mg Ca totales) / 17.5 mg/mL. Adultos: (Dosis no especificada en archivos, consultar ficha técnica completa). Administrar con comidas, repartir en 1-2 tomas.
Cápsulas Ácido Bórico	Ácido Bórico USP	Tratamiento de infecciones vaginales por hongos y levaduras. Presentación: 10 cápsulas. (Dosis y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Cloruro de Magnesio	Cloruro de magnesio USP	Solución al 3,33g %. (Dosis oral no especificada en archivos para déficit o otras indicaciones).
Crema Fría	Aceite de parafina, Cera de abejas	Crema desmaquillante y humectante hipoalergénica. Aplicar sobre la piel limpia y seca, según necesidad [Basado en uso común].
Crema para Panalitis (Pasta Lassar)	Oxido de zinc, Alcoholes grasos, Vitamina E	Antiséptico y astringente cutáneo indicado en la irritación causada por el pañal y en quemaduras leves. Aplicar sobre la piel limpia y seca, según indicación (ej. en cada cambio de pañal) [Basado en uso común].
Emulsión de hígado de bacalao	Aceite de hígado de bacalao	Estados en que se requiera mayor aporte de vitaminas A y D como: el crecimiento, dentición, embarazo, lactancia y desnutrición. Hipovitaminosis A y D. (Dosis en volumen no especificada en archivos).
Enjuague Bucal Denti-OL	Alcohol etílico, Timol, Ácido benzoico, Mentol, Eucaliptol, Salicilato de metilo	Enjuague bucal, antiséptico orofaríngeo. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Feryfol	Bisglicinato Ferroso, Vitamina B9	Porción = 10 mL. Contiene por porción: 18 mg de hierro elemental. Concentración: 1.8 mg Fe elemental por mL. Niños < 12 años: 3 mg Fe elemental por kg/día (máx 60 mg/día). mL = (mg/kg * Peso kg) / 1.8 mg/mL. Niños ≥ 12 años y adultos: 1 porción (10 mL) al día. Tomar entre comidas, repartir en 1-2 tomas.
Gel Antibacterial (Alcohol Antiséptico)	Alcohol etílico desnaturalizado 70% v/v	Para limpieza de manos. Aplicar una cantidad suficiente en la palma para cubrir todas las superficies, frotar hasta secar [Basado en uso común].
Jarabes Respiratorios (Lamedor Compuesto)	Extracto fluido de Bálsamo de Talú, Extracto fluido de polígala, Aceite de Ricino, Eucaliptol, Mentol	Tratamiento de la tos causada por afecciones bronquiales y resfriado común. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Jarabe de Berro	Extracto de Berro, Aceite esencial de hojas de Eucalipto	Coadyuvante en la fluidificación de las secreciones bronquiales, expectorante, antiinflamatorio, antiviral y descongestionante. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Jarabe de Jengibre Zinc Vitamina C	Extracto de raíz de Zingiber officinale, bisglicinato de zinc, ácido ascórbico	Complemento alimenticio con antioxidantes, que fortalecen el sistema inmune y al proceso digestivo. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Limonada Laxante Citrato de Magnesio	Citrato de Magnesio	Alivio temporal de la constipación abdominal. Tratamiento del estreñimiento ocasional. Preparación intestinal antes de procedimientos. (Dosis para cada indicación no especificada en archivos, consultar ficha técnica completa).
Leche de Magnesia	Pasta de hidróxido de magnesio (8.5 g%)	Antiácido y laxante. (Dosis para cada indicación no especificada en archivos, consultar ficha técnica completa).
Loción Calamina	Calamina 8%	Picaduras, irritaciones cutáneas. Aplicar sobre el área afectada según necesidad [Basado en uso común].

Producto	Principio Activo(s)	Dosificación / Aplicación (Según Información Disponible)
Miel de Borax	Alumbre potásico, Borato de sodio	Antiséptico y desinfectante de uso tópico en la mucosa bucal, tratamiento de aftas y otras lesiones. Aplicar una pequeña cantidad sobre la lesión [Basado en uso común].
Nemazol	Albendazol 400 mg/10 mL	Antihelmíntico, ovida y vermida en parasitosis intestinales. Tratamiento de la giardiasis en niños de 2 a 10 años. Dosis para la mayoría de parasitosis comunes: 400 mg (10 mL) dosis única. Para giardiasis en niños 2-10 años: 400 mg al día por [Indicar duración - no especificado en archivos].
NeutroX Antiácido	Hidróxido de magnesio, Hidróxido de aluminio	Tratamiento de la hiperacidez gástrica. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa). Agitar antes de usar.
Pasta al Agua (Antiescaras)	Oxido de zinc, Glicerina	Desinfectante y desecante de las lesiones exudativas (escaras, lesiones por pañal). Aplicar una capa fina sobre las lesiones [Basado en uso común].
Pomada de Azufre	Azufre micronizado	Tratamiento de escabiosis, soriasis y otras afecciones de la piel (rosácea, dermatitis seborreica, acné juvenil). Se emplea incorporado en un vehículo (crema fría o vaselina). (Concentración no especificada en archivos).
Pomada Mentolada	Mentol, Eucaliptol, Petrolato	Congestión nasal, picaduras de insectos. Aplicar una capa fina en pecho y cuello, frotando suavemente [Basado en uso común].
Rábano Yodado	Extracto de Rábano, Jengibre, Naranja, Tintura de Canela	Expectorante, coadyuvante en el tratamiento de estados bronquiales. Apoyo en alteraciones de la tiroides por trastornos en la absorción de yodo, escorbuto y anemias. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Sal de Epsom / Higuera	Sulfato de Magnesio heptahidratado	Laxante y catártico suave. Colágeno. Disolver el contenido del sobre en agua y tomar oralmente [Basado en uso común]. (Dosis/volumen de agua no especificado en archivos).
Solución Fisiológica 30mL	Cloruro de sodio, Agua destilada	Descongestionante nasal. Aplicar en cada fosa nasal según necesidad [Basado en uso común].
Sulfatiazol	Sulfatiazol puro	Antimicrobiano de acción rápida exclusivamente en infecciones dérmicas. Se emplea incorporado en un vehículo (crema fría o vaselina). (Concentración a incorporar no especificada en archivos).
Talco Boricado	Mentol, Alcanfor, Ácido Bórico, Talco USP	Desodorante, antisudoral, antibacterial, refrescante. Aplicar sobre la piel limpia y seca [Basado en uso común].
Tintura de Árnica	Extracto de Árnica	Uso externo como antiinflamatorio y analgésico local. Aplicar sobre el área afectada [Basado en uso común]. Puede diluirse para compresas.
Tintura de Valeriana	Tintura de Valeriana	Sedante, tranquilizante, auxiliar en el tratamiento del insomnio, nerviosismo, ansiedad. (Dosis en gotas y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Vaselina	Petrolato puro	Hidratante, protección para piel irritada. Aplicar una capa fina sobre la piel limpia y seca [Basado en uso común]. Usar según necesidad.
Violeta de Genciana	Violeta de genciana, Alcohol etílico desnaturalizado, Agua purificada	Antiséptico, antimicótico, germicida de uso externo. Aplicar directamente sobre el área afectada. Usar en pequeñas cantidades.
Vitacon C	Ácido ascórbico, Extracto de frutos cítricos	Tratamiento de hipovitaminosis C, trastornos de reabsorción, estrés, convalecencia, cuadros infecciosos, anemias. Jarabe con 500 mg de ácido ascórbico en 5 mL. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Vitapetit	Vitaminas del complejo B, Lisina	Asociación de vitaminas hidrosolubles esenciales para crecimiento, desarrollo, construcción de masa muscular. (Dosis en volumen y frecuencia no especificadas en archivos, consultar ficha técnica completa).
Zincosol	Sulfato de zinc heptahidratado	Porción = 7.5 mL. Contiene por porción: 15 mg de zinc elemental. Concentración: 2 mg Zn elemental por mL. Niños: 1 mg Zn elemental por kg/día (máx 20 mg/día). mL = (mg/kg * Peso kg) / 2 mg/mL. Adultos (≥ 12 años): 1 porción (7.5 mL) al día. Tomar entre comidas, repartir en 1-2 tomas.