

CUESTIONARIO DE 90 SÍNTOMAS

2002

Autor: L.R. Derogatis

Edades: 13 años en adelante

Aplicación: Individual y colectiva

Descripción general

El SCL-90-R es un cuestionario con una duración entre 12 y 15min cuya finalidad es la apreciación de nueve dimensiones sintomáticas de psicopatología y tres índices globales de malestar. El material necesario es simplemente el manual, ejemplar auto corregible, lápiz y borrador.

Áreas que evalúa

La SCL-90 contiene 90 síntomas a evaluar que están distribuidos en 10 dimensiones sintomáticas, cada una de las cuales mide aspectos diferentes de la psicopatología.

Somatización

Esta dimensión está comprendida por 12 ítems que describen síntomas relacionados con vivencias de disfunción corporal (1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56 y 58).

Obsesión-compulsión

Esta dimensión está comprendida por 10 ítems relacionados con conductas, pensamientos e impulsos que el sujeto considera absurdos e indeseados, que generan intensa angustia (3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55 y 65).

Sensibilidad interpersonal

Está comprendida de 9 ítems que describen sentimientos de vergüenza, timidez e inferioridad, entre otros (6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69 y 73).

Depresión

Esta dimensión contiene 13 ítems que describen signos y síntomas clínicos propios de trastornos depresivos (5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71 y 79).

Ansiedad

Contiene 10 ítems relacionados con manifestaciones clínicas de la ansiedad (2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80 y 86).

Hostilidad

Esta dimensión está comprendida por 6 ítems que aluden a pensamientos, sentimientos y conductas agresivas (11, 24, 63, 67, 74 y 81).

Ansiedad fóbica

Esta dimensión consiste de 7 ítems que pretenden valorar las distintas variantes de la expresión fóbica. (13, 25, 47, 50, 70, 75 y 82).

Ideación paranoide

Esta dimensión está comprendida por 6 ítems que reúnen aspectos propios de la conducta paranoide (8, 18, 43, 68, 76 y 83).

Psicoticismo

Los 10 síntomas que componen esta dimensión configuran un espectro psicótico (7, 16, 35, 62, 62, 77, 84, 85, 87, 88 y 90).

Escala adicional

Está constituido de 7 síntomas misceláneos. Su relevancia clínica es lo que los ha conservado dentro del cuestionario (19, 60, 44, 59, 64, 66, y 89).

Manual y materiales



Instrucciones generales

El cuestionario está comprendido por 90 ítems que describen síntomas que casi todos sufren alguna vez. El examinando debe contestar cada ítem circulando el valor que considera que mejor describe dicho síntoma en su caso personal durante las últimas semanas. Los rangos para estos valores son de 0 a 4. **(0 = nada en absoluto, 1 = un poco, 2 = moderadamente, 3 = bastante, 4 = mucho o extremadamente)**. Es importante recalcar la importancia de la sinceridad del sujeto a la hora de contestar el cuestionario, aclarando que el presente cuestionario forma parte de su historial clínico y está sujeto a estricto secreto profesional.