

Laboratorio N.3

Introduccion a Los Metodos Estadisticos
Estimacion por intervalos y simulacion

Diana Carolina Arias Sinisterra Cod. 1528008

Kevin Steven Garcia Chica Cod. 1533173

Cesar Andres Saavedra Vanegas Cod. 1628466

Universidad Del Valle

Facultad De Ingenieria

Estadistica

Octubre

2017

Índice

1. Situación 1	3
1.1. Punto a.	3
1.2. Punto b.	3
2. Situación 2	4
3. Situación 3	5
3.1. Punto a.	5
3.2. Punto b.	5
3.3. Punto c.	8
4. Situación 4	9
4.1. Punto a.	9
4.2. Punto b.	9
4.3. Punto c.	9
5. Situación 5	10
6. Situación 6	11
6.1. Punto a.	11
6.2. Punto b.	12
7. Situación 7	14

1. Situación 1

Se generaron 5000 muestras aleatorias de tamaño $n=10$, de una poblacion normal con parametros $\mu = 5$ y $\sigma = 1$ y para cada una de las muestras, se encontro un intervalo de confianza para la media y la varianza respectivamente, con una confianza del 95 %.

Para la media:

Nos arrojo que el porcentaje de intervalos que atrapan la verdadera media es: 95.22 %

Y la longitud promedio o esperada de cada intervalo fue hallada como: $\sum_{i=1}^{5000} \frac{(LS_i - LI_i)}{5000}$ lo que nos arrojo un resultado de 1.2395.

El porcentaje de intervalos que atrapan la verdadera media tiene mucho sentido, ya que, al trabajar con una confianza del 95 %, estamos diciendo que el 95 % de las veces que se repita el experimento (en este caso que se obtenga una muestra distinta de la misma poblacion), el verdadero valor de la media caera en el intervalo obtenido. Como obtuvimos un porcentaje del 95.22 %, nos indica que el 95.22 % de las veces que se repitio el experimento (remuestrear y obtener el IC para la media), la verdadera media cayo en el intervalo encontrado.

Con respecto a la longitud promedio, esta nos arroja la amplitud que tiene aproximadamente cada intervalo. En este caso, todos los intervalos tienen exactamente la misma longitud, ya que utilizamos la estimacion cuando σ es conocida, y en este tipo de estimacion, la parte que se le suma y se le resta a la media muestral para hallar el intervalo de confianza, no depende de los datos. esa parte es $\pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Entonces, en este caso, el 1.2395 que nos arrojo la longitud promedio, nos dice que cada uno de los 5000 intervalos tiene una longitud de 1.2395.

Para la varianza:

1.1. Punto a.

Para la media:

Utilizamos la siguiente tabla para ver mas facilmente la comparacion por tamaños de muestra, de la proporcion de intervalos que atrapan la verdadera media y de la longitud promedio de los intervalos.

	n=10	n=30	n=50	n=100
Porcentaje	0.9522	0.9474	0.9508	0.9464
Longitud promedio del intervalo	1.2395	0.7156	0.5543	0.3919

La siguiente figura nos muestra los 100 primeros intervalos con cada tamaño de muestra (10,20,50,100), ya que si elaborabamos la grafica con los 5000, no nos daba una vision clara ni comparable.

1.2. Punto b.




Figura 1: Grafica comparativa de los 100 primeros intervalos por cada tamaño de muestra

2. Situación 2

Para darnos cuenta que en realidad la mayoría de personas aprueba el proyecto de fluoración del agua, debemos encontrar un intervalo de confianza de la proporción de personas que están a favor, y ver si este está por encima del 0.5.

Entonces. Tomando los datos del enunciado tenemos:

$n = 200$, $\hat{P} = \frac{110}{200} = 0.55$ (Proporción de personas a favor), $\alpha = 0.01$ entonces $1 - \alpha = 0.99$

Ahora, para encontrar un intervalo de confianza para la proporción, aplicamos la siguiente fórmula:

$$IC(P)_{(1-\alpha)\%} = \left[\hat{P} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}; \hat{P} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right]$$

Reemplazando en la fórmula, tenemos:

$$IC(P)_{99\%} = \left[0.55 - Z_{0.995} \sqrt{\frac{0.55(0.45)}{200}}; 0.55 + Z_{0.995} \sqrt{\frac{0.55(0.45)}{200}} \right]$$

$$IC(P)_{99\%} = [0.55 - 2.5758(0.035178); 0.55 + 2.5758(0.035178)]$$

$$IC(P)_{99\%} = [0.4594; 0.6406]$$

INTERPRETACION:

Como asignamos una confianza del 99% a nuestro intervalo, decimos que el 99% de las veces que se repita el experimento, la proporción real de personas que están a favor de que se agregue fluoruro de sodio al agua va a caer en dicho intervalo (entre 0.4594 y 0.6406). Ahora, observando la gráfica, podemos ver que en el intervalo está contenida la probabilidad de 0.5, por lo tanto, la muestra no nos da evidencia para decir que la mayoría de personas aprueba el proyecto de fluoración.




Figura 2: Interpretacion intervalo para proporciones

3. Situación 3

3.1. Punto a.

En el analisis exploratorio de datos que se elaboro, encontramos que la mejor grafica para mostrar la efectividad de la campana publicitaria fue la grafica de puntos y lineas. El eje x son cada una de las sucursales o negocios, y el eje y son las unidades vendidas. La linea negra representa las unidades que se vendian en dichos negocios antes de la campana publicitaria, y la roja representa las unidades vendidas despues de la campana.

Podemos observar que en solo dos de los negocios la linea negra esta por encima de la blanca, es decir, se vendieron mas articulos antes de la campana que despues de ella; en el resto de negocios (10 negocios) la linea roja esta por encima de la negra, es decir, se vendieron mas articulos despues de la campana que antes de ella. Ademias, si miramos detalladamente las diferencias en los negocios en los cuales la linea negra esta por encima de la roja son de tan solo una unidad vendida, en cambio en los negocios en los cuales la linea roja esta por encima de la negra, hay diferencia hasta de 7 unidades vendidas.

Concluimos entonces, que con el analisis exploratorio y con la grafica obtenida, la campana publicitaria si es efectiva.

3.2. Punto b.

Como las muestras estan relacionadas, ya que son tomadas antes y despues de un tratamiento (en




Figura 3: Grafico de puntos y lineas por negocio de unidades vendidas, antes y despues de la publicidad

este caso la campana publicitaria) a la misma poblacion. Entonces para encontrar este intervalo debemos usar la estimacion para la diferencia de medias para muestras relacionadas.

La formula que tenemos para este tipo de estimacion es:

$$IC(\mu_D)_{(1-\alpha)\%} = \bar{d} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \cdot \frac{Sd}{\sqrt{n}}$$

En este tipo de intervalo de confianza, todo se basa en la diferencia entre cada uno de los valores del antes y despues del tratamiento, por tanto, para mayor comodida encontramos las diferencias y las añadimos a la tabla:

ANTES	12	10	15	8	19	14	12	21	16	11	8	15
DESPUES	11	11	17	9	21	13	16	25	20	18	10	17
DIFERENCIA	1	-1	-2	-1	-2	1	-4	-4	-4	-7	-2	-2

Encontramos que: $\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{12} d_i}{12} = \frac{-27}{12} = -2.25$ y $Sd = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (d_i - \bar{d})^2}{11}} = 2.2613$

Ahora, reemplazando en la formula, nos queda:

$$IC(\mu_D)_{95\%} = [-2.25 \pm t_{(0.975; 11)} \cdot \frac{2.2613}{\sqrt{12}}]$$

$$IC(\mu_D)_{95\%} = [-2.25 \pm 2.2009 \cdot \frac{2.2613}{\sqrt{12}}]$$

$$IC(\mu_D)_{95\%} = [-3.6880; -0.8119]$$

En conclusion, un intervalo de confianza para la diferencia de medias de unidades vendidas durante un mes antes y un mes despues de la campaña es (-3.6880 ; -0.8119).

3.3. Punto c.

Para interpretar el intervalo obtenido y darnos cuenta si la campaña publicitaria es efectiva o no, realizamos la siguiente imagen:




Figura 4: Interpretacion intervalo para diferencia de medias en muestras relacionadas

Como asignamos una confianza del 95 % a nuestro intervalo, quiere decir que el 95 % de las veces que se repita el experimento, la diferencia real de las medias va a caer entre (-3.6880 y -0.8119). Al ver la imagen, observamos que el intervalo obtenido no contiene al cero y ademas esta debajo de el, lo que nos indica que $\mu_2 > \mu_1$, y esto nos dice que el promedio de ventas despues de la campaña publicitaria es mayor que el promedio de ventas antes de la campaña.

En conclusion, podemos decir que la campaña publicitaria es efectiva ya que aumenta el promedio de ventas.

4. Situación 4

4.1. Punto a.

4.2. Punto b.

4.3. Punto c.

5. Situación 5

6. Situación 6

6.1. Punto a.

Para darnos cuenta si las varianzas se pueden considerar como iguales o diferentes, debemos encontrar un intervalo de confianza para la razón de las varianzas.

Extrayendo la información del enunciado, tenemos:

$$1 - \alpha = 0.98 \text{ entonces } \alpha = 0.02$$

Ahora, la fórmula para obtener un intervalo de confianza para la razón de varianzas es:

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right)_{(1-\alpha)\%} = \left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\left(\frac{\alpha}{2}, n_2-1, n_1-1\right)}; \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\left(1-\frac{\alpha}{2}, n_2-1, n_1-1\right)} \right]$$

Hallamos S_1^2 y S_2^2 :

$$S_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_{1i} - \bar{x}_1)^2}{9} = 76875.9550 \text{ y } S_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_{2i} - \bar{x}_2)^2}{7} = 1044021.331$$

Reemplazando todo en la fórmula del intervalo, nos queda:

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right)_{98\%} = \left[\frac{76875.9550}{1044021.331} \cdot F_{(0.01, 7, 9)}; \frac{76875.9550}{1044021.331} \cdot F_{(0.99, 7, 9)} \right]$$

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right)_{98\%} = [0.0765 \cdot 0.14884; 0.0765 \cdot 5.61287]$$

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right)_{98\%} = [0.01138; 0.42938]$$

Para interpretar más fácilmente el intervalo obtenido, hicimos la siguiente gráfica:




Figura 5: Interpretación intervalo para la razón de varianzas

Como asignamos una confianza del 98 % quiere decir, que el 98 % de las veces que se repita el

experimento con las mismas condiciones, la razon de varianzas poblacionales va a estar entre (0.01138 y 0.42938). Si nos fijamos en la imagen, vemos que el intervalo no contiene al 1, y cae por debajo de el. Entonces concluimos que no se pueden considerar las varianzas poblacionales como iguales, y se tiene fuerte evidencia de que $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.

6.2. Punto b.

Para recomendar o no el uso del revestimiento como mecanismo complementario, encontraremos un intervalo de confianza para diferencia de medias, y asi darnos cuenta si la resistencia promedio de las tuberias aumento, disminuyo, o se mantuvo igual.

Como informacion tenemos: $\bar{x}_1 = 2902.8$, $\bar{x}_2 = 2783.125$, $S_1^2 = 76875.9550$ y $S_2^2 = 1044021.331$

Debemos aplicar la estimacion para diferencia de medias con σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas pero diferentes, ya que en el punto anterior, mostramos que con una confianza del 98 % las varianzas poblacionales no van a ser iguales.

Sustituyendo los valores en la formula, tenemos:

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{98\%} = (2902.8 - 2783.125) \pm t_{(0.99;16)} \cdot Sp \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}}$$

Debemos hallar Sp:

$$Sp = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}} = \sqrt{\frac{9 \cdot 76875.9550 + 7 \cdot 1044021.331}{10+8-2}} = \sqrt{500002.057} = 707.1082$$

Ahora, reemplazando todo, nos queda:

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{98\%} = [119.675 \pm 2.58349 \cdot 707.1082 \cdot 0.47434]$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2)_{98\%} = [-746.8526; 986.2026]$$

INTERPRETACION:

Para interpretar mas facilmente el intervalo obtenido, elaboramos la siguiente grafica:




Figura 6: Interpretacion intervalo para diferencia de medias en muestras independientes

Como el intervalo encontrado tiene una confianza del 98 %, decimos que el 98 % de las veces que se repita el experimento en las mismas condiciones, la diferencia de medias de resistencia reales va a caer entre -746.8526 y 986.2026 . Además, si detallamos la imagen, podemos ver que el intervalo obtenido contiene al cero, esto quiere decir que $\mu_1 = \mu_2$ o son muy cercanos. Por lo que concluimos que el uso del revestimiento no eleva la resistencia promedio de las tuberías, y no es recomendable el uso de este como mecanismo complementario.

7. Situación 7

Para comparar los tres estimadores propuestos para el CV, se genero una poblacion para cada distribucion (normal, gamma y uniforme) y se obtuvieron 5000 muestras aleatorias para cada uno de los distintos tamaños de muestra (5,10,20,30,...,100). Las poblaciones sobre las cuales se obtuvieron las muestras fueron definidas de la siguiente manera:

1. $Normal(\mu = 200, \sigma = \sqrt{400})$
2. $Gamma(\alpha = 0.5, \beta = 100)$
3. $Uniforme(a = 200, b = 600)$




Figura 7: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para σ de la distribución normal




Figura 8: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para cv de la distribución normal




Figura 9: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para σ de la distribución gamma




Figura 10: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para cv de la distribución gamma




Figura 11: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para σ de la distribución uniforme




Figura 12: Proporción de cobertura y longitud promedio de los intervalos para cv de la distribución uniforme