

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Reparación, recuperación y tejidos

Esta guía reúne los péptidos de Peptigene en la categoría **reparación, recuperación y tejidos** (*curación, articulaciones e inflamación*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

REPARACIÓN, RECUPERACIÓN Y TEJIDOS · Curación, articulaciones e inflamación

BPC-157 · Péptido de reparación · recuperación

Qué es. Péptido de origen gástrico muy usado para recuperación de tejidos; evidencia principalmente preclínica.

Cómo funciona. Favorece la angiogénesis y la reparación de tendones, ligamentos, músculo y mucosa digestiva.

Beneficios

- Acelera la recuperación de lesiones.
- Apoya la salud digestiva e intestinal.
- Efecto antiinflamatorio local.

Dosis habitual	250–500 mcg, 1–2 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 2–6 sem
Dosis mínima	250 mcg/día	Vía	Subcutánea (local/sistémica)

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo por falta de datos; evidencia clínica limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en recuperación o rehabilitación, con criterio médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Reparación, recuperación y tejidos

TB-500 · Fragmento de timosina $\beta 4$ · reparación

Qué es. Fragmento sintético de la timosina beta-4 orientado a reparación y flexibilidad de tejidos.

Cómo funciona. Regula la actina y promueve migración celular, angiogénesis y reducción de adherencias.

Beneficios

- Recuperación muscular y articular.
- Mejora de flexibilidad y rango de movimiento.
- Efecto sistémico de reparación.

Dosis habitual	2–2.5 mg, 2 veces/sem (carga)	Duración sugerida	Carga 4–6 sem + mantenimiento
Dosis mínima	2 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; datos clínicos limitados.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con lesiones o alto desgaste físico, bajo supervisión.

KPV · Tripéptido antiinflamatorio · intestino

Qué es. Fragmento del alfa-MSH con potente acción antiinflamatoria, especialmente digestiva.

Cómo funciona. Modula la inflamación a nivel celular (NF- κ B) sin efecto pigmentante.

Beneficios

- Reduce la inflamación intestinal.
- Apoyo en trastornos digestivos y cutáneos.
- Buen perfil de tolerancia.

Dosis habitual	200–500 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 sem
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea u oral

Contraindicaciones. Datos clínicos limitados; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inflamación digestiva o cutánea, con criterio médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Reparación, recuperación y tejidos

ARA-290 (Cibinetida) · Péptido derivado de EPO · dolor neuropático

Qué es. Péptido derivado de la eritropoyetina, sin efecto sobre la sangre, con acción antiinflamatoria y neuroreparadora.

Cómo funciona. Activa el receptor innato de reparación tisular, reduciendo la inflamación y el dolor neuropático.

Beneficios

- Reduce el dolor neuropático.
- Efecto antiinflamatorio y de reparación nerviosa.
- No estimula la producción de glóbulos rojos.

Dosis habitual	1–4 mg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–12 sem
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Datos clínicos en investigación; evitar en embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con dolor neuropático o neuroinflamación, bajo supervisión.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**