

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Sistema inmune

Esta guía reúne los péptidos de Peptigene en la categoría **sistema inmune** (*modulación y defensa*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

SISTEMA INMUNE · Modulación y defensa

Timosina Alfa-1 · Péptido tímico · inmunomodulador

Qué es. Péptido del timo con uso clínico aprobado en varios países como inmunomodulador.

Cómo funciona. Estimula la maduración de linfocitos T y equilibra la respuesta inmune.

Beneficios

- Refuerza la respuesta inmune.
- Apoyo frente a infecciones crónicas.
- Modulación de la inflamación.

Dosis habitual	1.6 mg, 2 veces/sem	Duración sugerida	Ciclos de 4–12 sem
Dosis mínima	1.6 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Trasplantados o inmunosupresión dirigida; embarazo con cautela.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inmunidad debilitada, previa valoración médica.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Sistema inmune

Timalina · Extracto peptídico tímico · inmunidad

Qué es. Complejo de péptidos tímicos usado como bioregulador inmune y de longevidad.

Cómo funciona. Normaliza el número y función de linfocitos T y B y regula la inmunidad.

Beneficios

- Equilibra la función inmune.
- Apoyo en recuperación y envejecimiento.
- Regulación de la inflamación.

Dosis habitual	5–10 mg/día en ciclos	Duración sugerida	Ciclos de 5–10 días
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea o intramuscular

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; evidencia clínica variable.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inmunidad baja o enfoque de longevidad, con criterio médico.

LL-37 · Péptido antimicrobiano · cathelicidina

Qué es. Péptido antimicrobiano natural del sistema inmune innato; uso en investigación.

Cómo funciona. Destruye microorganismos y modula la inflamación y la reparación de heridas.

Beneficios

- Acción antimicrobiana de amplio espectro.
- Apoyo a la cicatrización.
- Modulación inmune.

Dosis habitual	No estandarizada en humanos	Duración sugerida	Experimental
Dosis mínima	No estandarizada	Vía	Subcutánea o tópica

Contraindicaciones. Sin protocolo humano estandarizado; puede ser proinflamatorio en exceso.

¿Es apto para el tratamiento? Uso en investigación; requiere criterio experto.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**