PEPTIGENE.CO

NEUROPEPTIDE · NOOTROPIC · NEUROPROTECTIVE · RESEARCH GRADE

SEMAX

Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · Análogo sint. del ACTH(4-10)

10 mg

Semax es un neuropéptido sintético derivado del fragmento ACTH(4-10), desarrollado por la Academia Rusa de Ciencias. Es el **nootrópico más potente de su clase**: potencia la memoria, la concentración y la neuroplasticidad al tiempo que protege el cerebro del estrés oxidativo y la isquemia. Aprobado en Rusia para tratamiento de ictus y deterioro cognitivo.

MECANISMO DE ACCIÓN

BDNF NGF	**Elevación de Factores Neurotróficos** Aumenta rápidamente el BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro) y el NGF en el hipocampo. Activa la vía BDNF/TrkB, esencial para la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria a largo plazo.
DA 5-HT	**Activación Dopaminérgica y Serotoninérgica** Incrementa la liberación y recambio de dopamina y serotonina, mejorando el estado de ánimo, la motivación, la atención y la función ejecutiva. Sin los efectos secundarios de los estimulantes clásicos.
MC4R MC5R	**Modulación de Receptores Melanocortina** Interactúa con los receptores MC4 y MC5, implicados en la cognición, la neuroprotección y la homeostasis energética cerebral.
ENK AOX	**Inhibición de Encefalinasas y Antioxidante** Inhibe las enzimas que degradan las encefalinas, prolongando su efecto analgésico y ansiolítico. Reduce la neuroinflamación y el estrés oxidativo cerebral.

ÁREAS DE BENEFICIO

Área	Beneficio investigado
■ **Memoria y aprendizaje**	Mejora la memoria a corto y largo plazo, la consolidación del aprendizaje y la capacidad de retención. Especialmente eficaz bajo alta demanda cognitiva.

PEPTIGENE.CO

NEUROPEPTIDE · NOOTROPIC · NEUROPROTECTIVE · RESEARCH GRADE

SEMAX

Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · Análogo sint. del ACTH(4-10)

10 mg

Área	Beneficio investigado
Atención y foco	Aumenta la concentración sostenida y la función ejecutiva. Investigado para TDAH, fatiga cognitiva y niebla mental.
Estado de ánimo	Efectos antidepresivos y ansiolíticos. Mejora la resiliencia emocional y reduce el impacto del estrés crónico.
Neuroprotección	Protege neuronas del daño isquémico, oxidativo e inflamatorio. Usado clínicamente en Rusia para ictus y encefalopatía.
Energía mental	Aumenta la motivación, la productividad y la resistencia mental sin los picos y caídas de los estimulantes convencionales.
Recuperación neural	Acelera la regeneración neurológica tras lesiones cerebrales, ictus o estrés crónico intenso. Mejora la neuroplasticidad.

Semax vs Selank — ¿cuál elegir?

• **Semax**: más estimulante cognitivo. Ideal para foco, memoria, productividad y recuperación neurológica.

• **Selank**: más ansiolítico. Ideal para ansiedad, estrés, sueño y bienestar emocional.

Muchos protocolos alternan ambos o los combinan para obtener beneficios cognitivos y emocionales completos.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

1

Preparar materiales

Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.

SEMAX

Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · Análogo sint. del ACTH(4-10)

10 mg

2	**Limpiar con alcohol** Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.
3	**Cargar el agua** Con la jeringa, extrae **1 ml** de agua bacteriostática.
4	**Añadir al vial del péptido** Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.
5	**Disolver suavemente** Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido.
6	**Conservar correctamente** Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **30 días**.

PEPTIGENE.CO

NEUROPEPTIDE · NOOTROPIC · NEUROPROTECTIVE · RESEARCH GRADE

SEMAX

Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · Análogo sint. del ACTH(4-10)

10 mg

REFERENCIA DE DOSIFICACIÓN

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	1 ml por vial
Concentración resultante	10 mg/ml (10.000 mcg/ml)
Dosis típica por inyección	250–600 mcg por inyección (1–2 veces al día)
Unidades en jeringa (100U)	2.5–6 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) · Zona abdominal o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C · Máx. **30 días**

■ **Administración alternativa:** Semax también puede administrarse como spray nasal (0.1 mg por aplicación nasal), permitiendo entrada directa al sistema nervioso central. El efecto por vía intranasal es más rápido (15-30 min). Consultar con el médico la vía más adecuada. Ciclo típico: 10-14 días ON, 7-14 días OFF.