

# CAGRIRETA

Cagrilintide 5mg · Retatrutide 5mg · Blend Metabolico

10 mg TOTAL

AMYLIN + TRIPLE AGONIST GLP-1/GIP/GCG · RESEARCH GRADE

CagriReta es una **combinacion de vanguardia** que une el analogo de amilina **Cagrilintide** con el triple agonista **Retatrutide (GLP-1 + GIP + Glucagon)**. Actuan por **cuatro mecanismos hormonales distintos y complementarios**, atacando la obesidad y el metabolismo desde angulos diferentes. Esta combinacion representa la frontera mas avanzada de la investigacion en terapias metabolicas peptidicas.

## COMPOSICION DEL BLEND

| Peptido                                | Dosis       | Mecanismo                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cagrilintide</b> Analogo de Amilina | <b>5 mg</b> | Agonista CALCR/RAMP (receptor amilina). Suprime apetito por via central independiente del GLP-1. Suprime glucagon postprandial. |
| <b>Retatrutide</b> Triple Agonista     | <b>5 mg</b> | Triple agonista GLP-1 + GIP + Glucagon. Maxima potencia metabolica: perdida de peso, control glucemico y termogenesis.          |

## LOS 4 MECANISMOS HORMONALES COMBINADOS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMILINA<br/>CALCR</b> | <b>Cagrilintide - Receptor de Amilina</b><br>Activa CALCR/RAMP en el area postrema y NTS. Suprime el apetito por via completamente diferente al GLP-1, creando un efecto aditivo poderoso. Vida media de 7 dias. Preserva masa muscular durante la perdida de peso. |
| <b>GLP-1</b>             | <b>Retatrutide - GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1)</b><br>Reduce el apetito, frena el vaciado gastrico, estimula la insulina y suprime el glucagon. Via diferente a la amilina: efecto sinergico.                                                                     |
| <b>GIP</b>               | <b>Retatrutide - GIP (Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide)</b><br>Potencia la insulina postprandial y mejora la depuracion de lipidos. Complementa el GLP-1 amplificando el control glucemico.                                                             |
| <b>GLUCAG.<br/>GCGR</b>  | <b>Retatrutide - Glucagon (Termogenesis y Grasa Hepatica)</b><br>Aumenta el gasto energetico y la termogenesis. Reduce la grasa hepatica hasta un 82%. Activa la lipolisis visceral. La clave de la potencia superior de Retatrutide.                               |

## BENEFICIOS DEL BLEND COMBINADO

# CAGRIRETA

Cagrilintide 5mg · Retatrutide 5mg · Blend Metabolico

10 mg TOTAL

AMYLIN + TRIPLE AGONIST GLP-1/GIP/GCG · RESEARCH GRADE

| Area                           | Beneficio investigado                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ ■ <b>Perdida de peso</b>     | Potencial superior al 25% de perdida de peso combinando los mecanismos de Cagrilintide (amilina) + Retatrutide (GLP-1+GIP+GCG). Cada componente actua por via diferente: efecto 4x. |
| ■ ■ <b>Control del apetito</b> | Doble supresion del apetito: Cagrilintide via area postrema/NTS + Retatrutide via receptores GLP-1 centrales. Sin escape ni tolerancia.                                             |
| ■ ■ <b>Grasa hepatica</b>      | Retatrutide reduce grasa hepatica hasta 82%. Cagrilintide mejora el metabolismo lipidico. Sinergia en MASH/NAFLD.                                                                   |
| ■ ■ <b>Control glucemico</b>   | Cuatro mecanismos sobre la glucosa: amilina, GLP-1, GIP y glucagon. Control glucemico superior a cualquier monoterapia.                                                             |
| ■ ■ <b>Masa muscular</b>       | Cagrilintide preserva mejor la masa muscular magra durante la perdida de peso respecto a monoterapia con GLP-1.                                                                     |
| ■ ■ <b>Cardiovascular</b>      | Reduccion de trigliceridos, presion arterial y circunferencia abdominal por mecanismos complementarios.                                                                             |

## Comparacion de potencia para perdida de peso:

Semaglutida (GLP-1): ~15% · Tirzepatida (GLP-1+GIP): ~21% · CagriSema (Amilina+GLP-1): ~25% · Retatrutide (GLP-1+GIP+GCG): ~24%

**CagriReta** combina los 4 mecanismos: Amilina + GLP-1 + GIP + Glucagon. Potencial teorico > 25-28%. En investigacion clinica activa.

## COMO RECONSTITUIR EL PEPTIDO

Sigue estos pasos con precaucion en un entorno limpio:

1

### Preparar materiales

Reune el vial del peptido, el vial de agua bacteriostatica, una jeringa y una aguja esteril.

2

### Limpiar con alcohol

Desinfecta el tapon de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.

# CAGRIRETA

Cagrilintide 5mg · Retatrutide 5mg · Blend Metabolico

**10 mg TOTAL**

AMYLIN + TRIPLE AGONIST GLP-1/GIP/GCG · RESEARCH GRADE

**3**

## Cargar el agua

Con la jeringa, extrae **2 ml** de agua bacteriostatica.

**4**

## Anadir al vial

Introduce la aguja e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

**5**

## Disolver suavemente

Gira el vial suavemente hasta disolver. **No agitar.**

**6**

## Conservar

Refrigerador (2-8C). No congelar. Max. **45 dias** con agua bacteriostatica.

## REFERENCIA DE DOSIFICACION

| Parametro                  | Detalle                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Agua bacteriostatica       | 2 ml                                                             |
| Concentracion resultante   | 5 mg/ml total (Cagrilintide: 2.5 mg/ml + Retatrutide: 2.5 mg/ml) |
| Dosis tipica               | 0.5–2.4 mg por inyeccion (una vez a la semana)                   |
| Unidades en jeringa 100U   | 10–48 unidades en jeringa de insulina 100U                       |
| Via de administracion      | Subcutanea (SC) - Abdomen o muslo                                |
| Conservacion reconstituido | Refrigerado 2-8C - Max. <b>45 dias</b>                           |

■ ■ **Protocolo de escalada:** Semanas 1-4: 0.5 mg (10 U) · Semanas 5-8: 1 mg (20 U) · Semanas 9-12: 1.5 mg (30 U) · Semanas 13+: 2-2.4 mg (40-48 U) segun tolerancia.  
Administrar una vez por semana, el mismo dia. El vial de 10 mg rinde **4-20 dosis** segun protocolo.  
Conservar reconstituido en refrigerador (2-8C) max. **45 dias** con agua bacteriostatica.