PT-141

Bremelanotida · Agonista MC3R/MC4R · 7 aminoácidos

10 mg

MELANOCORTIN AGONIST · SEXUAL HEALTH · RESEARCH GRADE

PT-141 (Bremelanotida) es un **heptapéptido cíclico agonista de los receptores de melanocortina MC3R y MC4R**, derivado de la hormona α-MSH. Es el **único agente aprobado por la FDA (Vyleesi®, 2019)** para el trastorno de deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas. A diferencia del sildenafilo, actúa directamente sobre el **sistema nervioso central**, modulando el deseo sexual sin depender de la vía vascular periférica.

MECANISMO DE ACCIÓN

MC4R HIPOT.	**Activación Central del MC4R Hipotalámico** PT-141 activa los receptores MC4R en el hipotálamo (especialmente en el núcleo paraventricular), disparando las vías dopaminérgicas y oxitocinérgicas que generan la motivación sexual y la excitación central, independientemente del flujo sanguíneo.
DOPA OCITOC.	**Liberación de Dopamina y Oxitocina** Estimula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y oxitocina en el hipotálamo, neurotransmisores directamente relacionados con el deseo, la motivación, el placer y el vínculo emocional.
MC3R MC1R	**Acción sobre MC3R y Efectos Sistémicos** La activación del MC3R modula la inflamación y la función autónoma. La activación del MC1R explica el transitorio enrojecimiento facial (flushing) reportado como efecto secundario en algunos usuarios.
NO VASC.	**Efecto Vascular Secundario vía Óxido Nítrico** Secundariamente, el aumento del tono dopaminérgico promueve la liberación de NO (óxido nítrico) a nivel genital, mejorando la vasodilatación y la respuesta eréctil/lubricación como efecto periférico complementario.

BENEFICIOS INVESTIGADOS

Área	Beneficio investigado
■■ **Deseo sexual femenino**	Aprobado FDA (Vyleesi®) para trastorno de deseo sexual hipoactivo (HSDD) en mujeres premenopáusicas. Eficacia demostrada en ensayos Fase 3.
■■ **Disfunción eréctil**	Eficaz en disfunción eréctil, incluyendo casos resistentes al sildenafilo o con base psicogénica. Actúa centralmente, no requiere estimulación vascular.

PT-141

Bremelanotida · Agonista MC3R/MC4R · 7 aminoácidos

10 mg

MELANOCORTIN AGONIST · SEXUAL HEALTH · RESEARCH GRADE

Área	Beneficio investigado
■■ **Deseo psicogénico**	Especialmente útil cuando la disfunción sexual tiene origen psicológico, emocional o por estrés. Actúa sobre el deseo central, no solo la respuesta física.
■■ **Vínculo y conexión**	El efecto oxitocinérgico puede mejorar la conexión emocional y la intimidad de pareja más allá de la respuesta física.
■■ **Menopáusica y post-menopausia**	Investigado para disfunción sexual en mujeres menopáusicas donde los cambios hormonales afectan el deseo.
■■ **Antiinflamatorio (secundario)**	La activación MC3R tiene efectos antiinflamatorios documentados. Investigado en artritis y condiciones inflamatorias.

PT-141 vs Sildenafilo/Tadalafilo:
• **PT-141**: acción central (cerebro). Activa el deseo y la motivación sexual. Eficaz en disfunción psicogénica y en ambos sexos. No requiere estimulación previa.
• **Sildenafilo/Tadalafilo**: acción periférica (vasodilatación genital). Mejoran la respuesta física pero no actúan sobre el deseo central.
→ PT-141 y PDE5i son complementarios: diferentes mecanismos, diferentes indicaciones.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

1 **Preparar materiales**
Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.

2 **Limpiar con alcohol**
Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.

3 **Cargar el agua**
Con la jeringa, extrae **2 ml** de agua bacteriostática.

PT-141

Bremelanotida · Agonista MC3R/MC4R · 7 aminoácidos

10 mg

MELANOCORTIN AGONIST · SEXUAL HEALTH · RESEARCH GRADE

4 **Añadir al vial del péptido**
Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

5 **Disolver suavemente**
Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido.

6 **Conservar correctamente**
Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **45 días** gracias al agua bacteriostática.

REFERENCIA DE DOSIFICACIÓN

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	2 ml
Concentración resultante	5 mg/ml
Dosis típica	1–2 mg por inyección (1–4 horas antes de la actividad sexual)
Unidades en jeringa 100U	20–40 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) · Abdomen o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C · Máx. **45 días**

■■ **Timing y uso:** Administrar 1-4 horas antes de la actividad sexual. El efecto comienza en 30-60 minutos y dura 6-12 horas. Iniciar con dosis baja (0.5-1 mg) para evaluar tolerancia. Efectos secundarios comunes: enrojecimiento facial transitorio, náuseas leves, aumento de la presión arterial temporal. No usar más de una vez cada 24 horas. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8°C) máx. 45 días con agua bacteriostática.