

CAGRILINTIDA

Posología y guía de dosificación · Análogo de amilina

10 mg

AMYLIN ANALOG · WEIGHT LOSS · ADMINISTRACIÓN SEMANAL

La Cagrilintida es un análogo de amilina de **administración semanal**. Su dosificación se hace por **escalada progresiva** para maximizar la tolerancia digestiva. A continuación se detalla cómo reconstituir el vial de 10 mg, convertir la dosis en unidades de jeringa de insulina y avanzar por fases.

1 · RECONSTITUCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Reconstituye el vial de 10 mg con agua bacteriostática. La cantidad de agua define la concentración y cuántas unidades equivale cada dosis:

Agua bacteriostática	Concentración	Equivale por unidad (jeringa 100U)
1 ml	10 mg/ml	100 mcg por unidad
2 ml (recomendada)	5 mg/ml	50 mcg por unidad

Las unidades de la siguiente tabla usan la concentración recomendada de **5 mg/ml** (vial de 10 mg + 2 ml de agua bacteriostática).

2 · PROTOCOLO DE ESCALADA SEMANAL

Fase	Dosis semanal	Unidades (jeringa 100U)	Objetivo
Semanas 1–4	0.3 mg	6 U	Inicio / adaptación
Semanas 5–8	0.6 mg	12 U	Primer ajuste
Semanas 9–12	1.2 mg	24 U	Progresión
Semanas 13+	2.4 mg	48 U	Mantenimiento

Sube de fase solo si toleras bien la dosis actual. Ante náuseas u otras molestias, **mantén la dosis** (o retrocede una fase) antes de continuar.

CAGRILINTIDA

Posología y guía de dosificación · Análogo de amilina

10 mg

AMYLIN ANALOG · WEIGHT LOSS · ADMINISTRACIÓN SEMANAL

3 · ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN

Frecuencia	Una vez por semana, el mismo día.
Vía	Subcutánea (SC) en abdomen o muslo; rota el sitio de inyección.
Momento	A cualquier hora, con o sin comida; mantén el día fijo.
Conservación	Reconstituida: refrigerada 2–8 °C. No congelar. Máx. 45 días.
Rendimiento del vial	10 mg ≈ 4 dosis de mantenimiento (2.4 mg) o ~33 semanas a la dosis inicial de 0.3 mg.

4 · CONTRAINDICACIONES Y APTITUD

No apto en embarazo y lactancia; precaución en enfermedad digestiva significativa. Evita combinar con otros agonistas (GLP-1) sin control médico. Confirma tu **aptitud** con una valoración previa. Esta posología es una referencia educativa: las dosis deben individualizarse y ajustarse **bajo la supervisión de un profesional de la salud**.