IPAMORELIN

Secretagogo Selectivo de GH · Pentapéptido · 5 aminoácidos

10 mg

GH SECRETAGOGUE · GHRP · SELECTIVE · RESEARCH GRADE

Ipamorelin es un **pentapéptido secretagogo de GH de tercera generación** (Ala-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2), agonista selectivo del receptor GHSR-1a (ghrelina). Es el secretagogo más **limpio y selectivo** disponible: estimula la liberación de GH sin afectar el cortisol, la prolactina ni el ACTH, a diferencia de los GHRP de generaciones anteriores (GHRP-2, GHRP-6). Es el complemento ideal del CJC-1295 No DAC.

MECANISMO DE ACCIÓN

GHSR-1a GHREL.	**Agonista Selectivo del Receptor GHSR-1a** Ipamorelin se une al receptor de ghrelina (GHSR-1a) en los somatotropos hipofisarios con alta afinidad y selectividad. Esto desencadena la liberación de GH en pulsos agudos sin activar otros receptores de la familia GHRP.
SELECTIV. SIN CORT.	**Selectividad única: Solo GH, Sin Cortisol ni Prolactina** A diferencia del GHRP-2 y GHRP-6, Ipamorelin **no eleva el cortisol, la prolactina ni el ACTH**. Esta selectividad excepcional lo convierte en el secretagogo más seguro para protocolos prolongados sin efectos secundarios hormonales indeseados.
GH PULSO	**Pulsos Fisiológicos de GH** Genera un pico de GH de ~2 horas de duración, imitando el ritmo pulsátil natural. La GH liberada activa el eje GH→IGF-1 con todos sus efectos anabólicos, lipolíticos y regenerativos.
SINERGIA CJC+IPA	**Sinergia Óptima con CJC-1295 No DAC** CJC-1295 (GHRH) prepara y amplifica la respuesta hipofisaria, mientras Ipamorelin (GHRP) dispara el pulso de GH. Juntos producen liberaciones de GH **3-10 veces superiores** a cualquiera de los dos por separado.

BENEFICIOS INVESTIGADOS

Área	Beneficio investigado
■■ **Masa muscular**	Estimula la síntesis proteica y la hipertrofia muscular vía GH/IGF-1. Favorece la ganancia de masa magra sin retención hídrica.
■■ **Quema de grasa**	Aumenta la lipólisis en tejido adiposo. Mejora la composición corporal con pérdida de grasa preferencial.

IPAMORELIN

Secretagogo Selectivo de GH · Pentapéptido · 5 aminoácidos

10 mg

GH SECRETAGOGUE · GHRP · SELECTIVE · RESEARCH GRADE

Área	Beneficio investigado
■■ **Calidad de sueño**	Mejora el sueño profundo (N3/delta), la recuperación nocturna y la regeneración celular durante el descanso.
■■ **Recuperación**	Acelera la recuperación muscular post-entrenamiento y la reparación de tejidos mediante IGF-1.
■■ **Anti-aging**	Contrarresta el declive natural de GH tras los 30 años. Mejora la piel, la energía, la vitalidad y la densidad ósea.
■■ **Huesos y articulaciones**	Estimula la densidad mineral ósea y la producción de colágeno articular vía IGF-1.

La combinación clásica: CJC-1295 No DAC + Ipamorelin
• **CJC-1295 No DAC**: 100-300 mcg → prepara la hipófisis (vía GHRH)
• **Ipamorelin**: 100-300 mcg → dispara el pulso de GH (vía GHSR)
→ Inyectar **juntos en la misma jeringa**, 30-60 min antes de dormir o post-entreno. El efecto combinado es **3-10x superior** a cualquiera solo.
Protocolo: 5 días ON / 2 días OFF.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

1 **Preparar materiales**
Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.

2 **Limpiar con alcohol**
Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.

3 **Cargar el agua**
Con la jeringa, extrae **2 ml** de agua bacteriostática.

IPAMORELIN

Secretagogo Selectivo de GH · Pentapéptido · 5 aminoácidos

10 mg

GH SECRETAGOGUE · GHRP · SELECTIVE · RESEARCH GRADE

4 **Añadir al vial del péptido**
Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

5 **Disolver suavemente**
Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido.

6 **Conservar correctamente**
Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **45 días** gracias al agua bacteriostática.

REFERENCIA DE DOSIFICACIÓN

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	2 ml
Concentración resultante	5 mg/ml (5.000 mcg/ml)
Dosis típica	100–300 mcg por inyección (1–3 veces al día)
Unidades en jeringa 100U	2–6 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) · Abdomen o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C · Máx. **45 días**

Timing óptimo: Inyectar 30-60 min antes de dormir (inyección principal) para aprovechar el pico nocturno de GH. Segunda inyección opcional: post-entrenamiento o al despertar en ayunas. Combinar con CJC-1295 No DAC en la misma jeringa para máximo efecto. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8°C) máx. 45 días con agua bacteriostática.