# MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA-c

**40 mg**

MOTS-c es un péptido **mitocondrial único** de 16 aminoácidos que activa la enzima AMPK — el regulador maestro de la energía celular — promoviendo metabolismo eficiente, quema de grasa, sensibilidad a la insulina y envejecimiento saludable.

## ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y BENEFICIOS

| Área | Beneficio investigado |
|---|---|
| **Metabolismo** | Mejora la sensibilidad a la insulina y regula el azúcar en sangre. Promueve la oxidación de grasas. |
| **Energía celular** | Optimiza la producción de ATP. Imita los efectos del ejercicio a nivel molecular. |
| **Masa muscular** | Apoya la función del músculo esquelético y combate la sarcopenia relacionada con la edad. |
| **Longevidad** | Promueve el envejecimiento saludable protegiendo las células del estrés oxidativo. |
| **Corazón** | Mejora la eficiencia miocárdica y la función cardíaca mediante activación de AMPK. |
| **Neuroprotecc.** | Investigado por su potencial neuroprotector y mejora de la función cognitiva. |

MOTS-c es producido naturalmente por el cuerpo durante el **ejercicio físico** y el **ayuno**. Sus niveles disminuyen con la edad. El uso exógeno busca amplificar los efectos del ejercicio a nivel celular.

## CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

PEPTIGENE.CO

MITOCHONDRIAL PEPTIDE · RESEARCH GRADE

# MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA-c

**40 mg**

| | |
|---|---|
| 1 | **Preparar materiales**<br>Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril. |
| 2 | **Limpiar con alcohol**<br>Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos. |
| 3 | **Cargar el agua**<br>Con la jeringa, extrae **2 ml** de agua bacteriostática. |
| 4 | **Añadir al vial del péptido**<br>Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo. |
| 5 | **Disolver suavemente**<br>Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido. |
| 6 | **Conservar correctamente**<br>Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **30 días**. |

# MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA-c

**40 mg**

| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| **Agua bacteriostática** | 2 ml por vial |
| **Concentración resultante** | 20 mg/ml |
| **Dosis típica por inyección** | 5–10 mg por inyección (2–3 veces por semana) |
| **Unidades en jeringa (100U)** | 25–50 unidades en jeringa de insulina 100U |
| **Vía de administración** | Subcutánea (SC) · Zona abdominal o muslo |
| **Conservación reconstituido** | Refrigerado 2-8°C · Máx. **30 días** |

■ **Nota:** MOTS-c se administra típicamente 2-3 veces por semana, no diariamente. Un vial de 40 mg rinde aproximadamente 4–8 dosis según el protocolo.