

KISSPEPTIN-10

Decapeptido Hipotalamico · Agonista KISS1R/GPR54

10 mg

REPRODUCTIVE HORMONE MODULATOR · RESEARCH GRADE

Kisspeptin-10 es el **fragmento bioactivo de 10 aminoácidos** de la kisspeptina, un neuropeptido producido en el hipotálamo que actúa como el **regulador maestro del eje reproductivo** (eje HPG: hipotálamo-hipofisis-gonadas). Descubierto inicialmente como supresor de metastasis tumoral (de ahí su nombre, relacionado con "KiSS" de Hershey, Pennsylvania), hoy es ampliamente investigado como el activador fisiológico mas potente conocido de la secreción de GnRH.

MECANISMO DE ACCION

KISS1R GPR54	Activacion del Receptor KISS1R Kisspeptin-10 se une al receptor KISS1R (también llamado GPR54) en las neuronas GnRH del hipotálamo. Esta unión activa la fosfolipasa C y desencadena la liberación pulsátil de GnRH, el regulador maestro de todo el eje reproductivo.
GnRH LH/FSH	Estimulacion del Eje HPG La liberación de GnRH estimula la hipofisis a secretar LH (Hormona Luteinizante) y FSH (Hormona Folículoestimulante), que a su vez activan la producción gonadal de testosterona (hombres) o estrógeno/progesterona (mujeres).
FISIOL. NATURAL	Mecanismo Mas Fisiologico que hCG A diferencia de hCG (que actúa directamente en las gonadas), Kisspeptin actúa en el origen de la cascada hormonal (hipotálamo), preservando el patrón pulsátil natural y la retroalimentación fisiológica completa del eje HPG.
PUBERT. METAB.	Regulacion del Inicio Puberal y Metabolismo Kisspeptin es el desencadenante fisiológico del inicio de la pubertad. También integra señales metabólicas (leptina, nutrición) con la función reproductiva, vinculando el estado energético del cuerpo con la fertilidad.

BENEFICIOS INVESTIGADOS

Area	Beneficio investigado
■ ■ Fertilidad masculina	Estimula la producción endógena de testosterona vía LH/FSH. Preserva la fertilidad y el tamaño testicular, a diferencia de TRT directa.
■ ■ Fertilidad femenina	Investigado para inducción de ovulación en tratamientos de fertilidad (FIV). Menor riesgo de hiperestimulación ovárica que otros protocolos.

KISSPEPTIN-10

Decapeptido Hipotalamico · Agonista KISS1R/GPR54

10 mg

REPRODUCTIVE HORMONE MODULATOR · RESEARCH GRADE

Area	Beneficio investigado
■ ■ Hipogonadismo	Tratamiento del hipogonadismo hipogonadotropico restaurando la senal natural del eje HPG en su origen.
■ ■ Salud hormonal post-TRT	Investigado para restaurar la funcion testicular tras suspender terapia de reemplazo de testosterona (PCT).
■ ■ Metabolismo y apetito	Integra senales metabolicas con la funcion reproductiva. Investigado en la conexion entre balance energetico y fertilidad.
■ ■ Investigacion oncologica	Estudiado originalmente como supresor de metastasis tumoral en multiples tipos de cancer (origen del nombre Kisspeptin).

Kisspeptin vs hCG vs Enclomifeno (PCT/fertilidad):

- **Kisspeptin**: actua en el hipotalamo (origen de la cascada). El mas fisiologico, preserva el patron pulsatil natural de GnRH.
- **hCG**: actua directamente en las gonadas, saltandose el eje hipotalamico. Mas potente pero menos fisiologico.
- **Enclomifeno**: bloquea el feedback negativo del estrogeno en el hipotalamo. Via diferente, efecto indirecto.

COMO RECONSTITUIR EL PEPTIDO

Sigue estos pasos con precaucion en un entorno limpio:

1	Preparar materiales Reune el vial del peptido, el vial de agua bacteriostatica, una jeringa de 1 ml y una aguja esteril.
2	Limpiar con alcohol Desinfecta el tapon de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.
3	Cargar el agua Con la jeringa, extrae 2 ml de agua bacteriostatica.

KISSPEPTIN-10

Decapeptido Hipotalamico · Agonista KISS1R/GPR54

10 mg

REPRODUCTIVE HORMONE MODULATOR · RESEARCH GRADE

4

Anadir al vial del peptide

Introduce la aguja en el tapon del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

5

Disolver suavemente

Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar.**

6

Conservar correctamente

Refrigerador (2-8C). No congelar. Maximo **45 dias** con agua bacteriostatica.

REFERENCIA DE DOSIFICACION

Parametro	Detalle
Agua bacteriostatica	2 ml
Concentracion resultante	5 mg/ml (5.000 mcg/ml)
Dosis tipica	50–100 mcg por inyeccion (1–2 veces al dia)
Unidades en jeringa 100U	1–2 unidades en jeringa de insulina 100U
Via de administracion	Subcutanea (SC) - Abdomen o muslo
Conservacion reconstituido	Refrigerado 2-8C - Max. 45 dias

■ ■ **Nota sobre vida media:** Kisspeptin-10 tiene una vida media muy corta (unos pocos minutos), por lo que en protocolos de investigacion clinica a menudo se administra en infusion continua o multiples inyecciones diarias. Para uso SC simple: **1-2 inyecciones diarias** de 50-100 mcg. El vial de 10 mg rinde aproximadamente **100-200 dosis**. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8C) max. **45 dias** con agua bacteriostatica.