

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Este catálogo reúne los péptidos que Peptigene maneja, organizados por categoría y objetivo. Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y —de forma destacada— sus contraindicaciones y los criterios de aptitud, para que dispongas de información clara y completa antes de conversarla con un profesional de la salud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

Categorías incluidas en este catálogo

- **Pérdida de peso y control metabólico** — Semaglutida, Tirzepatida, Retatrutida, Cagrilintida, Liraglutida, Survodutida, MOTS-c, AOD-9604
- **Hormona de crecimiento y recomposición corporal** — Sermorelina, Tesamorelina, CJC-1295, Ipamorelina, GHRP-2, GHRP-6, Hexarelina
- **Reparación, recuperación y tejidos** — BPC-157, TB-500, KPV, ARA-290 (Cibinetida)
- **Antienvejecimiento y longevidad** — NAD⁺, Epitalón, SS-31 (Elamipretida), Humanina, FOXO4-DRI
- **Sistema inmune** — Timosina Alfa-1, Timalina, LL-37
- **Salud hormonal y sexual** — Kisspeptina, PT-141 (Bremelanotida), Melanotan II, Gonadorelina, Oxitocina
- **Función cognitiva y neuroprotección** — Semax, Selank, Dihexa, Cerebrolisina, Pinealon
- **Piel y estética** — GHK-Cu, Melanotan I (Afamelanotida)

PÉRDIDA DE PESO Y CONTROL METABÓLICO · Agonistas de incretinas, amilina y péptidos metabólicos

Semaglutida · Agonista GLP-1 · semanal

Qué es. Análogo del GLP-1 de aplicación semanal; molécula base de las terapias de pérdida de peso más usadas.

Cómo funciona. Potencia la insulina dependiente de glucosa, suprime el glucagón, ralentiza el vaciado gástrico y reduce el apetito a nivel hipotalámico.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~15% del peso corporal.
- Mejor control glucémico (HbA1c).
- Beneficio cardiovascular y mejora de presión y lípidos.

Dosis habitual	0.25 → 1.0–2.4 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno 12–16 sem
Dosis mínima	0.25 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo y lactancia; precaución digestiva.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2, previa valoración médica.

Tirzepatida · Doble agonista GIP/GLP-1 · semanal

Qué es. Doble agonista de los receptores GIP y GLP-1, con uno de los perfiles de eficacia más altos disponibles.

Cómo funciona. Activa a la vez GIP y GLP-1, con efecto sinérgico sobre saciedad, sensibilidad a la insulina y metabolismo de grasas.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~20–22% del peso corporal.
- Control glucémico potente.
- Mejora de lípidos y presión arterial.

Dosis habitual	2.5 → 5–15 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno ≥ 12 sem
Dosis mínima	2.5 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad o diabetes tipo 2 bajo control médico.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Retatrutida · Triple agonista GIP/GLP-1/glucagón · en fase 3

Qué es. Triple agonista (GIP, GLP-1 y receptor de glucagón) en investigación clínica avanzada; aún no aprobado.

Cómo funciona. Suma la activación del receptor de glucagón —que eleva el gasto energético y la oxidación de grasa— a los efectos GIP/GLP-1.

Beneficios

- La mayor pérdida de peso reportada (~24% a 48 sem, fase 2).
- Fuerte mejora metabólica global.
- Reducción de grasa hepática y visceral.

Dosis habitual	Escalada hasta 8–12 mg/sem (ensayos)	Duración sugerida	En estudio; 48+ sem
Dosis mínima	1–2 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Mismo perfil que los GLP-1; al ser experimental, únicamente en contexto clínico.

¿Es apto para el tratamiento? Compuesto no aprobado; sólo bajo protocolo médico.

Cagrilintida · Análogo de amilina de larga acción · semanal

Qué es. Análogo de la amilina que potencia a los GLP-1 al combinarse (CagriSema / IcoSema).

Cómo funciona. Agonista de los receptores de amilina en el área postrema; reduce el apetito por una vía complementaria a la del GLP-1.

Beneficios

- Hasta ~10.8% de pérdida de peso en monoterapia.
- Hasta ~25.2% combinada con semaglutida.
- Control del hambre por mecanismo aditivo.

Dosis habitual	0.3 → 2.4 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; escalada de 12+ sem
Dosis mínima	0.3 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución digestiva. Evitar combinaciones sin control médico.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad, sola o combinada con un GLP-1, bajo supervisión.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Liraglutida · Agonista GLP-1 · diario

Qué es. Análogo del GLP-1 de aplicación diaria, predecesor de la semaglutida.

Cómo funciona. Mismo mecanismo incretina que la semaglutida, con una vida media más corta que exige dosis diaria.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~5–8%.
- Control glucémico en diabetes tipo 2.
- Reducción del apetito.

Dosis habitual	0.6 → 3.0 mg/día	Duración sugerida	Crónico; diario
Dosis mínima	0.6 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con sobrepeso u obesidad; alternativa diaria a la semaglutida.

Survodutida · Doble agonista GLP-1/glucagón · en investigación

Qué es. Doble agonista de GLP-1 y receptor de glucagón, en desarrollo clínico para obesidad y esteatohepatitis.

Cómo funciona. Combina la saciedad del GLP-1 con el aumento del gasto energético del glucagón.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~19% en fase 2.
- Reducción de grasa hepática (MASH).
- Mejora metabólica.

Dosis habitual	Escalada semanal (ensayos)	Duración sugerida	En estudio
Dosis mínima	Dosis inicial baja	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Perfil de incretinas; experimental, sólo en contexto clínico.

¿Es apto para el tratamiento? No aprobado; en evaluación clínica.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

MOTS-c · Péptido mitocondrial · metabolismo

Qué es. Péptido derivado de la mitocondria que actúa como regulador metabólico y 'mimético del ejercicio'.

Cómo funciona. Activa la vía AMPK, mejora la sensibilidad a la insulina y el uso de glucosa y grasa como energía.

Beneficios

- Apoya la sensibilidad a la insulina.
- Favorece la resistencia y el rendimiento.
- Efecto metabólico tipo ejercicio.

Dosis habitual	5–10 mg, 2–3 veces/sem	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 sem
Dosis mínima	5 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Datos clínicos limitados; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos activos con enfoque metabólico; experimental.

AOD-9604 · Fragmento de GH · pérdida de grasa

Qué es. Fragmento modificado de la hormona de crecimiento (176-191) orientado a la lipólisis.

Cómo funciona. Estimula la degradación de grasa sin los efectos de la GH sobre glucosa o crecimiento.

Beneficios

- Favorece la pérdida de grasa localizada.
- No afecta la glucemia ni el IGF-1.
- Buen perfil de tolerancia.

Dosis habitual	300 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	300 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Evidencia clínica limitada; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en pérdida de grasa; experimental.

HORMONA DE CRECIMIENTO Y RECOMPOSICIÓN CORPORAL · Secretagogos y análogos de GHRH/ghrelina

Sermorelina · Análogo de GHRH

Qué es. Análogo corto de la hormona liberadora de GH, usado para estimular la producción propia de GH.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis a liberar GH de forma pulsátil y fisiológica, elevando el IGF-1.

Beneficios

- Mejora la recuperación y el sueño.
- Apoya la composición corporal.
- Estímulo fisiológico del eje GH.

Dosis habitual	200–500 mcg/día (noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea, nocturna

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con signos de baja GH, previa valoración.

Tesamorelina · Análogo de GHRH · grasa visceral

Qué es. Análogo de GHRH con uso clínico aprobado para reducir grasa visceral.

Cómo funciona. Induce la liberación pulsátil de GH y la elevación del IGF-1.

Beneficios

- Reducción notable de grasa visceral.
- Apoya la recomposición corporal.
- Posible mejora cognitiva y lipídica.

Dosis habitual	1–2 mg/día (noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con exceso de grasa visceral, previa valoración.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

CJC-1295 · Análogo de GHRH · sinergia con ipamorelina

Qué es. Análogo de GHRH de acción prolongada, combinado con ipamorelina para potenciar el eje GH.

Cómo funciona. Eleva de forma sostenida GH e IGF-1; la variante con DAC prolonga la vida media a días.

Beneficios

- Mayor síntesis proteica y recuperación.
- Apoya la pérdida de grasa.
- Mejora del sueño y la piel.

Dosis habitual	100 mcg con ipamorelina; DAC 1–2 mg/sem	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos, junto a ipamorelina, bajo supervisión.

Ipamorelina · Secretagogo de GH selectivo

Qué es. Pentapéptido secretagogo de GH selectivo y bien tolerado (agonista de ghrelina).

Cómo funciona. Libera GH de forma pulsátil sin elevar de forma significativa cortisol ni prolactina.

Beneficios

- Mejor recuperación y sueño profundo.
- Apoya la recomposición y la piel.
- Sin gran estímulo del apetito.

Dosis habitual	200–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos enfocados en recuperación y composición corporal.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

GHRP-2 · Secretagogo de GH · péptido liberador

Qué es. Péptido liberador de GH potente que también estimula ligeramente el apetito.

Cómo funciona. Agonista del receptor de ghrelina; provoca una fuerte descarga pulsátil de GH.

Beneficios

- Aumento marcado de la GH.
- Apoya masa magra y recuperación.
- Ligeró estímulo del apetito.

Dosis habitual	100–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; puede elevar cortisol/prolactina a dosis altas.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos; combinar con GHRH bajo supervisión.

GHRP-6 · Secretagogo de GH · estímulo del apetito

Qué es. Péptido liberador de GH con marcado efecto orexígeno (aumenta el hambre).

Cómo funciona. Agonista de ghrelina que libera GH y estimula fuertemente el apetito.

Beneficios

- Aumento de GH y recuperación.
- Fuerte estímulo del apetito (útil para ganar peso).
- Apoyo a la reparación de tejidos.

Dosis habitual	100–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; el apetito puede ser indeseado en pérdida de peso.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos que buscan ganar masa o apetito, bajo supervisión.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Hexarelina · Secretagogo de GH · potente

Qué es. Uno de los secretagogos de GH más potentes; requiere manejo por su desensibilización.

Cómo funciona. Agonista de ghrelina con fuerte liberación de GH; puede perder efecto con uso continuo.

Beneficios

- Descarga potente de GH.
- Apoya fuerza y recuperación.
- Efecto rápido.

Dosis habitual	100 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos cortos (desensibiliza)
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; puede elevar cortisol/prolactina.

¿Es apto para el tratamiento? Usuarios avanzados, ciclos cortos y supervisados.

REPARACIÓN, RECUPERACIÓN Y TEJIDOS · Curación, articulaciones e inflamación

BPC-157 · Péptido de reparación · recuperación

Qué es. Péptido de origen gástrico muy usado para recuperación de tejidos; evidencia principalmente preclínica.

Cómo funciona. Favorece la angiogénesis y la reparación de tendones, ligamentos, músculo y mucosa digestiva.

Beneficios

- Acelera la recuperación de lesiones.
- Apoya la salud digestiva e intestinal.
- Efecto antiinflamatorio local.

Dosis habitual	250–500 mcg, 1–2 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 2–6 sem
Dosis mínima	250 mcg/día	Vía	Subcutánea (local/sistémica)

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo por falta de datos; evidencia clínica limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en recuperación o rehabilitación, con criterio médico.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

TB-500 · Fragmento de timosina $\beta 4$ · reparación

Qué es. Fragmento sintético de la timosina beta-4 orientado a reparación y flexibilidad de tejidos.

Cómo funciona. Regula la actina y promueve migración celular, angiogénesis y reducción de adherencias.

Beneficios

- Recuperación muscular y articular.
- Mejora de flexibilidad y rango de movimiento.
- Efecto sistémico de reparación.

Dosis habitual	2–2.5 mg, 2 veces/sem (carga)	Duración sugerida	Carga 4–6 sem + mantenimiento
Dosis mínima	2 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; datos clínicos limitados.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con lesiones o alto desgaste físico, bajo supervisión.

KPV · Tripéptido antiinflamatorio · intestino

Qué es. Fragmento del alfa-MSH con potente acción antiinflamatoria, especialmente digestiva.

Cómo funciona. Modula la inflamación a nivel celular (NF- κ B) sin efecto pigmentante.

Beneficios

- Reduce la inflamación intestinal.
- Apoyo en trastornos digestivos y cutáneos.
- Buen perfil de tolerancia.

Dosis habitual	200–500 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 sem
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea u oral

Contraindicaciones. Datos clínicos limitados; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inflamación digestiva o cutánea, con criterio médico.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

ARA-290 (Cibinetida) · Péptido derivado de EPO · dolor neuropático

Qué es. Péptido derivado de la eritropoyetina, sin efecto sobre la sangre, con acción antiinflamatoria y neuroreparadora.

Cómo funciona. Activa el receptor innato de reparación tisular, reduciendo la inflamación y el dolor neuropático.

Beneficios

- Reduce el dolor neuropático.
- Efecto antiinflamatorio y de reparación nerviosa.
- No estimula la producción de glóbulos rojos.

Dosis habitual	1–4 mg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–12 sem
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Datos clínicos en investigación; evitar en embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con dolor neuropático o neuroinflamación, bajo supervisión.

ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD · Función celular, mitocondrias y telómeros

NAD+ · Coenzima celular · energía y reparación

Qué es. Coenzima esencial de todas las células cuyos niveles descienden con la edad.

Cómo funciona. Cofactor de la producción de energía (ATP); activa sirtuinas y enzimas PARP de reparación del ADN.

Beneficios

- Más energía y claridad mental.
- Apoyo a la función mitocondrial.
- Mejor recuperación celular.

Dosis habitual	50–100 mg SC; IV 250–500 mg	Duración sugerida	Ciclos: carga y mantenimiento
Dosis mínima	50 mg	Vía	Subcutánea o intravenosa

Contraindicaciones. Sin datos en embarazo/lactancia; la vía IV debe ser lenta.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos con enfoque energético y de longevidad.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Epitalón · Tetrapéptido pineal · longevidad

Qué es. Péptido derivado de la epitalamina pineal, orientado a longevidad; datos mayormente preclínicos.

Cómo funciona. Estimula la telomerasa (mantenimiento de telómeros) y normaliza la producción de melatonina.

Beneficios

- Apoyo a la longevidad celular.
- Mejora del sueño.
- Efecto antioxidante y circadiano.

Dosis habitual	5–10 mg/día en ciclos de 10–20 días	Duración sugerida	Ciclos, 1–2 veces/año
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Embarazo, lactancia y cáncer activo; evidencia limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en longevidad; carácter experimental.

SS-31 (Elamipretida) · Péptido mitocondrial · cardiolipina

Qué es. Péptido que se dirige a la membrana mitocondrial interna; en investigación clínica para enfermedades mitocondriales.

Cómo funciona. Estabiliza la cardiolipina y optimiza la producción de energía, reduciendo el estrés oxidativo.

Beneficios

- Mejora la función mitocondrial.
- Reduce el estrés oxidativo.
- Apoyo a energía y recuperación.

Dosis habitual	5–40 mg/día	Duración sugerida	Ciclos según objetivo
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Experimental; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con fatiga o enfoque mitocondrial; en investigación.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Humanina · Péptido mitocondrial · citoprotección

Qué es. Péptido derivado de la mitocondria con propiedades citoprotectoras y de longevidad.

Cómo funciona. Protege a las células del estrés y la apoptosis y modula el metabolismo.

Beneficios

- Citoprotección frente al estrés.
- Apoyo metabólico y neuroprotector.
- Interés en longevidad.

Dosis habitual	No estandarizada en humanos	Duración sugerida	Experimental
Dosis mínima	No estandarizada	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Sin protocolos humanos establecidos; estrictamente experimental.

¿Es apto para el tratamiento? Uso en investigación; no apto como tratamiento general.

FOXO4-DRI · Péptido senolítico · células senescentes

Qué es. Péptido senolítico diseñado para eliminar células senescentes ('zombis'); investigación preclínica.

Cómo funciona. Interrumpe la interacción FOXO4-p53, induciendo la muerte selectiva de células senescentes.

Beneficios

- Interés en eliminar células senescentes.
- Posible efecto rejuvenecedor tisular.
- Área de longevidad de vanguardia.

Dosis habitual	No estandarizada en humanos	Duración sugerida	Experimental
Dosis mínima	No estandarizada	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Sin dosis humana establecida; datos sólo preclínicos. Máxima cautela.

¿Es apto para el tratamiento? Estrictamente experimental; no es un tratamiento validado.

SISTEMA INMUNE · Modulación y defensa

Timosina Alfa-1 · Péptido tímico · inmunomodulador

Qué es. Péptido del timo con uso clínico aprobado en varios países como inmunomodulador.

Cómo funciona. Estimula la maduración de linfocitos T y equilibra la respuesta inmune.

Beneficios

- Refuerza la respuesta inmune.
- Apoyo frente a infecciones crónicas.
- Modulación de la inflamación.

Dosis habitual	1.6 mg, 2 veces/sem	Duración sugerida	Ciclos de 4–12 sem
Dosis mínima	1.6 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Trasplantados o inmunosupresión dirigida; embarazo con cautela.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inmunidad debilitada, previa valoración médica.

Timalina · Extracto peptídico tímico · inmunidad

Qué es. Complejo de péptidos tímicos usado como bioregulador inmune y de longevidad.

Cómo funciona. Normaliza el número y función de linfocitos T y B y regula la inmunidad.

Beneficios

- Equilibra la función inmune.
- Apoyo en recuperación y envejecimiento.
- Regulación de la inflamación.

Dosis habitual	5–10 mg/día en ciclos	Duración sugerida	Ciclos de 5–10 días
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea o intramuscular

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; evidencia clínica variable.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inmunidad baja o enfoque de longevidad, con criterio médico.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

LL-37 · Péptido antimicrobiano · cathelicidina

Qué es. Péptido antimicrobiano natural del sistema inmune innato; uso en investigación.

Cómo funciona. Destruye microorganismos y modula la inflamación y la reparación de heridas.

Beneficios

- Acción antimicrobiana de amplio espectro.
- Apoyo a la cicatrización.
- Modulación inmune.

Dosis habitual	No estandarizada en humanos	Duración sugerida	Experimental
Dosis mínima	No estandarizada	Vía	Subcutánea o tópica

Contraindicaciones. Sin protocolo humano estandarizado; puede ser proinflamatorio en exceso.

¿Es apto para el tratamiento? Uso en investigación; requiere criterio experto.

SALUD HORMONAL Y SEXUAL · Eje reproductivo, deseo y bronceado

Kisspeptina · Regulador del eje reproductivo

Qué es. Neuropéptido que regula el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas en su origen.

Cómo funciona. Activa el receptor KISS1R en las neuronas GnRH, liberando GnRH y, en cadena, LH y FSH.

Beneficios

- Estimula la testosterona endógena.
- Apoya la fertilidad y la función gonadal.
- Mejora la libido de forma fisiológica.

Dosis habitual	50–100 mcg, 1–2 veces/día	Duración sugerida	Ciclos; vida media corta
Dosis mínima	50 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en fertilidad o salud hormonal, con valoración endocrina.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

PT-141 (Bremelanotida) · Agonista de melanocortina · deseo sexual

Qué es. Agonista de melanocortina con uso aprobado para el deseo sexual hipoactivo; actúa en el SNC.

Cómo funciona. Activa el receptor MC4R cerebral, aumentando la excitación y el deseo en ambos sexos.

Beneficios

- Aumento del deseo y la excitación.
- Útil en disfunción eréctil resistente a PDE5.
- Efecto central, no vascular.

Dosis habitual	0.5–2 mg, 45 min–2 h antes	Duración sugerida	Uso puntual
Dosis mínima	0.5 mg (máx ~8/mes)	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Hipertensión no controlada y enfermedad cardiovascular; puede subir la presión.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con bajo deseo o disfunción sexual y presión controlada.

Melanotan II · Agonista de melanocortina · bronceado y libido

Qué es. Análogo de melanocortina que estimula la pigmentación y también el deseo sexual.

Cómo funciona. Activa receptores de melanocortina (MC1R/MC4R): induce melanina, reduce apetito y aumenta la libido.

Beneficios

- Bronceado con menor exposición solar.
- Aumento de la libido.
- Ligera reducción del apetito.

Dosis habitual	0.25–1 mg/día (carga y mantenimiento)	Duración sugerida	Carga breve + mantenimiento
Dosis mínima	0.25 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Lunares atípicos o antecedente de melanoma; vigilar la piel. Náusea y oscurecimiento de lunares.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos con control dermatológico; no apto con lesiones cutáneas sospechosas.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Gonadorelina · GnRH · fertilidad y eje hormonal

Qué es. Forma sintética de la GnRH, usada para estimular el eje hormonal y en protocolos de fertilidad.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis a liberar LH y FSH mediante pulsos, activando la función gonadal.

Beneficios

- Estimula LH/FSH y testosterona.
- Apoya la fertilidad.
- Útil para mantener función gonadal en terapias hormonales.

Dosis habitual	Microdosis pulsátiles (100 mcg)	Duración sugerida	Según objetivo
Dosis mínima	Según protocolo	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en manejo de fertilidad o eje hormonal, con valoración endocrina.

Oxitocina · Neuropeptido · vínculo y bienestar

Qué es. Hormona y neuropeptido asociado al vínculo social, la confianza y el bienestar.

Cómo funciona. Actúa en circuitos cerebrales de recompensa y apego, modulando el estado emocional.

Beneficios

- Favorece el vínculo y la confianza.
- Reduce el estrés social.
- Apoyo al bienestar emocional.

Dosis habitual	Intranasal 10–40 UI	Duración sugerida	Uso puntual
Dosis mínima	10 UI	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo (efecto uterino); precaución cardiovascular.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos; evitar en embarazo salvo indicación clínica.

FUNCIÓN COGNITIVA Y NEUROPROTECCIÓN · Enfoque, ánimo, memoria y resiliencia

Semax · Heptapéptido nootrópico · neuroprotección

Qué es. Péptido derivado de un fragmento de la ACTH, usado como nootrópico y neuroprotector.

Cómo funciona. Aumenta los factores neurotróficos BDNF y NGF y modula dopamina y serotonina.

Beneficios

- Mejora enfoque, memoria y claridad.
- Apoyo a la recuperación neurológica.
- Mayor resistencia al estrés cognitivo.

Dosis habitual	300–600 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 10–14 días
Dosis mínima	300 mcg/día	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución en trastornos psiquiátricos.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos que buscan apoyo cognitivo puntual, revisando interacciones.

Selank · Heptapéptido ansiolítico

Qué es. Péptido análogo de la tuftsina con efecto ansiolítico sin sedación ni dependencia.

Cómo funciona. Modula GABA y serotonina, equilibra citoquinas y eleva el BDNF.

Beneficios

- Reduce la ansiedad sin somnolencia.
- Estabiliza el ánimo y el estrés.
- Apoyo al enfoque y al sueño.

Dosis habitual	250–500 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 10–14 días
Dosis mínima	250 mcg/día	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución con medicación psiquiátrica.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con estrés o ansiedad leve; valorar si hay tratamiento en curso.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Dihexa · Nootrópico potente · sinaptogénesis

Qué es. Péptido derivado de la angiotensina IV, uno de los nootrópicos más potentes en investigación.

Cómo funciona. Potencia la vía HGF/c-Met, favoreciendo la formación de nuevas conexiones sinápticas.

Beneficios

- Fuerte apoyo a memoria y aprendizaje.
- Favorece la sinaptogénesis.
- Interés en deterioro cognitivo.

Dosis habitual	No estandarizada (mcg–mg, experimental)	Duración sugerida	Ciclos cortos
Dosis mínima	Dosis baja	Vía	Oral o subcutánea

Contraindicaciones. Experimental; el estímulo de crecimiento obliga a cautela (evitar en cáncer).

¿Es apto para el tratamiento? Uso en investigación; sólo con criterio experto.

Cerebrolisina · Mezcla neuropeptídica · neurotrófica

Qué es. Preparado de péptidos y aminoácidos de origen cerebral, usado clínicamente para ictus y demencia en varios países.

Cómo funciona. Aporta factores neurotróficos que protegen y reparan las neuronas.

Beneficios

- Apoyo en recuperación tras ictus.
- Beneficio en deterioro cognitivo y demencia.
- Neuroprotección.

Dosis habitual	5–10 mL/día en ciclos	Duración sugerida	Ciclos de 10–20 días
Dosis mínima	5 mL/día	Vía	Intramuscular o intravenosa

Contraindicaciones. Epilepsia y disfunción renal grave; embarazo con cautela.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con indicación neurológica, bajo prescripción.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Pinealon · Bioregulador peptídico · cognición

Qué es. Péptido corto bioregulador dirigido al tejido cerebral, en la línea de la longevidad rusa.

Cómo funciona. Regula la síntesis proteica neuronal, con efecto neuroprotector y antioxidante.

Beneficios

- Apoyo a la memoria y la concentración.
- Neuroprotección frente al estrés.
- Regulación del ritmo y el sueño.

Dosis habitual	100–200 mcg/día en ciclos	Duración sugerida	Ciclos de 10 días
Dosis mínima	100 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; evidencia mayormente preclínica.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque cognitivo o de longevidad, con criterio médico.

PIEL Y ESTÉTICA · Regeneración dérmica y fotoprotección

GHK-Cu · Péptido de cobre · piel y regeneración

Qué es. Tripéptido-cobre natural, usado por vía tópica e inyectable para piel y regeneración.

Cómo funciona. Estimula colágeno y elastina, remodela la matriz extracelular y aporta acción antioxidante y cicatrizante.

Beneficios

- Piel más firme y menos arrugas.
- Mejora de cicatrización y cabello.
- Apoyo a la recuperación de tejidos.

Dosis habitual	Tópico 1–2%; SC 1–2 mg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 sem
Dosis mínima	1 mg/día (o tópico)	Vía	Tópica o subcutánea

Contraindicaciones. No sobre heridas infectadas; trastornos del cobre; embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque dérmico y regenerativo; no apto con alergia al cobre.

PEPTIGENE

Catálogo de péptidos · Categorías, objetivos y beneficios

Melanotan I (Afamelanotida) · Agonista MC1R · bronceado y fotoprotección

Qué es. Análogo de melanocortina selectivo para pigmentación, con forma aprobada para fotoprotección (EPP).

Cómo funciona. Activa el receptor MC1R aumentando la melanina, con perfil más selectivo que el Melanotan II.

Beneficios

- Bronceado y fotoprotección.
- Menos efectos secundarios que el Melanotan II.
- Protección frente a fototoxicidad.

Dosis habitual	Implante clínico o SC según protocolo	Duración sugerida	Ciclos estacionales
Dosis mínima	Según protocolo	Vía	Subcutánea o implante

Contraindicaciones. Lunares atípicos o antecedente de melanoma; vigilancia dermatológica.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con control dermatológico; no apto con lesiones cutáneas sospechosas.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**