


La **pharmaco** Anti inflammatoire



Introduction

Réaction inflammatoire

La réaction inflammatoire est due à une cause traumatique ou infectieuse, c'est un signal de **danger** ! qui permet de déclencher l'inflammation

Plusieurs étapes :

- Déclenchements inflammatoires
- **1 - phase d'initiation** : dilatation vasculaire
- **2 - phase d'amplification** : afflux cellulaire
- **3 - phase de résolution** : réparation tissulaire

Clinique : **rougeur** / **chaleur** / **douleur** / **œdème**


Biologique : augmentation de la CRP (marqueur de l'inflammation)



Cellulaire

Dommages cellulaires

Cascade de réaction enzymatique



Prostaglandines / Leucotriènes / Thromboxanes sont des médiateurs de la réaction inflammatoire

Ce sont eux qui provoquent les rougeur, chaleur, douleur, fièvre, etc...



Corticoïde


Les corticoïdes (ALS) agissent au niveau du **noyau** des cellules en régulant la transcription des médiateurs de l'inflammation, ce qui permet de diminuer les **signes cliniques**

Effets :

anti inflammatoires / anti allergiques / immunosuppresseurs

Indications :

réaction inflammatoire / allergique sévère (choc septique, péricardite, Covid-19), transplantation d'organes, maladie inflammatoire chronique (psoriasis, polyarthrite rhumatoïde), neurologie (sclérose en plaques), oncologie, asthme...



Corticoïde

Effets sur le métabolisme :

- Équilibre hydro-électrolytique : rétention hydro-sodée avec prise de poids, hypokaliémie, HTA
- Effets centraux : troubles de l'humeur, euphori, insomnie
- Ulcérogènes : ↪ de la synthèse du mucus protecteur de la muqueuse gastrique
- Éléments figurés du sang : ↪ des macrophages, diminution de l'activité anti-infectieuse

Schéma thérapeutique :



Surveillance particulière :

Dès que le traitement > 1 mois

- Régime hyposodé
- Surveillance de la TA
- Apports en K⁺ et Calcium / vitamine D
- Masse musculaire : alimentation riche en protéines
- Glycémie / Hb1Ac
- Risque d'ulcère : protecteur gastrique (GAVISCON®)
- Mise à jour des vaccinations



Corticoïde

Effets indésirables :

Cardiovasculaire :

Rétention hydrosodée, œdèmes, hypertension, hypokaliémie

Endocrinien :

Hyperglycémie, diabète, insuffisance cortico-surrénalienne secondaire

Immunitaire :

Susceptibilité augmentée aux infections

Musculo-Squelettique :

Ostéoporose, nécrose osseuse, myopathie

Peau :

Hirsutisme, atrophie cutanée avec ecchymose

Gastro-intestinale :

Risque augmenté d'ulcère

Psychiatrique :

Psychose, troubles de l'humeur, dépression



AINS


Les anti inflammatoires non stéroïdiens vont venir inhiber l'enzyme **COX**
Il en existe 2 formes **COX I** / **COX II**

COX I:

- Constitutive elle a un rôle physiologique elle induit la synthèse des prostaglandines
- Qui permet une cytoprotection au niveau de l'estomac, le maintien du flux rénal ainsi que l'agrégation plaquettaire dans le sang
- Son inhibition par les AINS induit donc les effets indésirables des AINS

COX II:

- Inductible, en cas d'inflammation permet la synthèse des prostaglandines intervenant dans la réaction inflammatoire
- Son inhibition permet de donner les effets des AINS



AINS

Effets :

anti inflammatoires / anti pyrétique / analgésiques / antiagrégants plaquettaires (effet recherché dans certaines indications cardio/neuro)

Indications :

TTT Court :

- Arthrite
- Tendinites
- Lombalgies
- Périarthrite

TTT Long :

- Rhumatismes inflammatoires chroniques
- Arthroses douloureuses et invalidantes
- Polyarthrite rhumatoïde
- Maladies inflammatoires intestinales

Effets indésirables :

Les AINS peuvent être responsables de maux de tête ou de vertiges, d'effets indésirables digestifs plus ou moins graves (nausées, douleurs ou brûlures d'estomac, ulcère ou hémorragie du tube digestif), de réactions allergiques (éruption cutanée, asthme) et d'insuffisance rénale dans certaines circonstances rares



Précaution

Corticoïdes / AINS

Quelques points annexe à retenir :

- **Ne pas associer corticoïdes et AINS**
- **Prendre les corticoïdes le matin, il stimule et peut empêcher de dormir**
- **Prise pendant le repas pour protéger l'estomac**

