


Vaccination



@CESIREVISE

Introduction

La vaccination est une immunisation active.

Le but → apprendre à l'organisme à se défendre lors d'une exposition ultérieure à un agent infectieux, en lui présentant un ou plusieurs composants de l'agent infectieux afin qu'il développe une immunité protectrice.

Il existe 2 types de vaccins :

- **Vaccins vivants atténués**
- **Vaccins inactivés ou inertes**



@CESIREVISE

Types

Vaccins vivants atténués

On injecte l'agent infectieux vivant, il est encore capable de se multiplier mais ne provoque pas de signes graves.

Exemples : Rougeole-oreillons-rubéole (ROR), fièvre jaune, contre la tuberculose (BCG)

NB : Ces vaccins sont contre-indiqués chez les patients immunodéprimés (pouvant développer des maladies graves malgré une faible virulence).



Types

Vaccins inactivés ou inertes

On injecte des particules inertes : soit un ou plusieurs composants de l'agent infectieux, soit l'agent infectieux entier préalablement inactivé.

Exemples : hépatite B, tétanos, coqueluche

Inconvénients : Ces particules disparaissent, ce qui implique des schémas vaccinaux plus compliqués (plusieurs injections et parfois des rappels).



@CESIREVISE

Lesquels ?

Depuis 2023, 12 vaccins sont **obligatoires** :

- Coqueluche
- Hépatite B
- Pneumocoque
- Haemophilus influenzae de type B
- Meningocoque de séro groupe B
- Menincoque de séro groupe ACWY
- Rougeole
- Oreillons
- Rubéole
- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite

D'autres vaccins sont **recommandés**, par exemple :

- Papillomavirus (HPV) : pour ♂ & ♀ entre 11 et 14 ans
- Grippe et COVID-19 : annuellement pour les 65 ans et + et les personnes à risque de forme grave
- Zona : pour les immunocompétents de 65 ans et +




@CESIREVISE

Pourquoi ?

La vaccination permet :

- **de se protéger** contre les complications et de limiter le risque de forme grave
- **de protéger les autres** en limitant la circulation de l'agent infectieux et en protégeant les individus ne pouvant pas recevoir de vaccin : personnes immunodéprimées, nourrissons ou personnes allergiques à certains composants vaccinaux.



@CESIREVISE