


La **pharmaco** Antalgiques



@CESIREVISE

Introduction

Un antalgique aussi appelé analgésique ou anti-douleur,
est une substance qui **supprime** ou **atténue** la douleur
Elle a une action **périphérique** et / ou **centrale**

Traitements symptomatiques

action à partir de **30** à **60** min en per os



Le choix du traitement est orienté par le type de douleur et ses
conséquences



@CESIREVISE

Vigilance

Il y a des points de **vigilances** et des **actions** importantes à mettre en place :

- **Evaluation** de la douleur (avant et après minimum)
- **Tracer** la douleur même si elle est de 0
- Si douleur persistante, **prévenir** le médecin
- Echelle de décision thérapeutique en 3 paliers (OMS)



@CESIREVISE

Paliers OMS

Palier I

**Antalgiques non
opioïdes**

- **voie orale de
1ère intention**

Palier II

Opioïdes faibles

- **action sur les 3
types de
douleurs**
- **phénomène de
tolérance et de
dépendance**
- **attention aux EI**

Palier III

Opioïdes forts

- **ils sont classés
parmi les
stupéfiants**
- **prescrit en cas de
douleurs très
intenses**
- **attention aux EI**



Palier I

Ils sont utilisés dans le cadre des douleurs **faibles** à **modérées**

Ils peuvent peut être **associés** avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens **AINS**

antalgiques non opioïdes
voie orale de 1ère intention



exemple : paracétamol




@CESIREVISE

Palier II

Ils sont administrés en cas des douleurs **modérées** à **fortes** ou lorsque les antidouleurs de palier I ne sont pas suffisamment efficaces

opioïdes faibles
action sur les 3 types de douleurs
phénomène de tolérance et de dépendance
attention aux EI



exemple : tramadol / codéine



@CESIREVISE


Palier III

Egalement appelés morphiniques ou opioïdes, ils sont employés en cas de **douleurs fortes** à très **intenses**.

Ils peuvent être **associés** aux **antalgiques de palier I** et sont considérés comme des stupéfiants

opioïdes forts

**Ils sont classés parmi les stupéfiants
prescrit en cas de douleurs très intenses
attention aux EI**



exemple : morphine / oxycodone / fentanyl / buprénorphine



@CESIREVISE

Divers

Stratégie antalgique :

- **Palier I** + **Palier II**
- **Palier I** + **Palier III**

Mais pas d'association palier II + III

Savoir différencier effets **indésirables (constipation, nausées, etc...) des **surdosages** (sédation, dépression respiratoire)**

ANTIDOTE DES OPIOÏDES = **Naloxone (antagonistes morphiniques)**

