


La **pharmaco** Anticoagulants



@CESIREVISE

Titre

"explication"



@CESIREVISE

Introduction

Hémostase

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes destinés à limiter les pertes sanguines

elle présente 3 phases :

- **l'hémostase primaire** (clou plaquettaire)
- **la coagulation plasmatique** (formation réseau de fibrine)
- **fibrinolyse**

Les antiagrégants plaquettaires (AAP) sont des médicaments de l'hémostase primaire et les AVK, les anticoagulants oraux, les héparines non fractionnées (HNF) et les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont des inhibiteurs de la coagulation



AAP

- **Mécanisme d'action :**

Les antiagrégants plaquettaires empêchent l'agrégation des plaquettes (thrombocytes) entre elles pendant l'hémostase et donc la formation de caillots et de thromboses dans les vaisseaux

- **Indication :**

Prévention athérosclérose / infarctus du myocarde / AVC / AOMI

- **Surveillance :**

Ne requièrent pas de surveillance biologique

- **Exemple :**

Kardegic



AVK

- **Mécanisme d'action :**

Les anti-vitamine K inhibent la synthèse des facteurs de coagulation qui utilisent de la vitamine K (facteurs II / VII / IX / X)

- **Indication :**

Les fibrillations auriculaires et autres cardiopathies emboligène, thrombose veineuse profonde (TVP), embolie pulmonaire

- **Surveillance :**

Nécessite un suivi INR régulier

INR cible entre 2-3 et la norme est = 1

A l'instauration 1er INR après 3 prises puis tous les 2-4 J et jusqu'à l'équilibre

- **Exemple :**

Coumadine

Antidote = vitamine K



@CESIREVISE

AOD

- **Mécanisme d'action :**

Les anticoagulants oraux directs agissent en inhibant les facteurs de coagulation IIa/ Xa

Ils ont la particularité d'avoir un délai d'action rapide (2-3heures)

- **Indication :**

Prévention AVC, de l'embolie chez les patients atteints de fibrillation auriculaire et de TVP

- **Surveillance :**

Ne requièrent pas de surveillance biologique

- **Exemple :**

Xarelto



HNF

- **Mécanisme d'action :**

L'héparine non fractionnée est une substance naturelle qui neutralise les facteurs IIa / Xa

- **Indication :**

Maladie thromboembolique veineuse, syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, angor, TVP

- **Surveillance :**

Surveillance de l'Anti Xa avec un objectif de 0,3-0,7 Ui/mL

- **Exemple :**

Calciparine

Antidote = Protamine



@CESIREVISE

HBPM

- **Mécanisme d'action :**

Les héparines de bas poids moléculaire sont des fractions d'héparines : cela permet d'avoir une action prolongée par rapport à l'HNF

Les HBPM inhibent le facteur de coagulation Xa

- **Indication :**

Maladie thromboembolique veineuse, syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, angor, TVP

- **Surveillance :**

Pas d'intérêt suivi AntiXa HBPM pour ajuster les doses

- **Exemple :**

Lovenox / Innohep

Antidote = Protamine




@CESIREVISE

Injection

Il est important de changer de site à chaque nouvelle injection, par exemple alterner entre la cuisse droite et la cuisse gauche, et ne pas injecter sur une ecchymose

**Flanc
abdominale**

Cuisses



@CESIREVISE