


Embolie pulmonaire & thrombose veineuse





Introduction

Embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire est l'**obstruction d'une artère pulmonaire** ou de l'une de ses branches, en général par un **caillot de sang** qui peut provenir d'une thrombose veineuse profonde

Elle provoque des dommages au niveau du poumon atteint et la partie lésée ne peut plus fournir d'**oxygène** à l'organisme




Signes cliniques

Embolie pulmonaire

- **Dyspnée d'apparition brutale**
- **Douleur thoracique**
- **Polypnée**
- **Forte angoisse**
- **Cyanose**
- **Tachycardie**
- **+/- Toux sèche**
- **+/- Hémoptysie (le patient crache du sang)**
- **Si embolie grave et massive : syncope / état de choc**

Analyse sanguine

Gaz du sang : hypoxémie, hypocapnie et alcalose respiratoire




Introduction

Thrombose veineuse

La thrombose veineuse, est la formation d'un **caillot sanguin** dans une **veine**, est un problème de santé assez fréquent dont la **gravité** est liée à ses **complications** potentielles

Sa prévention et son **traitement** repose sur l'administration de médicaments spécifiques (**anticoagulants**) et le port systématique de bas de contention adaptés



Signes cliniques

Thrombose veineuse

- Rougeur
- Chaleur
- Induration du mollet
- Perte du ballant
- Oedème unilatéral ne prenant pas le godet

Si je repère ces signes, je ne lève surtout pas le patient
J'appelle le médecin, car cette potentielle thrombose
pourrait se compliquer en embolie pulmonaire



EP - TVP

Facteurs de risques

Chirurgie : petit bassin, orthopédie

Médicale : insuffisance veineuse / cancer / anomalie de l'hémostase / surcharge pondérale

Chez les femmes : contraception orale / grossesse / post-partum / ménopause

Immobilisation : générale ou locale / longue ou brève



EP - TVP

Examens / diagnostic

- **D-dimères** : prise de sang / élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire
- **Echo-doppler veineux** : diagnostic de phlébite / évalue la gravité
- **Scintigraphie pulmonaire** : évalue la ventilation et la perfusion des poumons / détecte les emboles
- **Echographie trans-thoracique** : évalue les fonctions cardiaques

