
Brûlures

Les différents types




@CESIREVISE

Introduction

<u>Définition selon l'OMS</u> : une lésion de la peau ou d'un autre tissu organique principalement causée par la chaleur ou les rayonnements, la radioactivité, l'électricité, la friction ou le contact avec des produits chimiques.

Il existe différents types selon la profondeur :

- **1er degré : atteinte de l'épiderme**
- **2ème degré : atteinte du derme**
- **3ème degré : atteinte de l'hypoderme**



NB : S'il n'y a plus de sensation = signe d'une atteinte profonde /!

Tutorat

@CESIREVISE

Brûlures

1er degré


= Atteinte de l'épiderme

Aspect :

- **pas de phlyctènes**
- **rouge**

La peau est sensible et il n'y a pas de cicatrices après cicatrisation.

Ex : Le coup de soleil



Tutorat

@CESIREVISE

Brûlures

2ème degré superficiel

= Atteinte du derme superficiel

Aspect :

- **présence de phlyctènes**
- **rouge**

La peau est sensible et il n'y a pas de marques après cicatrisation.



@CESIREVISE

Tutorat

@CESIREVISE

Brûlures

2ème degré profond


= Atteinte du derme prodond

Aspect :

- **présence de phlyctènes**
- **blanc - rosé**

La peau est moins sensible et la cicatrisation est variable, pouvant laisser des cicatrices.

Pouvant nécessité une hospitalisation.



Tutorat

@CESIREVISE

Brûlures

3ème degré

Atteinte de l'hypoderme

Aspect :

- **absence de phlyctènes**
- **blanc - marroné**

Il y a une perte de sensibilité due à l'atteinte profonde (notamment des nerfs).

Nécessite une hospitalisation.



REVISE

Gravité ?

Il y a différents critères de gravité :

- Le degré de la brûlure
- La surface corporelle atteinte
- Les circonstances de la brûlure
  - incendie → inhalation ?
  - explosion → phénomène de blaste ?

NB : le phénomène de blaste correspond aux lésions causées par l'onde de choc consécutive à l'explosion.

- La localisation de la brûlure : visage, parties génitales, proximité avec des orifices naturels ?
- L'agent causal
- Le patient (âge extrême, notamment)

Tutorat
@CESIREVISE

Conduite

1. Soustraire le brûlé de la cause !

2. Il faut retirer vétements et bijoux en zones brûlés sauf s'ils adhérent à la peau.

3. Si la brûlure est due à un liquide chaud : Il faut rapidement :
   Faire couler de l'eau à environ 15°C à 15cm de la brûlure pendant environ 15 minutes.
   Moyen mnémotechnique : 15/15/15




Une brûlure est évolutive, il faut donc surveiller son évolution sur une durée d'environ 2 semaines.

Tutorat
@CESIREVISE

Info

La règle des 9 de Wallace permet d'évaluer la surface de la brûlure.

Elle fait correspondre les parties du corps avec un pourcentage par rapport à la surface corporelle totale.



<u>Si la surface est :</u>

- **< 10% sans autre facteur : on n'hospitalise pas**
- **entre 10% et 20% : on hospitalise**
- **> 20% : hospitalisation chez les grands brûlés**

Tutorat

@CESIREVISE