- PRÉDISPOSANTS: AGE, HÉRÉDITÉ/ATCD MALADIE CARDIOVASCULAIRE, SEXE, OBÉSITÉ
- PRÉCIPITANTS: SÉDENTARITÉ, HTA, DYSLIPIDÉMIE, TABAGISME, STRESS, OBÉSITÉ, DIABÈTE

3) ÉNUMÉREZ 4 SIGNES CLINIQUES QUI PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS EN CAS DE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) .

- DOULEUR AU MOLLET OU CUISSE
- ŒDÈME DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ROUGEUR OU CHALEUR LOCALE
- SENSIBILITÉ À LA PALPATION
- SIGNE DE HOMANS (DOULEUR À LA DORSIFLEXION)
- PERTE DU BALLOTTEMENT DU MOLLET

4) NOMMEZ LES 5 MESURES PRÉVENTIVES ESSENTIELLES DE LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE EN POSTOPÉRATOIRE RELEVANT DU RÔLE PROPRE ET DU RÔLE PRESCRIT.

- MOBILISATION PRÉCOCE ET MOBILISATION PASSIVE SI NÉCESSAIRE
- PORT DE BAS DE CONTENTION
- SURVEILLANCE DE LA PEAU ET DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ADMINISTRATION D'ANTICOAGULANTS PRESCRITS (HBPM OU AVK)
- HYDRATATION ADAPTÉE
- LEVER PRÉCOCE
- SURÉLÉVATION DES MI

5) EXPLIQUEZ ET ARGUMENTEZ LES MARQUEURS SUIVANTS : BNP NT-PROBNP, D-DIMÈRES, TROPONINE.

BNP / NT-PROBNP : PEPTIDES SÉCRÉTÉS PAR LE VENTRICULE EN RÉPONSE À UNE SURCHARGE DE PRESSION OU DE VOLUME → INDICATEURS D'INSUFFISANCE CARDIAQUE

D-DIMÈRES : FRAGMENTS DE FIBRINE DÉGRADÉE → UTILES POUR RÉCUSER UNE TVP OU UNE EMBOLIE PULMONAIRE SI NÉGATIF

TROPONINE : ENZYME MYOCARDIQUE SPÉCIFIQUE → ÉLÉVATION PROPORTIONNELLE À LA NÉCROSE MYOCARDIQUE (IDM)

6) INDIQUEZ À QUOI CORRESPOND UNE DOULEUR RÉTROSTERNALE, CONSTRICTIVE, IRRADIANT À LA MÂCHOIRE ET AU MEMBRE SUPÉRIEUR GAUCHE QUI NE CÈDE PAS À LA PRISE DE TRINITRINE.

SIGNE TYPIQUE D'INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) → URGENCE MÉDICALE, NÉCESSITE HOSPITALISATION ET PRISE EN CHARGE URGENTE

7) INDIQUEZ À QUOI CORRESPOND UNE DOULEUR RÉTROSTERNALE, CONSTRICTIVE, IRRADIANT À LA MÂCHOIRE ET AU MEMBRE SUPÉRIEUR GAUCHE QUI CÈDE À LA PRISE DE TRINITRINE.

SIGNE TYPIQUE D'ANGOR STABLE (ANGINE DE POITRINE)
→ ISCHÉMIE MYOCARDIQUE RÉVERSIBLE

# 8) QU'EST CE QUE LA TRIADE DE CHARCOT ?

- FIÈVRE
- DOULEUR ABDOMINALE (HYPOCHONDRE DROIT)
- ICTÈRE

→ C'EST LA TRIADE TYPIQUE D'UNE ANGIOCHOLITE

# 9) EXPLIQUEZ LA TRIADE DE VIRCHOW

- STASE VEINEUSE
- LÉSION DE LA PAROI VASCULAIRE
- HYPERCOAGULABILITÉ

→ ENSEMBLE FAVORISANT LA FORMATION D'UN THROMBUS

10) UNE ALIMENTATION RICHE EN SEL EST DANGEREUSE CHEZ UNE PERSONNE AYANT DÉJÀ EU UN OAP CARDIOGÉNIQUE :

A - VRAI
B - FAUX
ARGUMENTER VOTRE RÉPONSE CHOISIE.

LE SEL FAVORISE LA RÉTENTION HYDROSODÉE → AUGMENTATION DU VOLUME SANGUIN ET DE LA PRESSION CAPILLAIRE PULMONAIRE → RISQUE DE RÉCIDIVE D'OAP

# 11) QU'EST-CE QUE LE SIGNE DE MURPHY ?

DOULEUR VIVE À L'INSPIRATION LORS DE LA PALPATION DU POINT DE LA VÉSICULE BILIAIRE (HYPOCHONDRE DROIT) QUI VA BLOQUER L'INSPIRATION→ SIGNE CLINIQUE D'UNE CHOLÉCYSTITE AIGUË


foie
canal hépatique droit
canal hépatique gauche
estomac
vésicule biliaire
canal hépatique commun
canal cystique
canal cholédoque
pancréas
canal pancréatique
duodénum

veine cave supérieure
artère pulmonaire droite
veines pulmonaires droites
valve pulmonaire
valve auriculo ventriculaire droite ou atrio
triculaire droite ou valve tricuspide
veine cave inférieure
aorte
septum
valve atrio ventriculaire gauche ou auriculc
triculaire gauche ou valve mitrale
: valve aortique
: veines pulmonaires gauches
: artère pulmonaire gauche
: artère pulmonaire ou tronc artériel
monaire
: arc ou crosse aortique



# BON COURAGE !!!