
TÍTOL: TEOREMA DE VIVIANI


CLASSIFICACIÓ: GP MD 4 ESO A / G / T10 CP 0 SCMD

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Model de fusta format per tres triangles equilàters:

- Un triangle equilàter ABC gran on assenyalem en vermell un punt P i el segment que uneix perpendicularment aquest punt amb el costat BC.
- Un triangle equilàter més petit AB'C' tal que el costat B'C' contingui el punt P i sigui paral·lel a BC, que el costat AB' estigui sobre AB, que el costat AC' estigui sobre AC tal com mostra la imatge i que pugui girar entorn al seu baricentre que està fixat sobre el triangle ABC amb un cargol. En aquest triangle tracem en vermell el segment que uneix perpendicularment el punt P amb el costat AC'.
- Un triangle equilàter encara més petit DB'P tal que tingui un vèrtex en el punt P, que el costat DP sigui paral·lel a AC', que el costat B'P estigui sobre B'C', que el costat DB' estigui sobre AB' tal com mostra la imatge i que pugui girar entorn al seu baricentre que està fixat sobre el triangle AB'C' amb un cargol. En aquest triangle tracem en vermell l'altura que uneix el vèrtex P amb el costat DB'.

IMATGE:





CONTINGUTS: Conceptes diversos de geometria plana, demostracions visuals, raonament geomètric.

PROPOSTA D'APLICACIÓ DIDÀCTICA: El teorema de Viviani afirma: Donat un triangle equilàter ABC i un punt P qualsevol en el seu interior o sobre un dels seus costats, la suma de distàncies des d'aquest punt als tres costats és igual a l'altura del triangle.

Entorn a aquest teorema podem plantejar les següents activitats:

- 1. Enunciar el teorema i proposar que cada alumne/a dibuixi un triangle equilàter i que el comprovi per a diversos punts, traçant i mesurant els segments perpendiculars corresponents.
- 2. Fer la demostració visual del que acabem de comprovar: observem que es tracta tan sols de demostrar que la suma dels tres segments assenyalats en vermell és l'altura del triangle. N'hi haurà prou en girar el triangle AB'C' fins a col·locar el costat AC' paral·lel al costat BC de manera que el segment vermell quedi vertical. A continuació girarem el triangle petit B'DP fins a situar el costat B'D també paral·lel al costat BC de manera que el segment vermell també quedi vertical. En aquest moment els tres triangles queden tal com es mostra a la segona fotografia. És immediat observar que la suma dels tres segments vermells és l'altura del triangle ABC.
- 3. Podem acabar el bloc d'activitats fent la demostració formal d'aquest teorema. N'hi ha prou amb traçar tres segments que uneixin el punt P amb cadascun dels vèrtexs A, B i C i escriure, en termes algebraics, que l'àrea del triangle gran és igual a la suma de les àrees dels tres triangles petits. Donat que tots els triangles tenen la mateixa base ja que els tres costats són iguals (c) i que les altures dels tres triangles petits són els tres segments vermells (v_1, v_2) i v_3 , si anomenem a a l'altura del triangle gran, tindrem:

$$\frac{1}{2} \cdot c \cdot a = \frac{1}{2} \cdot c \cdot v_1 + \frac{1}{2} \cdot c \cdot v_2 + \frac{1}{2} \cdot c \cdot v_3.$$

Simplificant haurem demostrat formalment el teorema:

$$a = v_1 + v_2 + v_3$$
.

S'adjunta el fragment de vídeo V10 que mostra una aplicació d'aquest recurs.

CONNEXIONS: La construcció pot fer-se amb col·laboració amb l'àrea de tecnologia. És una pràctica molt interessant.

ALTRES COMENTARIS: Observem que es tracta d'un teorema sorprenent, fàcil de comprendre per què maneja idees molt senzilles, fàcil de comprovar

prenent mesures concretes per a diversos punts i fàcil de demostrar com hem vist. Permet diverses generalitzacions però que ja no poden ser demostrades visualment amb tanta facilitat. Aquest resultat es deu a Vincenzo Viviani que fou un deixeble de Galileu i de Torricelli, que va néixer a Florència a l'any 1622 i va morir també a Florència a l'any 1703. Agraeixo al professor Quim Tarradas la construcció del magnífic model que apareix a les imatges. En aquest recurs no s'observa cap risc.