

Young Female Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1362)			
	Malaria (n=648)	Infections (n=1272)	Non-infections (n=1444)
fever (771, 23%)	232 (36%)	324 (25%)	215 (15%)
weightLoss (426, 13%)	87 (13%)	194 (15%)	145 (10%)
abdominalProblem (379, 11%)	38 (6%)	112 (9%)	229 (16%)
vomit (277, 8%)	79 (12%)	107 (8%)	91 (6%)
cough (257, 8%)	45 (7%)	152 (12%)	60 (4%)
breathingProblem (235, 7%)	46 (7%)	92 (7%)	97 (7%)
pregnant (216, 6%)	14 (2%)	23 (2%)	179 (12%)
chestPain (166, 5%)	26 (4%)	73 (6%)	67 (5%)
unconscious (151, 4%)	27 (4%)	35 (3%)	89 (6%)
injury (112, 3%)	3 ($<1\%$)	7 (1%)	102 (7%)
looseStools (91, 3%)	14 (2%)	57 (4%)	20 (1%)
skinProblems (77, 2%)	8 (1%)	43 (3%)	26 (2%)
oedema (53, 2%)	3 ($<1\%$)	16 (1%)	34 (2%)
urinaryProblem (45, 1%)	5 (1%)	8 (1%)	32 (2%)
convulsions (34, 1%)	10 (2%)	7 (1%)	17 (1%)
paralysis (31, 1%)	4 (1%)	9 (1%)	18 (1%)
yellowEyes (22, 1%)	6 (1%)	6 ($<1\%$)	10 (1%)
lumps (21, 1%)	1 ($<1\%$)	7 (1%)	13 (1%)

