

Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2588)			
	Malaria (n=1382)	Infections (n=955)	Non-infections (n=251)
abdominalProblem	58 (4%)	39 (4%)	45 (18%)
bleeding	7 (1%)	3 (<1%)	6 (2%)
chestPain	29 (2%)	14 (1%)	7 (3%)
convulsion	332 (24%)	92 (10%)	36 (14%)
cough	301 (22%)	154 (16%)	15 (6%)
difficultyBreathing	308 (22%)	189 (20%)	36 (14%)
difficultySwallowing	25 (2%)	3 (<1%)	12 (5%)
fever	1359 (98%)	852 (89%)	55 (22%)
headache	379 (27%)	180 (19%)	19 (8%)
looseStools	124 (9%)	182 (19%)	5 (2%)
lumps	0 (<1%)	2 (<1%)	3 (1%)
neckStiffness	79 (6%)	31 (3%)	6 (2%)
oedema	43 (3%)	13 (1%)	18 (7%)
paralysis	2 (<1%)	1 (<1%)	6 (2%)
skinRash	12 (1%)	37 (4%)	12 (5%)
ulcers	10 (1%)	29 (3%)	17 (7%)
unconscious	132 (10%)	53 (6%)	35 (14%)
urinaryProblem	11 (1%)	11 (1%)	8 (3%)
vomit	452 (33%)	252 (26%)	25 (10%)
weightLoss	252 (18%)	179 (19%)	33 (13%)
yellowEyes	339 (25%)	82 (9%)	26 (10%)

