

Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 4064)			
	Malaria (n=1634)	Infections (n=1780)	Non-infections (n=650)
fever (3376, 83%)	1605 (98%)	1625 (91%)	146 (22%)
vomit (1088, 27%)	527 (32%)	485 (27%)	76 (12%)
difficultyBreathing (894, 22%)	374 (23%)	427 (24%)	93 (14%)
	452 (28%)	372 (21%)	57 (9%)
weightLoss (798, 20%)	306 (19%)	391 (22%)	101 (16%)
cough (782, 19%)	360 (22%)	382 (21%)	40 (6%)
yellowEyes (712, 18%)	401 (25%)	243 (14%)	68 (10%)
convulsion (681, 17%)	397 (24%)	209 (12%)	75 (12%)
looseStools (493, 12%)	156 (10%)	322 (18%)	15 (2%)
unconscious (354, 9%)	163 (10%)	120 (7%)	71 (11%)
abdominalProblem (296, 7%)	68 (4%)	112 (6%)	116 (18%)
neckStiffness (221, 5%)	99 (6%)	106 (6%)	16 (2%)
oedema (169, 4%)	53 (3%)	60 (3%)	56 (9%)
injury (153, 4%)	1 (<1%)	6 (<1%)	146 (22%)
skinRash (133, 3%)	15 (1%)	91 (5%)	27 (4%)
ulcers (110, 3%)	11 (1%)	72 (4%)	27 (4%)
chestPain (90, 2%)	34 (2%)	39 (2%)	17 (3%)
difficultySwallowing (72, 2%)	32 (2%)	21 (1%)	19 (3%)
urinaryProblem (70, 2%)	17 (1%)	38 (2%)	15 (2%)
paralysis (30, 1%)	4 (<1%)	16 (1%)	10 (2%)
bleeding (28, 1%)	8 (<1%)	7 (<1%)	13 (2%)
lumps (15, <1%)	1 (<1%)	6 (<1%)	8 (1%)

