

Young Male Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1442)			
	Malaria (n=661)	Infections (n=1337)	Non-infections (n=1326)
fever (752, 23%)	236 (36%)	353 (26%)	163 (12%)
weightLoss (407, 12%)	86 (13%)	205 (15%)	116 (9%)
abdominalProblem (348, 10%)	38 (6%)	108 (8%)	202 (15%)
injury (310, 9%)	3 (<1%)	13 (1%)	294 (22%)
cough (291, 9%)	64 (10%)	178 (13%)	49 (4%)
vomit (286, 9%)	67 (10%)	110 (8%)	109 (8%)
breathingProblem (262, 8%)	46 (7%)	113 (8%)	103 (8%)
chestPain (169, 5%)	35 (5%)	70 (5%)	64 (5%)
unconscious (145, 4%)	30 (5%)	46 (3%)	69 (5%)
looseStools (67, 2%)	10 (2%)	47 (4%)	10 (1%)
urinaryProblem (59, 2%)	12 (2%)	15 (1%)	32 (2%)
skinProblems (54, 2%)	8 (1%)	26 (2%)	20 (2%)
oedema (52, 2%)	2 (<1%)	19 (1%)	31 (2%)
paralysis (40, 1%)	4 (1%)	13 (1%)	23 (2%)
yellowEyes (39, 1%)	12 (2%)	9 (1%)	18 (1%)
convulsions (34, 1%)	8 (1%)	9 (1%)	17 (1%)
lumps (9, <1%)	0 (<1%)	3 (<1%)	6 (<1%)

