

Young Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2804)			
	Malaria (n=1309)	Infections (n=2609)	Non-infections (n=2770)
fever (1523, 23%)	468 (36%)	677 (26%)	378 (14%)
weightLoss (833, 12%)	173 (13%)	399 (15%)	261 (9%)
abdominalProblem (727, 11%)	76 (6%)	220 (8%)	431 (16%)
vomit (563, 8%)	146 (11%)	217 (8%)	200 (7%)
cough (548, 8%)	109 (8%)	330 (13%)	109 (4%)
breathingProblem (497, 7%)	92 (7%)	205 (8%)	200 (7%)
injury (422, 6%)	6 (<1%)	20 (1%)	396 (14%)
chestPain (335, 5%)	61 (5%)	143 (5%)	131 (5%)
unconscious (296, 4%)			
	57 (4%)	81 (3%)	158 (6%)
pregnant (216, 3%)	14 (1%)	23 (1%)	179 (6%)
looseStools (158, 2%)	24 (2%)	104 (4%)	30 (1%)
skinProblems (131, 2%)	16 (1%)	69 (3%)	46 (2%)
oedema (105, 2%)	5 (<1%)	35 (1%)	65 (2%)
urinaryProblem (104, 2%)			
	17 (1%)	23 (1%)	64 (2%)
paralysis (71, 1%)	8 (1%)	22 (1%)	41 (1%)
convulsions (68, 1%)	18 (1%)	16 (1%)	34 (1%)
yellowEyes (61, 1%)	18 (1%)	15 (1%)	28 (1%)
lumps (30, <1%)	1 (<1%)	10 (<1%)	19 (1%)

