

| Young Female Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom<br>Sierra Leone 2019–2022<br>(n = 724) |                    |                           |                       |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | Malaria<br>(n=192) | Non-infections<br>(n=240) | Infections<br>(n=292) |
| abdominalProblem  | 28<br>(15%)        | 67<br>(28%)               | 65<br>(22%)           |
| breathingProblem  | 37<br>(19%)        | 35<br>(15%)               | 41<br>(14%)           |
| chestPain   | 19<br>(10%)        | 30<br>(12%)               | 34<br>(12%)           |
| convulsions   | 7<br>(4%)          | 12<br>(5%)                | 5<br>(2%)             |
| cough   | 36<br>(19%)        | 18<br>(8%)                | 79<br>(27%)           |
| fever   | 187<br>(97%)       | 59<br>(25%)               | 170<br>(58%)          |
| looseStools   | 8<br>(4%)          | 4<br>(2%)                 | 35<br>(12%)           |
| lumps   | 1<br>(1%)          | 5<br>(2%)                 | 3<br>(1%)             |
| oedema  | 1<br>(1%)          | 21<br>(9%)                | 4<br>(1%)             |
| paralysis   | 3<br>(2%)          | 7<br>(3%)                 | 3<br>(1%)             |
| skinProblems  | 6<br>(3%)          | 12<br>(5%)                | 14<br>(5%)            |
| unconscious   | 21<br>(11%)        | 36<br>(15%)               | 24<br>(8%)            |
| urinaryProblem  | 2<br>(1%)          | 15<br>(6%)                | 5<br>(2%)             |
| vomit   | 58<br>(30%)        | 27<br>(11%)               | 54<br>(18%)           |
| weightLoss  | 68<br>(35%)        | 50<br>(21%)               | 92<br>(32%)           |
| yellowEyes  | 6<br>(3%)          | 6<br>(2%)                 | 2<br>(1%)             |

