

Young Female Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1362)			
	Malaria (n=240)	Infections (n=406)	Non-infections (n=716)
yellowEyes (22, 2%)	6 (2%)	6 (1%)	10 (1%)
weightLoss (426, 31%)	87 (36%)	193 (48%)	146 (20%)
vomit (277, 20%)	79 (33%)	107 (26%)	91 (13%)
urinaryProblem (45, 3%)	5 (2%)	8 (2%)	32 (4%)
unconscious (151, 11%)	27 (11%)	35 (9%)	89 (12%)
skinProblems (77, 6%)	8 (3%)	43 (11%)	26 (4%)
pregnant (216, 16%)	14 (6%)	23 (6%)	179 (25%)
paralysis (31, 2%)	4 (2%)	9 (2%)	18 (3%)
oedema (53, 4%)	3 (1%)	16 (4%)	34 (5%)
lumps (21, 2%)	1 (<1%)	7 (2%)	13 (2%)
looseStools (91, 7%)	14 (6%)	57 (14%)	20 (3%)
injury (112, 8%)	3 (1%)	7 (2%)	102 (14%)
fever (771, 57%)	232 (97%)	324 (80%)	215 (30%)
cough (257, 19%)	45 (19%)	150 (37%)	62 (9%)
convulsions (34, 2%)	10 (4%)	7 (2%)	17 (2%)
chestPain (166, 12%)	26 (11%)	73 (18%)	67 (9%)
breathingProblem (235, 17%)	46 (19%)	91 (22%)	98 (14%)
abdominalProblem (379, 28%)	38 (16%)	112 (28%)	229 (32%)

