

		Malaria (2633, 45%)	Infections (2629, 45%)	Non-infections (612, 10%)
fever (1728, 29%)		815 (47%)	833 (48%)	80 (5%)
	vomit (564, 10%)	285 (51%)	244 (43%)	35 (6%)
	headache (459, 8%)	232 (51%)	202 (44%)	25 (5%)
	difficultyBreathing (454, 8%)	189 (42%)	217 (48%)	48 (11%)
	weightLoss (418, 7%)	168 (40%)	203 (49%)	47 (11%)
	cough (392, 7%)	195 (50%)	185 (47%)	12 (3%)
	yellowEyes (365, 6%)	206 (56%)	122 (33%)	37 (10%)
	convulsion (329, 6%)	199 (60%)	101 (31%)	29 (9%)
	looseStools (243, 4%)	74 (30%)	165 (68%)	4 (2%)
	unconscious (171, 3%)	83 (49%)	61 (36%)	27 (16%)
abdominalProblem (171, 3%)		38 (22%)	64 (37%)	69 (40%)
	neckStiffness (116, 2%)	49 (42%)	61 (53%)	6 (5%)
injury (98, 2%)		0 ($<1\%$)	5 (5%)	93 (95%)
	oedema (85, 1%)	31 (36%)	26 (31%)	28 (33%)
skinRash (63, 1%)		9 (14%)	43 (68%)	11 (17%)
	ulcers (59, 1%)	8 (14%)	34 (58%)	17 (29%)
urinaryProblem (42, 1%)		12 (29%)	21 (50%)	9 (21%)
	chestPain (42, 1%)	17 (40%)	17 (40%)	8 (19%)
difficultySwallowing (38, 1%)		16 (42%)	9 (24%)	13 (34%)
	bleeding (15, $<1\%$)	4 (27%)	4 (27%)	7 (47%)
paralysis (13, $<1\%$)		2 (15%)	9 (69%)	2 (15%)
	lumps (9, $<1\%$)	1 (11%)	3 (33%)	5 (56%)

