

Young Female Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1362)			
	Malaria (n=240)	Infections (n=408)	Non-infections (n=714)
fever (771, 23%)	232 (97%)	324 (79%)	215 (30%)
weightLoss (426, 13%)	87 (36%)	194 (48%)	145 (20%)
abdominalProblem (379, 11%)	38 (16%)	112 (27%)	229 (32%)
vomit (277, 8%)	79 (33%)	107 (26%)	91 (13%)
cough (257, 8%)	45 (19%)	152 (37%)	60 (8%)
breathingProblem (235, 7%)	46 (19%)	92 (23%)	97 (14%)
pregnant (216, 6%)	14 (6%)	23 (6%)	179 (25%)
chestPain (166, 5%)	26 (11%)	73 (18%)	67 (9%)
unconscious (151, 4%)	27 (11%)	35 (9%)	89 (12%)
injury (112, 3%)	3 (1%)	7 (2%)	102 (14%)
looseStools (91, 3%)	14 (6%)	57 (14%)	20 (3%)
skinProblems (77, 2%)	8 (3%)	43 (11%)	26 (4%)
oedema (53, 2%)	3 (1%)	16 (4%)	34 (5%)
urinaryProblem (45, 1%)	5 (2%)	8 (2%)	32 (4%)
convulsions (34, 1%)	10 (4%)	7 (2%)	17 (2%)
paralysis (31, 1%)	4 (2%)	9 (2%)	18 (3%)
yellowEyes (22, 1%)	6 (2%)	6 (1%)	10 (1%)
lumps (21, 1%)	1 (<1%)	7 (2%)	13 (2%)

