

Adult (15–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 7036)			
	Malaria (n=2693)	Infections (n=6176)	Non-infections (n=7933)
fever (3820, 23%)	988 (37%)	1713 (28%)	1119 (14%)
weightLoss (2055, 12%)	350 (13%)	873 (14%)	832 (10%)
abdominalProblem (1594, 9%)	141 (5%)	433 (7%)	1020 (13%)
breathingProblem (1517, 9%)	198 (7%)	530 (9%)	789 (10%)
cough (1442, 9%)	225 (8%)	800 (13%)	417 (5%)
vomit (1227, 7%)	284 (11%)	451 (7%)	492 (6%)
chestPain (937, 6%)	110 (4%)	360 (6%)	467 (6%)
injury (832, 5%)	18 (1%)	44 (1%)	770 (10%)
unconscious (816, 5%)	126 (5%)	183 (3%)	507 (6%)
paralysis (482, 3%)	33 (1%)	55 (1%)	394 (5%)
looseStools (422, 3%)	50 (2%)	278 (5%)	94 (1%)
urinaryProblem (357, 2%)	38 (1%)	71 (1%)	248 (3%)
oedema (341, 2%)	11 ($<1\%$)	99 (2%)	231 (3%)
skinProblems (320, 2%)	29 (1%)	164 (3%)	127 (2%)
pregnant (251, 1%)	18 (1%)	26 ($<1\%$)	207 (3%)
yellowEyes (176, 1%)	43 (2%)	45 (1%)	88 (1%)
convulsions (130, 1%)	26 (1%)	25 ($<1\%$)	79 (1%)
lumps (83, $<1\%$)	5 ($<1\%$)	26 ($<1\%$)	52 (1%)