

Female Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1979)			
	Malaria (n=2451)	Infections (n=2521)	Non-infections (n=600)
fever (1648, 30%)	790 (32%)	792 (31%)	66 (11%)
vomit (524, 9%)	242 (10%)	241 (10%)	41 (7%)
difficultyBreathing (440, 8%)	185 (8%)	210 (8%)	45 (8%)
	220 (9%)	170 (7%)	32 (5%)
cough (390, 7%)	165 (7%)	197 (8%)	28 (5%)
weightLoss (380, 7%)	138 (6%)	188 (7%)	54 (9%)
convulsion (352, 6%)	198 (8%)	108 (4%)	46 (8%)
yellowEyes (347, 6%)	195 (8%)	121 (5%)	31 (5%)
looseStools (250, 4%)	82 (3%)	157 (6%)	11 (2%)
unconscious (183, 3%)	80 (3%)	59 (2%)	44 (7%)
abdominalProblem (125, 2%)	30 (1%)	48 (2%)	47 (8%)
neckStiffness (105, 2%)	50 (2%)	45 (2%)	10 (2%)
oedema (84, 2%)	22 (1%)	34 (1%)	28 (5%)
skinRash (70, 1%)	6 ($<1\%$)	48 (2%)	16 (3%)
injury (55, 1%)	1 ($<1\%$)	1 ($<1\%$)	53 (9%)
ulcers (51, 1%)	3 ($<1\%$)	38 (2%)	10 (2%)
chestPain (48, 1%)	17 (1%)	22 (1%)	9 (2%)
difficultySwallowing (34, 1%)	16 (1%)	12 ($<1\%$)	6 (1%)
urinaryProblem (28, 1%)	5 ($<1\%$)	17 (1%)	6 (1%)
paralysis (17, $<1\%$)	2 ($<1\%$)	7 ($<1\%$)	8 (1%)
bleeding (13, $<1\%$)	4 ($<1\%$)	3 ($<1\%$)	6 (1%)
lumps (6, $<1\%$)	0 ($<1\%$)	3 ($<1\%$)	3 ($<1\%$)

