

Female Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1317)				
		Malaria (n=680)	Infections (n=456)	Non-infections (n=154)
abdominalProblem		24 (4%)	18 (4%)	23 (15%)
	bleeding	3 (<1%)	1 (<1%)	2 (1%)
chestPain		15 (2%)	9 (2%)	6 (4%)
convulsion		166 (24%)	46 (10%)	20 (13%)
cough		140 (21%)	82 (18%)	14 (9%)
difficultyBreathing		152 (22%)	88 (19%)	20 (13%)
difficultySwallowing		13 (2%)	0 (<1%)	6 (4%)
fever		672 (99%)	424 (93%)	27 (18%)
headache		183 (27%)	89 (20%)	10 (6%)
injury		1 (<1%)	1 (<1%)	43 (28%)
looseStools		69 (10%)	88 (19%)	6 (4%)
lumps		0 (<1%)	1 (<1%)	2 (1%)
neckStiffness		45 (7%)	11 (2%)	7 (5%)
oedema		18 (3%)	5 (1%)	12 (8%)
paralysis		1 (<1%)	1 (<1%)	5 (3%)
skinRash		4 (1%)	19 (4%)	8 (5%)
ulcers		3 (<1%)	14 (3%)	6 (4%)
unconscious		61 (9%)	23 (5%)	23 (15%)
urinaryProblem		3 (<1%)	4 (1%)	3 (2%)
vomit		208 (31%)	124 (27%)	17 (11%)
weightLoss		112 (16%)	83 (18%)	25 (16%)
yellowEyes		163 (24%)	37 (8%)	14 (9%)