

Young Male (15–39 Years) Adult Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1442)			
	Malaria (661, 20%)	Infections (1337, 40%)	Non-infections (1326, 40%)
fever (752, 23%)	236 (31%)	353 (47%)	163 (22%)
weightLoss (407, 12%)	86 (21%)	205 (50%)	116 (29%)
abdominalProblem (348, 10%)	38 (11%)	108 (31%)	202 (58%)
injury (310, 9%)	3 (1%)	13 (4%)	294 (95%)
cough (291, 9%)	64 (22%)	178 (61%)	49 (17%)
vomit (286, 9%)	67 (23%)	110 (38%)	109 (38%)
breathingProblem (262, 8%)	46 (18%)	113 (43%)	103 (39%)
chestPain (169, 5%)	35 (21%)	70 (41%)	64 (38%)
unconscious (145, 4%)	30 (21%)	46 (32%)	69 (48%)
looseStools (67, 2%)	10 (15%)	47 (70%)	10 (15%)
urinaryProblem (59, 2%)	12 (20%)	15 (25%)	32 (54%)
skinProblems (54, 2%)	8 (15%)	26 (48%)	20 (37%)
oedema (52, 2%)	2 (4%)	19 (37%)	31 (60%)
paralysis (40, 1%)	4 (10%)	13 (32%)	23 (57%)
yellowEyes (39, 1%)	12 (31%)	9 (23%)	18 (46%)
convulsions (34, 1%)	8 (24%)	9 (26%)	17 (50%)
lumps (9, <1%)	0 (<1%)	3 (33%)	6 (67%)

